

- 1 品種登録の番号及び年月日 第18296号 平成21年7月31日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Allium caesium Schrenk x Allium caeruleum Pall. 札幌1号 (サッポロ1ゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は中、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の縦断面の反りの強弱は弱、葉の凹みの程度は中、葉の緑色の濃淡はやや淡(3513 穂黄緑)、花茎の長さは中、花茎の太さはやや太、花茎の緑色の濃淡は中、花茎のアントシアニン着色の強弱は弱、花序の高さは高、花序の幅は広、二次花序の有無は無、一花序当たりの小花数はやや多、花の香りの強弱は中、小花の直径はやや大、小花のタイプは半開型、花被片の形は披針形、花被片表面の主な色は8002 淡青紫、花被片表面の中央脈の色は8009 青紫、開花期は中である。(カラーチャートはJHSを使用)
出願品種「札幌1号」は、対照品種Allium caesiumと比較して、一花序当たりの小花数がやや多であること、花被片表面の主な色が8002 淡青紫であること、花被片表面の中央脈の色が8009 青紫であること等で区別性が認められる。対照品種Allium caeruleumと比較して、花序の高さが高であること、二次花序の有無が無であること、小花のタイプが半開型であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
篠田浩一 村田奈芳
- 7 出願公表の年月日 平成18年8月14日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第18297号 平成21年7月31日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Allium caesium Schrenk x Allium caeruleum Pall. 札幌2号 (サッポロ2ゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はやや高、葉の長さはやや長、葉の幅は広、葉の縦断面の反りの強弱は弱、葉の凹みの程度はやや強、葉の緑色の濃淡はやや濃、花茎の長さはやや長、花茎の太さは中、花茎の緑色の濃淡は淡、花茎のアントシアニン着色の強弱は弱、花序の高さはやや高、花序の幅は広、二次花序の有無は無、一花序当たりの小花数はやや多、花の香りの強弱は中、小花の直径は大、小花のタイプは半開型、花被片の形は披針形、花被片表面の主な色は7601 青白、花被片表面の中央脈の色は4006 穏緑、開花期は中である。(カラーチャートはJHSを使用)
出願品種「札幌2号」は、対照品種Allium caesiumと比較して、草丈がやや高であること、一花序当たりの小花数がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種Allium caeruleumと比較して、二次花序の有無が無であること、花被片表面の主な色が7601 青白であること、花被片表面の中央脈の色が4006 穏緑であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
篠田浩一 村田奈芳
- 7 出願公表の年月日 平成18年8月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第18298号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Allium chinense G. Don プリティルビー

3 登録品種の特性の概要

草姿は中、草勢はやや強、葉数は中、分球数は少、花茎の長さは長、花茎数は中、花房の大きさはやや大、小花の表面の色は8905 明赤味紫、小花数は中、開花の早晩生は中、葉身の長さはかなり長、葉身の幅は広、葉身の色は緑、葉身のねじれはかなり弱、葉の断面は中、葉身のろう質は少、葉鞘部の色は中、葉鞘部の長さはかなり長、葉鞘部の太さはかなり太、1株球重は重、1球重はかなり重、首の大きさは太、首のしまりは中、りん茎の形状は卵形、外皮の色は白、外皮のはげ易さは中、りん片の色は白、りん片数は中、りん片の厚さはやや薄、香気の強弱は中、抽だいの早晩性は早、抽だい数は中、休眠性は中、早晩性は中である。（カラーチャートはJHSを使用）

出願品種「プリティルビー」は、対照品種「ラクダ（鳥取在来）」と比較して、小花の表面の色が8905 明赤味紫であること、小花数の中であること、乾腐病抵抗性が高いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鳥取県

鳥取県鳥取市東町一丁目220番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

下中雅仁 田平弘基 森本隆義 北山淑一

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 2 9 9 号 平成 2 1 年 7 月 3 1 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Aloe perfoliata L. ホタルの光 (ホタルヒカリ)
- 3 登録品種の特性の概要
株の幅はやや狭、草丈は低、葉の数はやや少、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の厚さはやや厚、葉の色は138A、葉の斑の有無は有、葉の斑の色は143B、新葉の色は154B（地色）、143B（先端部）である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ホタルの光」は、対照品種「不夜城錦」と比較して、新葉の色が154B（地色）、143B（先端部）であること等で区別性が認められる。対照品種「不夜城」と比較して、新葉の色が154B（地色）、143B（先端部）であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
曾田義則
愛知県豊川市野口町長万47番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
曾田義則
- 7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 1 1 月 1 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18300号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. コネドン

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、茎の太さは中、葉身の形状は披針形、葉の長さは中、葉の幅は広、散形花序の分枝数は中、花の縦径はやや長、花の横径は中、花の花被片の展開度は大、外花被の全形は長倒卵形、内花被の全形は倒披針形、外花被内面の花色の模様はIX型、側方内花被内面の花色の模様はV型、中央内花被内面の花色の模様はV型、外花被の内面Aゾーンの色は69B、外花被の内面Bゾーンの色は8C、側方内花被の内面Aゾーンの色は69B、側方内花被の内面Bゾーンの色は5C、側方内花被の内面Cゾーンの色はN155A、中央内花被の内面Aゾーンの色は65B、中央内花被の内面Bゾーンの色は8C、中央内花被の内面Cゾーンの色はN155A、外花被内面の条線の有無は無、側方内花被内面の条線の有無は有、側方内花被内面の条線の数の中、側方内花被内面の条線の大きさは大、中央内花被内面の条線の有無は有、中央内花被内面の条線の数極少、中央内花被内面の条線の大きさは大、花糸の主たる色はN155A、花柱の主な色はN155Aである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「コネドン」は、対照品種「バランス」と比較して、外花被の内面Aゾーンの色が69Bであること、側方内花被内面の条線の数が中であること、中央内花被内面の条線の数極少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

クンスト ブリーディング社

オランダ王国 ニューフェーン 2441 GA ニューフェーン スヤークパッド 93

6 登録品種の育成をした者の氏名

J. W. M. クンスト

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 3 0 1 号 平成 2 1 年 7 月 3 1 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. コナスぺ

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、茎の太さはやや細、葉身の形状は披針形、葉の長さはやや長、葉の幅は中、散形花序の分枝数は中、花の縦径はやや長、花の横径は中、花の花被片の展開度は大、外花被の全形は広楕円形、内花被の全形は倒披針形、外花被内面の花色の模様はⅨ型、側方内花被内面の花色の模様はⅧ型、中央内花被内面の花色の模様はⅡ型、外花被の内面 A ゾーンの色は 55C、外花被の内面 B ゾーンの色は 69D、側方内花被の内面 A ゾーンの色は 55C、側方内花被の内面 B ゾーンの色は 1C、側方内花被の内面 C ゾーンの色は N155D、中央内花被の内面 A ゾーンの色は 55C、中央内花被の内面 B ゾーンの色は 69D、外花被内面の条線の有無は無、側方内花被内面の条線の有無は有、側方内花被内面の条線の数是多、側方内花被内面の条線の大きさは小、中央内花被内面の条線の有無は無、花糸の主たる色は N155A、花柱の主な色は N155A である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「コナスぺ」は、対照品種「トロピカーナ」と比較して、花の主たる色が明桃であること、外花被の内面 A ゾーンの色が 55C であること等で区別性が認められる。対照品種「バランス」と比較して、花の主たる色が明桃であること、外花被の内面 A ゾーンの色が 55C であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

クンスト ブリーディング社

オランダ王国 ニューフェーン 2441 GA ニューフェーンズ ヤークパッド 93

6 登録品種の育成をした者の氏名

J. W. M. クンスト

7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 1 0 月 2 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18302号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. コナコレ

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、茎の太さは中、葉身の形状は披針形、葉の長さは長、葉の幅は広、散形花序の分枝数は中、花の縦径は中、花の横径は中、花の花被片の展開度は大、外花被の全形は長倒卵形、内花被の全形は倒披針形、外花被内面の花色の模様はⅢ型、側方内花被内面の花色の模様はⅢ型、中央内花被内面の花色の模様はⅢ型、外花被の内面Aゾーンの色は13B、外花被の内面Bゾーンの色は4D、側方内花被の内面Aゾーンの色は15A、側方内花被の内面Bゾーンの色は14D、中央内花被の内面Aゾーンの色は15A、中央内花被の内面Bゾーンの色は14D、外花被内面の条線の有無は無、側方内花被内面の条線の有無は有、側方内花被内面の条線の数少、側方内花被内面の条線の大きさは中、中央内花被内面の条線の有無は有、中央内花被内面の条線の数かなり少、中央内花被内面の条線の大きさは中、花糸の主たる色は5D、花柱の主な色は13Cである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「コナコレ」は、対照品種「コネドン」と比較して、花の主たる色が黄であること、外花被内面の花色の模様がⅢ型であること等で区別性が認められる。対照品種「バランス」と比較して、花の主たる色が黄であること、側方内花被内面の条線の数少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

クンスト ブリーディング社

オランダ王国 ニューフェーン 2441 GA ニューフェーン ス ヤークパッド 93

6 登録品種の育成をした者の氏名

J. W. M. クンスト

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 3 0 3 号 平成 2 1 年 7 月 3 1 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Alternanthera porrigens Kuntze Revis. 千日小鈴斑入（センチコスズフイリ）
- 3 登録品種の特性の概要
草型は横張型、草丈はかなり低、茎の太さはかなり細、茎の色は黄緑、茎のアントシアニンの発現の有無は無、節間長は短、葉形は卵形、葉の先端の形は鋭形、葉の基部の形は鈍形、葉長はかなり短、葉幅は極狭、葉の表面の色は黄緑、その他（斑：2D）、葉の裏面の色は黄緑、その他（斑：150C）、葉の表面のアントシアニンの発現の有無は無、花穂の着生位置は頂部、花穂の形は円筒形、花穂の長さはやや短、花穂の幅は狭、花穂の色は70B, 155C(先端部)、花穂の数は少、一花穂における小花穂の数は中である。
（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「千日小鈴斑入」は、対照品種「千日小鈴」と比較して、葉の表面の色が黄緑、その他（斑：2D）であること、花穂の色が70B, 155C(先端部)であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社角田ナーセリー
愛知県一宮市萩原町萩原橋上14-1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
安藤和宏 西川公一郎 角田ミサコ
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 1 2 月 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18304号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia L. 木村ーKM11 (キムラーKM11)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、ほうの先端の形はとがる、ほうの大きさは大、ほうの色は緑、葉身の長さはかなり短、葉身の中ろくの長さは短、葉身の幅は狭、葉の先端部の形は円、葉の欠刻の形は鈍鋸歯状、葉の欠刻の深さは極浅、葉の基部の裂片の重なりはかさなっている、葉の表面の色は緑、花卉の数（八重品種に限る）は極多、花卉の縁の切れ込みは無、花卉の波打ちは有、花の大きさはやや小、花色のパターンは単色、外花卉の表面縁部の色は65A、外花卉の表面中央部の色は65B、内花卉の表面縁部の色は65B、内花卉の表面中央部の色は65Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「木村ーKM11」は、対照品種「ダブロス」と比較して、外花卉の表面中央部の色が65Bであること、内花卉の表面中央部の色が65Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

木村治彦

愛知県海部郡美和町乙之子屋敷54番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

木村治彦

7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18305号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia L. 金沢白神無月 (カザリシロカンナヅキ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は普通、樹高は普通、枝の太さは中、節間長は短、葉形は卵形、葉の大きさはやや大、葉姿は平ら、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は鈍脚、葉の色は濃緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は鈍い細鋸歯、葉柄の長さは中、一重・八重別は一重咲き、一重咲きの花形は猪口咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは極小輪、花色区分は単色、花色(地色)は157D、外花卉の形は丸形、弁脈は無、弁縁の形は桜弁、花卉数は9以下、外花卉の曲り方は平滑、つぼみの形は円尖形、雄ずいの形は筒しべ、花糸の色は白、花糸の数は多、やくの色は黄、花卉と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は4、花の香りは微、開花期は秋咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「金沢白神無月」は、対照品種「祐閑寺名月」と比較して、葉姿が平らであること、葉の先端の形が鋭尖形であること等で区別性が認められる。対照品種「加賀八朔」と比較して、節間長が短であること、つぼみの形が円尖形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千田清司

石川県金沢市高畠1丁目246番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

千田清司

7 出願公表の年月日 平成18年12月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18306号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia L. 金沢千代之月 (カザチヨノツキ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は普通、樹高は普通、枝の太さはやや太、節間長はやや短、葉形は広円形、葉の大きさはやや大、葉姿は縁の外曲、葉の先端の形は凸形、葉脚の形は円脚、葉の色は濃緑、葉の光沢は有、葉の厚さは厚、葉縁の形は細鋸歯、葉柄の長さは長、一重・八重別は一重咲き、一重咲きの花形は平開咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは極小輪、花色区分は単色、花色(地色)は155C、内側の花弁の色は155C、外花弁の形は丸形、弁脈は無、弁縁の形は丸、花弁数は9以下、つぼみの形は円尖形、雄ずいの形は筒しべ、花糸の色は白、花糸の数はかなり多、やくの色は黄褐、花弁と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは微、開花期は秋咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「金沢千代之月」は、対照品種「臘月」と比較して、一重咲きの花形が平開咲きであること、やくの色が黄褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千田清司
石川県金沢市高畠1丁目246番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

千田清司

7 出願公表の年月日 平成18年12月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18307号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Capsicum annuum L. 土佐Pレッド (トサPレッド)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、分枝開張度は中、分枝性はやや密、第一分枝の角度はやや広、節間長は中、枝の強度は強、腋芽の発生はやや弱、葉色は緑、葉の大きさはやや大、葉柄の長さは中、葉面の平滑度は平滑、未熟果の色は緑、成熟果の色は赤、果の着生は節成り、着果の向きは下向き、果形は中長形、果肉の厚さはやや薄、果の大きさはやや大、果の長さはやや長、果の太さはやや太、果頂部の形は凹、果面の皺はやや少、こうあ部のくぼみは中、果の光沢は中、果面の条溝の深さは浅、果柄の強さはやや脆、果皮の硬さは中、果の辛味の発現は無、着果数は中、1果当り種子数は中、早晚性はやや早、TMV抵抗性は強(PMMoV抵抗性)である。

出願品種「土佐Pレッド」は、対照品種「トサヒメR」と比較して、第一分枝の角度がやや広であること、果の大きさはやや大であること等で区別性が認められる。対照品種「土佐ヒカリD」と比較して、第一分枝の角度がやや広であること、TMV抵抗性(PMMoV抵抗性)が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高知県

高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号

6 登録品種の育成をした者の氏名

松本満夫 細美祐子 新田益男 澤田博正

7 出願公表の年月日 平成19年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第18308号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. AVIN

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は中、節間長はやや短、茎の太さはかなり太、茎の色は緑、たく葉の大きさは中、葉の着き方（着生方向）は水平、葉長はやや長、葉幅は中、葉の縦横比はやや大、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さは中、葉基部の形は平形、葉表面の色は淡、花房の形（スプレイぎくに限る）は平形、花の数（スプレイぎくに限る）はやや少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は半八重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデージータイプ、花の大きさ（スプレイぎく）は中、花の厚み（スプレイぎく）は薄、花首の長さは長、花たくの形は盛り上がったドーム状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）は中、舌状花の向きは水平（±15度以内）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さは極短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は凸、外花弁の長さはやや短、外花弁の最大幅はやや狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は155D、外花弁の裏面の色は155B、花盤の大きさ（八重品種を除く）は小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の色

（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄、花盤の中央暗色スポット（デージー品種に限る）は無、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は小、管状花の長さ（開葯時）はやや短、生態分類型は秋、到花週数（周年生産品種に限る）は9.0週である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「AVIN」は、対照品種「白馬」と比較して、葉の二次欠刻の深さがやや浅であること、舌状花の重ね（一重・八重の別）が半八重であること等で区別性が認められる。対照品種「せいしろふさ」と比較して、茎の太さがかなり太であること、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

キリンアグリバイオ株式会社
東京都中央区入船一丁目5番11号

6 登録品種の育成をした者の氏名

ロバート ノードリック

7 出願公表の年月日 平成19年2月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第18309号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 弓戸大山 (ユミダ[®]イソ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）はやや大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはかなり長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比は高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は9A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は8A、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は中生、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜上である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「弓戸大山」は、対照品種「精興光玉」と比較して、たく葉の大きさが小であること、葉の先端裂片の相対的な長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「精興の秋」と比較して、たく葉の大きさが小であること、舌状花の先端の形が丸であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

弓戸正道
広島県福山市新市町常2-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

弓戸正道

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18310号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 紅式部 (ヘニシキブ)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈はやや高、節間長はやや短、茎の太さはやや細、茎の色は紫、たく葉の大きさはやや小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉の縦横比はやや大、葉の光沢はやや弱、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉基部の形は円形、葉表面の色はやや淡、花房の形（スプレイぎくに限る）は円錐形、花の数（スプレイぎくに限る）はかなり多、舌状花の重ね（一重・八重の別）は一重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデイジータイプ、花の大きさ（スプレイぎく）は小、花の厚み（スプレイぎく）はかなり薄、花首の長さは短、花たくの形は盛り上がった円錐状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）は少、舌状花の向きは水平（±15度以内）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さは短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は平、外花弁の長さはかなり短、外花弁の最大幅は狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は71A、外花弁の裏面の色は72B、花盤の大きさ（八重品種を除く）は大、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄、花盤の中央暗色スポット（デイジー品種に限る）は無、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は小、管状花の長さ（開葯時）は短、生態分類型は夏、開花の早晚性は極晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「紅式部」は、対照品種「ともこ」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、花弁先端の形が丸であること等で区別性が認められる。対照品種「ももわか」と比較して、舌状花の主要な形が平弁であること、舌状花の花筒部の長さが短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京都府

京都府京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

6 登録品種の育成をした者の氏名

弓勢久美子 小野愛 竹本哲行

7 出願公表の年月日 平成19年5月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18311号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum yoshinaganthum Makino ex Kitam. ラパン

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈はかなり低、節間長はかなり短、茎の太さは細、茎の色は緑、たく葉の大きさは無、葉の着き方（着生方向）は水平、葉長は中、葉幅は狭、葉の縦横比は極大、葉の光沢は弱、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉基部の形は尖形、葉表面の色は淡、花房の形（スプレイぎくに限る）は平型、花の数（スプレイぎくに限る）は中、舌状花の重ね（一重・八重の別）は一重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデ이지ータイプ、花の大きさ（スプレイぎく）は小、花の厚み（スプレイぎく）はかなり薄、花首の長さは長、花たくの形は盛り上がった円錐状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）はやや少、舌状花の向きは水平（±15度以内）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さはかなり短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は平、外花弁の長さは短、外花弁の最大幅は狭、花弁先端の形は歯、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は155D、外花弁の裏面の色は155B、花盤の大きさ（八重品種を除く）は小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄、花盤の中央暗色スポット（デ이지ー品種に限る）は無、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は小、管状花の長さ（開葯時）はやや短、到花週数（周年生産品種に限る）は8.0週である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ラパン」は、対照品種ナカガワノギク（徳島県在来）と比較して、たく葉の大きさが無であること、葉の一次欠刻の深さがやや深であること、花粉の多さ（デ이지ー品種に限る）が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人香川大学
香川県高松市幸町1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

深井誠一

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18312号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 冬月 (トウゲツ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さはやや細、花茎の向きは直上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅はやや狭、ドーサルセパルの正面の形は披針形、ドーサルセパルの先端の形は鋭形、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテラルセパルの幅はやや狭、ラテラルセパルの正面の形は披針形、ラテラルセパルの先端の形は鋭形、セパルの中央部の色は13B、セパルの周縁の色は13B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは短、ペタルの幅は狭、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は12B、ペタルの周縁の色は12B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さはやや短、リップの幅はやや狭、リップの正面の形は台形、リップの先端の形は鋭形、リップの周縁の反転の強弱はかなり弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色は8B、リップの周縁の色は8B、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は有、リップの条線の色は12A、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「冬月」は、対照品種「イースタンバニー おぼろ月」と比較して、株の大きさが中であること、セパルの中央部の色が13Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第18313号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 療火 (かゝりび)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さはやや長、花茎の太さは中、花茎の向きは直上、花の咲き型は平咲、花の長さは中、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅はやや狭、ドーサルセパルの正面の形は披針形、ドーサルセパルの先端の形は鋭形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅はやや狭、ラテラルセパルの正面の形は披針形、ラテラルセパルの先端の形は鋭形、セパルの中央部の色は152C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は153C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は183A、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅は狭、ペタルの正面の形は広線形、ペタルの先端の形は鋭尖形、ペタルの中央部の色は163A、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は153C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は166A、リップの長さは中、リップの幅はやや狭、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色は2D、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は178B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色はN186C、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「療火」は、対照品種「イースタンモーニング 春色」と比較して、リップの縦断面の形がV型であること、リップの周縁の色が178Bであること、リップの斑点の大きさが小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第18314号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 夜桜 (ヨザクラ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは直上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅はやや狭、ドーサルセパルの正面の形は長楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鋭形、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテラルセパルの幅はやや狭、ラテラルセパルの正面の形は長楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鋭形、セパルの中央部の色は65B、セパルの周縁の色は65B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は59C、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅はやや狭、ペタルの正面の形は長楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は65B、ペタルの周縁の色は65B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は59C、リップの長さはやや長、リップの幅はやや狭、リップの正面の形は長三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色は155C、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は59C、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはやや小、リップの斑点の色は59A、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「夜桜」は、対照品種「エンザンソネット サクラルージュ」と比較して、花茎の向きが直上であること、リップのくさびの有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「コウシュウプリンセス チャングム」と比較して、花茎の向きが直上であること、リップの正面の形が長三角形であること、リップの縦断面の形がV型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第18315号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. ティラミス

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや大、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の数はやや多、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡はやや淡、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さはやや太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅は中、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは長、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鋭形、ラテラルセパルの長さはやや長、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鋭形、セパルの中央部の色は183A、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は172B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は183A、ペタルの長さはやや長、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は183A、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は172C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は183A、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は切型、リップの周縁の反転の強弱はかなり弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色は159B、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は164B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはやや小、リップの斑点の色は187A、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は187A、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ティラミス」は、対照品種「クスダ ストーン ガトーショコラ」と比較して、セパルの斑点の有無が無であること、ペタルの周縁の色が172Cであること、ペタルの斑点の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第18316号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 聖火 (セカ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さは中、花の幅はやや広、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は長楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は163B、セパルの周縁の色は163B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は166B、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は163B、ペタルの周縁の色は163B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は166A、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は中、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色は12B、リップの周縁の色は12B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色は59A、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は59A、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「聖火」は、対照品種「エンザン フォーレスト マジョリカ」と比較して、花の幅がやや広であること、リップの斑点の大きさが小であること、リップのくさびの有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第18317号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 夜想曲 (ヤソウキョク)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さはやや太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色はN144A、セパルの周縁の色はN144A、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はN144A、ペタルの周縁の色はN144A、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鋭形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色は155A、リップの周縁の色は155A、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色は59A、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は59A、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「夜想曲」は、対照品種「ラブリー バレー ピース イン ザ ワールド」と比較して、花の咲き型が部分抱・平咲であること、ペタルの中央部の色がN144Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第18318号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 苺の雫 (イチゴノシズク)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は中、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテラルセパルの幅はやや広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は65D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は64B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は64B、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅は中、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は65D、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は64B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は64B、リップの長さはやや長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は扁円形、リップの先端の形は切型、リップの周縁の反転の強弱は中、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色は155C、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は65C、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は60B、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は60B、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「苺の雫」は、対照品種「エンザン オベロン ジュレ」と比較して、セパルの周縁の色が64Bであること、リップの正面の形が扁円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第18319号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 伊都の神秘 (イトノシヒ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや多、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの正面の形は長楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鋭形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は長楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鋭形、セパルの中央部の色はN144D、セパルの周縁の色はN144D、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅は中、ペタルの正面の形は菱形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は145B、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色はN144D、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鋭形、リップの周縁の反転の強弱はかなり弱、リップの周縁の波打ちの強弱は中、リップの中央部の色は155B、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は65D、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色は61B、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は61B、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「伊都の神秘」は、対照品種「ラブリー バレー ピース イン ザ ワールド」と比較して、花の咲き型が部分抱・平咲であること、リップの斑点の色が61Bであること、リップのくさびの色が61Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

日高定輝

福岡県前原市前原西5丁目1-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

日高定輝

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第18320号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 絆 (キズナ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は長楕円形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡はやや濃、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅はかなり広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は144C、セパルの周縁の色は144C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は183C、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は144C、ペタルの周縁の色は144C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は183C、リップの長さはかなり長、リップの幅は広、リップの正面の形は扁円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色は4D、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は155B、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は59A、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「絆」は、対照品種「ラブリー バレー ピース イン ザ ワールド」と比較して、花の咲き型が抱咲であること、セパルの条線の有無が有であること、ペタルの条線の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「夜想曲」と比較して、セパルの条線の有無が有であること、ペタルの条線の有無が有であること、リップの正面の形が扁円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第18321号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. エンジェルムーン ラブレター

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さはやや細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の全体の形は狭楕円形、葉の緑色の程度は中、花序の着生位置は全体、花の位置は花柄に添う、1花茎の花数は中、花茎の長さはかなり短、花茎の太さはやや細、咲き型は抱え・平咲き、花の縦径は中、花の横径はやや広、花の香りの有無は無、ドーサルセパルの縦軸の湾曲は平、ドーサルセパルの正面の形は狭楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は極弱、ラテラルセパルの縦軸の湾曲は平、ラテラルセパルの正面の形は狭楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは弱、セパルの色彩模様はぼかし、セパルのぼかしの程度はやや大、セパルの地色は76D、セパルの模様の色はN78B、ペタルの縦軸の湾曲は平、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちは弱、ペタルの色彩模様はぼかし、ペタルのぼかしの程度はやや大、ペタルの地色は76D、ペタルの模様の色はN78B、全縁状リップの形は円形、全縁状リップの基部の重なりの有無は無、リップの先端の形はV型（小凹形）、リップの目の有無は有、リップの目の形はI型、リップの色彩模様はその他（爪班）、リップの地色は76D、リップの模様の色はN78B（爪班）、リップの目の色は15A、リップの喉部の色は16C、リップの周縁の波打ちは無又は弱、開花期は冬である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エンジェルムーン ラブレター」は、対照品種「ウェーブ・キング アケボノ」と比較して、セパルの模様の色がN78Bであること、ペタルの模様の色がN78Bであること、花粉のうの色が155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山本二郎
岡山県岡山市浜野一丁目12番30号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山本二郎

7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 3 2 2 号 平成 2 1 年 7 月 3 1 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dendrobium Sw. サクセスストーリー 恋のしずく (サクセスストーリー コイシズク)
- 3 登録品種の特性の概要
株の大きさは中、ぎ球茎の長さはかなり短、ぎ球茎の太さはかなり細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉の全体の形は狭楕円形、葉の緑色の程度は淡、花序の着生位置は全体、花の位置は花柄に添う、1 花茎の花数はやや少、花茎の長さはやや短、花茎の太さはかなり細、咲き型は抱え・平咲き、花の縦径はかなり短、花の横径は狭、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの縦軸の湾曲はやや内曲、ドーサルセパルの正面の形は卵形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は極弱、ラテラルセパルの縦軸の湾曲はやや外反、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無又は極弱、セパルの色彩模様はぼかし、セパルのぼかしの程度は大、セパルの地色は85D、セパルの模様の色はN78A、ペタルの縦軸の湾曲はやや内曲、ペタルの正面の形は狭楕円形、ペタルの周縁の波打ちは無又は極弱、ペタルの色彩模様はぼかし、ペタルのぼかしの程度は大、ペタルの地色は85D、ペタルの模様の色はN78A、リップの先端の形はⅢ型（微突切形）、リップの目の有無は無、リップの色彩模様は斑点、リップの地色は85D、リップの模様の色はN81B、リップの喉部の色は12B、リップの周縁の波打ちは無又は弱、開花期は春である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「サクセスストーリー 恋のしずく」は、対照品種「四万十 春の恋」と比較して、セパルのぼかしの程度が大であること、ペタルのぼかしの程度が大であること等で区別性が認められる。対照品種「星の恋」と比較して、リップの色彩模様が斑点であること、リップの地色が85Dであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
氏家正徳
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 8 月 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18323号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dioscorea L. やまじ王 (ヤマジ杓)

3 登録品種の特性の概要

草勢は中、つるの卷性は右、つるの断面の形は丸、つるの色は赤紫、葉の形は心臓、葉の大きさは小、葉の長さは短、葉幅は狭、葉脚部の窪みの深さは浅、葉の肩張りは狭、葉縁のくびれの程度は極小、葉色は淡緑、葉脚部葉柄の着色は有、対生葉位は中、むかごの着生程度は少、むかごの形状は球、むかごの大きさは小、むかごの色は褐、芋の外皮色は黒褐、芋の外皮の粗滑は粗、芋の形は球、芋の着生数は1、芋の長さは短、芋の首部の長さは極短、鬚根の多少は少、肉色は白、肉の粗密は密、粘度はやや強、変色性は弱、貯蔵性は高、早晚性は中である。出願品種「やまじ王」は、対照品種「新丹丸」と比較して、葉色が淡緑であることであること等で区別性が認められる。

対照品種「石川（在来種）」と比較して、萌芽の早晚性が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

愛媛県

愛媛県松山市一番町四丁目4番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名

玉置学 浅海英記

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第18324号 平成21年7月31日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Euphorbia hypericifolia L. インユーフェ
- 3 登録品種の特性の概要
草型は斜上、草丈は中、茎の緑色の濃淡は中、節間長はやや短、葉身の長さは短、葉身の幅は中、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は鈍形、葉身の基部の形は鈍形、葉の緑色の濃淡は濃、葉の斑の有無は無、葉柄の長さは中、花房の幅はやや狭、小花房の幅は中、花序の幅は中、ほう葉の長さは中、ほう葉の幅は狭、ほう葉の形は倒卵形、ほう葉の色は155Cである。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「インユーフェ」は、対照品種Euphorbia hypericifoliaと比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が弱であること、葉身の長さが短であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
ゲリー グルーバー
- 7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18325号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Eustoma russellianum (Hook.) G. Don 鳥海の舞 (チョウカイノマイ)

3 登録品種の特性の概要

草型はⅠ型、草丈はやや高、茎長はかなり長、茎の太さは太、茎の色は緑、節間長は中、分枝数は少、分枝の着生位置は上、葉形は卵円形、葉長はやや長、葉幅は広、葉色は濃緑、葉の着生角度は水平、花形は漏斗状、花の直径はやや小、花冠外面の色は黄白 3101、花冠内面底部の色は明黄緑 3504、花冠内面先端部の色は紫赤 9708、花冠内面中間部の色は黄白 3101、花冠内面下部の色は黄白 3101、ぼかしの有無は無、覆輪の有無は有、絞りの有無程度は無、花卉先端の形は円形、花卉のそりはやや外曲、花卉の波打ちの程度は中、花卉長はやや短、花卉幅はやや狭、花卉数は5、がくの形状は筒状、がく裂片の長さはやや短、がく裂片の幅はやや狭、雌ずいの形は正常、雄ずいの形は正常、花柄の太さは中、花柄の長さはやや長、花の香りは弱、開花の早晩性はかなり晩である。(カラーチャートはJHSを使用)

出願品種「鳥海の舞」は、対照品種「ドレミパステル」と比較して、葉の着生角度が水平であること、花柄の長さがやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「京の姫」と比較して、葉の着生角度が水平であること、花冠内面先端部の色が紫赤 9708であること等で区別性が認められる。対照品種「F1マイテ レディ」と比較して、草型がⅠ型であること、分枝の着生位置が上であること、花冠内面先端部の色が紫赤 9708であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小林金市
山形県東田川郡庄内町連枝字沼端123番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小林金市

7 出願公表の年月日 平成13年3月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第18326号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Eustoma russellianum (Hook.) G. Don シナノスノー

3 登録品種の特性の概要

草型はⅡ型、草丈は中、茎長はやや長、茎の太さは中、茎の色は濃緑、節間長は長、分枝数は中、分枝の着生位置は上中、葉形は狭卵円形、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉色は濃緑、葉の着生角度は斜上、花形は鐘状、花の直径は小、花冠外面の色は黄白 3301、花冠内面底部の色は黄緑 3311、花冠内面先端部の色は淡黄緑 3303、花冠内面中間部の色は黄白 3301、花冠内面下部の色は黄白 3301、ぼかしの有無は無、覆輪の有無は無、絞りの有無程度は無、花卉先端の形は円形、花卉のそりはやや外曲、花卉の波打ちの程度は低、花卉長はやや短、花卉幅はやや狭、花卉数は5、がくの形状は筒状、がく裂片の長さはやや短、がく裂片の幅は中、雌ずいの形は正常、雄ずいの形は正常、花柄の太さは中、花柄の長さは中、花の香りは弱、開花の早晩性は晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「シナノスノー」は、対照品種「サマースノー」と比較して、花形が鐘状であること等で区別性が認められる。対照品種「つくしの雪」と比較して、葉色が濃緑であること、花形が鐘状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮坂昌実 臼井富太 関功介 塚田元尚 塚田篤

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18327号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Eustoma russellianum (Hook.) G. Don シナノスカイ

3 登録品種の特性の概要

草型はⅡ型、草丈はやや高、茎長は長、茎の太さは中、茎の色は濃緑、節間長は長、分枝数は中、分枝の着生位置は上中、葉形は卵円形、葉長はやや短、葉幅は中、葉色は濃緑、葉の着生角度は斜上、花形は鐘状、花の直径はやや小、花冠外面の色は黄白 3301、花冠内面底部の色は黄緑 3512、花冠内面先端部の色は濃青味紫 8307、花冠内面中間部の色は黄白 3301、花冠内面下部の色は黄白 3301、ぼかしの有無は無、覆輪の有無は有、絞りの有無程度は無、花弁先端の形は円形、花弁のそりは外曲、花弁の波打ちの程度は中、花弁長は中、花弁幅はやや狭、花弁数は5、がくの形状は筒状、がく裂片の長さは中、がく裂片の幅は中、雌ずいの形は正常、雄ずいの形は正常、花柄の太さは中、花柄の長さはやや短、花の香りは弱、開花の早晩性は晩である。(カラーチャートはJHSを使用)

出願品種「シナノスカイ」は、対照品種「アロハブルーライン」と比較して、花冠内面先端部の色が濃青味紫 8307であること、花弁先端の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「ブルーピコティー北斗星」と比較して、花冠内面先端部の色が濃青味紫 8307であること、花弁長が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮坂昌実 臼井富太 関功介 塚田元尚 塚田篤

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18328号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Eustoma russellianum (Hook.) G. Don あさみ八重 (アサミヤエ)

3 登録品種の特性の概要

草型はⅢ型、草丈はやや高、茎長は長、茎の太さはかなり太、茎の色は緑、節間長は長、分枝数は多、分枝の着生位置は上中下、葉形は卵円形、葉長は長、葉幅はかなり広、葉色は淡緑、葉の着生角度は水平、花形は平碗状、花の直径は中、花冠外面の色は黄ピンク 0703、花冠内面底部の色は黄緑 3512、花冠内面先端部の色は紫赤 9714、花冠内面中間部の色は淡ピンク 0102、花冠内面下部の色は淡黄ピンク 1002、ぼかしの有無は無、覆輪の有無は無、絞りの有無程度は無、花卉先端の形は凹形、花卉のそりはやや外曲、花卉の波打ちの程度は中、花卉長はやや短、花卉幅は中、花卉数は11～20、がくの形状は杯状、がく裂片の長さはやや長、がく裂片の幅は中、雌ずいの形は正常、雄ずいの形は正常＋不完全弁化、花柄の太さは中、花柄の長さは中、花の香りは弱、開花の早晚性は晩である。(カラーチャートはJHSを使用)

出願品種「あさみ八重」は、対照品種「エクローサ ピンクフラッシュ」と比較して、葉形が卵円形であること、花冠内面中間部の色が淡ピンク 0102であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

秋田県

秋田県秋田市山王四丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

間藤正美 佐藤孝夫 檜森靖則 浅利幸男 柴田浩 後藤一見

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18329号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Eustoma russellianum (Hook.) G. Don シナノファンタジー

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、茎の太さは中、茎長はやや長、茎の緑色の程度は中、主茎の分枝数は中、分枝の位置は上部のみ、葉の茎への着生角度は斜上、葉長はやや短、葉幅は中、葉形は卵形、葉表面緑色の程度（ブルームを除く）は中、花のタイプはシングル、花の直径は小、花形は鐘形、花弁長はやや短、花弁幅は中、花弁先端の形は円形、花弁縁の波打ちは中、花弁縁のフリンジは弱く出る、花色数は複、花弁表面の地色（複色花）は浅緑黄 2904、花弁表面の二次色（複色花）は紫ピンク 9703、花弁二次色の相対的面積は小、花の模様（複色花）は濃淡、花弁裏面の地色（複色花）は淡緑黄 2903、花弁基部の色は緑、がくの長さはやや短、がくのアントシアニンの着色は無、花柄長は中、雌ずいの形はI型、開花始期は晩である。（カラーチャートはJHSを使用）

出願品種「シナノファンタジー」は、対照品種「レイニー オレンジ」と比較して、花の直径が小であること、花弁縁の波打ちが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮坂昌実 塚田篤 臼井富太 関功介 重盛勲

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 3 3 0 号 平成 2 1 年 7 月 3 1 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Eustoma russellianum (Hook.) G. Don 伊豆大島E3号 (イズオシマ E3ゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はやや低、茎の太さはやや細、茎長は中、茎の緑色の程度は中、主茎の分枝数は中、分枝の位置は上部のみ、葉の茎への着生角度は斜上、葉長は短、葉幅はやや狭、葉形は卵形、葉表面緑色の程度（ブルームを除く）は中、花のタイプはシングル、花の直径はやや小、花形は狭漏斗形、花弁長はやや短、花弁幅はやや狭、花弁先端の形は円形、花弁縁の波打ちは弱、花弁縁のフリンジは無又は極弱く出る、花色数は単、花弁表面の色（単色花）は紫ピンク 9703、花弁基部の色は紫、がくの長さはやや短、がくのアントシアニンの着色は無、花柄長はやや短、雌ずいの形はⅠ型、開花始期はやや晩である。（カラーチャートはJHSを使用）
出願品種「伊豆大島E3号」は、対照品種「キュート ピンク」と比較して、花弁表面の色（単色花）が紫ピンク 9703であること等で区別性が認められる。対照品種「ワールド ピンク」と比較して、草丈がやや低であること、花弁表面の色（単色花）が紫ピンク 9703であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
財団法人東京都農林水産振興財団
東京都立川市富士見町三丁目8番地1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
宮下千枝子 南晴文 栄森弘己
- 7 出願公表の年月日 平成 1 7 年 1 1 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18331号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Eustoma russellianum (Hook.) G. Don サンティアラピン

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、茎の太さはかなり細、茎長は極短、茎の緑色の程度は中、主茎の分枝数は中、分枝の位置は上～下部、葉の茎への着生角度は水平、葉長はかなり短、葉幅は極狭、葉形は卵形、葉表面緑色の程度（ブルームを除く）は中、花のタイプはシングル、花の直径は中、花形は平わん形、花弁長はやや短、花弁幅は狭、花弁先端の形は鋭形、花弁縁の波打ちは弱、花弁縁のフリンジは無又は極弱く出る、花色数は単、花弁表面の色（単色花）は76B、花弁基部の色は紫、がくの長さはやや短、がくのアントシアニンの着色は無、花柄長は長、雌ずいの形はI型、開花始期は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「サンティアラピン」は、対照品種「エクセル クールピンク」と比較して、花弁先端の形が鋭形であること、花弁表面の色（単色花）が76Bであること、がくのアントシアニンの着色が無であること等で区別性が認められる。対照品種「あずまの薫」と比較して、花弁先端の形が鋭形であること、花弁表面の色（単色花）が76Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都千代田区平河町二丁目13番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

岩城一考

7 出願公表の年月日 平成18年8月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第18332号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Eustoma russellianum (Hook.) G. Don エグゼパープル

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、茎の太さはやや太、茎長はかなり長、茎の緑色の程度は中、主茎の分枝数は多、分枝の位置は上～中部のみ、葉の茎への着生角度は水平、葉長はやや長、葉幅はかなり広、葉形は卵形、葉表面緑色の程度（ブルームを除く）は中、花のタイプはシングル、花の直径はやや小、花形は広漏斗形、花弁長は短、花弁幅は狭、花弁先端の形は鋭形、花弁縁の波打ちは弱、花弁縁のフリンジは無又は極弱く出る、花色数は単、花弁表面の色（単色花）はN87A、花弁基部の色は緑、がくの長さはやや短、がくのアントシアニンの着色は無、花柄長は中、雌ずいの形はI型、開花始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エグゼパープル」は、対照品種「イルミーブルー」と比較して、花形が広漏斗形であること、花弁先端の形が鋭形であること等で区別性が認められる。対照品種「ゆふのそよ風」と比較して、花形が広漏斗形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岐阜県

岐阜県岐阜市藪田南2丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇次原清尚 多田幸広 三輪俊貴

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18333号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Eustoma russellianum (Hook.) G. Don エグゼピンク

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、茎の太さは中、茎長は長、茎の緑色の程度は中、主茎の分枝数は中、分枝の位置は上～中部のみ、葉の茎への着生角度は水平、葉長は短、葉幅は中、葉形は卵形、葉表面緑色の程度（ブルームを除く）は中、花のタイプはシングル、花の直径はやや小、花形は広漏斗形、花弁長はやや短、花弁幅はやや狭、花弁先端の形は鋭形、花弁縁の波打ちは弱、花弁縁のフリンジは無又は極弱く出る、花色数は単、花弁表面の色（単色花）は68B、花弁基部の色は緑、がくの長さは短、がくのアントシアニンの着色は無、花柄長はやや短、雌ずいの形はI型、開花始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エグゼピンク」は、対照品種「イルミーローズ」と比較して、花形が広漏斗形であること、花弁長がやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「イルミーピンク」と比較して、花形が広漏斗形であること、花弁先端の形が鋭形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岐阜県

岐阜県岐阜市藪田南2丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇次原清尚 多田幸広 三輪俊貴

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18334号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Eustoma russellianum (Hook.) G. Don スマイルムーン

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、茎の太さは中、茎長は中、茎の緑色の程度は中、主茎の分枝数は少、分枝の位置は上～中部のみ、葉の茎への着生角度は斜上、葉長は中、葉幅は中、葉形は卵形、葉表面緑色の程度（ブルームを除く）は中、花のタイプはダブル、花弁数（ダブル品種のみ）は中、花の直径は中、花形は平わん形、花弁長はやや短、花弁幅は中、花弁先端の形は円形、花弁縁の波打ちは弱、花弁縁のフリンジは無又は極弱く出る、花色数は単、花弁表面の色（単色花）は157D、花弁基部の色は緑、がくの長さは中、がくのアントシアニンの着色は無、花柄長はやや短、雌ずいの形はI型、開花始期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「スマイルムーン」は、対照品種「セレモニームーン」と比較して、花弁数（ダブル品種のみ）が中であること、花形が平わん形であること、花弁長がやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福岡県
福岡県福岡市博多区東公園7番7号
田川農業協同組合
福岡県田川市大字伊田3550番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

山田明日香 黒柳直彦 松野孝敏 巢山拓郎 谷川孝弘 中村新一 國武利浩 坂井康弘 常盛一則

7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 3 3 5 号 平成 2 1 年 7 月 3 1 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
 Hippeastrum Herb. シンコウのレッド
- 3 登録品種の特性の概要
 葉の幅は中、花茎の長さはやや長、花茎の太さは中、花茎の基部のアントシアニン着色の有無は無、花序の花の数は中、花型は一重、小花梗の長さは小、花の正面の形は三角形、花の長さは長、花の直径は中、花の内面の主な色は45B、花の斑の模様は脈斑、雄ずいの色はN30A、やくの色は桃味、雌ずいの色は44Bである。（カラーチャートはRHSを使用）
 出願品種「シンコウのレッド」は、対照品種「オレンジスーベリアン」と比較して、花茎の基部のアントシアニン着色の有無が無であること、花の内面の主な色が45Bであること等で区別性が認められる。対照品種「コルディア」と比較して、花茎の長さがやや長であること、花の直径が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
 中村光信
 熊本県熊本市平田1丁目6番19号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
 中村光信
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 8 月 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18336号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hordeum L. トヨノカゼ

3 登録品種の特性の概要

叢性は中、株の開閉はやや閉、並渦性は渦、稈長は中、稈の細太はやや細、稈のワックスの多少は多、葉色はやや濃、葉鞘のワックスの多少は多、穂長はやや短、粒着の粗密はやや密、穂の抽出度は中、条性は六条、穂の下垂度は直、芒の有無と多少は中、芒長はやや長、ふの色は黄、粒の形(原麦粒)はやや円、粒の大小(原麦粒)はやや大、粒の色(原麦粒)は黄褐、千粒重(原麦粒)はやや大、リットル重(原麦粒)はやや大、原麦粒の見かけの品質は中の上、原麦白度はやや高、播性はV、出穂期は早、成熟期は早、粳・糯の別は粳、皮(裸)性は裸、脱ふ性は易、穂発芽性は難、脱粒性は難、耐倒伏性はやや強、耐凍上性は弱、粒質(ビール麦を除く)は粉質、精麦歩留(ビール麦を除く)は中、精麦白度(ビール麦を除く)は極大、しま萎縮病抵抗性はやや強、赤かび病抵抗性はやや弱、うどんこ病抵抗性は中である。

出願品種「トヨノカゼ」は、対照品種「イチバンボシ」と比較して、粒の形(原麦粒)がやや円であること、赤かび病抵抗性がやや弱であること等で区別性が認められる。対照品種「マンネンボシ」と比較して、葉色がやや濃であること、播性がVであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

柳澤貴司 高山敏之 高橋飛鳥 伊藤昌光 石川直幸 土門英司 藤田雅也 土井芳憲 杉浦誠 松中仁

7 出願公表の年月日 平成18年6月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第18337号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hypsizygus marmoreus (Peck) Bigelow NN-12

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は低、菌さんの断面の形は丸山形、菌さん表面の斑紋の多少は多、菌さん表面の斑紋の大小は中、菌さん表面の斑紋の分布状態は全体部分、菌さん表面の斑紋の明瞭度は普通、菌さんの大きさは小、菌さん表面の中央部の色は灰茶色、菌さん表面の周縁部の色は灰茶色、菌さんの厚さはかなり厚、菌さんの肉質は中、子実層たぐの並び方は正常、子実層たぐの幅は中、子実層たぐの密度は中、子実層たぐの色は淡橙黄色、菌柄の形は細長、菌柄の長さは極長、菌柄の太さはやや太、菌柄の色は黄白色、菌柄の毛の多少は無、菌柄の肉質は中、菌さん下径と菌柄最大径との比率はやや小、子実体の発生型は散状、最適培養期間は長、菌かき後の発生までの期間はやや長、原基形成最適温度はやや高、子実体の生育最適温度は中、子実体の収量はやや多、子実体の有効茎本数は多である。

出願品種「NN-12」は、対照品種「NN-11」と比較して、20℃での菌糸体の生長速度がかなり速であること、子実体の収量がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種「宝の華K-0259」と比較して、菌さん表面の斑紋の明瞭度が普通であること、菌さん表面の中央部の色が灰茶色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

社団法人長野県農村工業研究所
長野県須坂市大字須坂787番地1
中野市農業協同組合
長野県中野市三好町1丁目2番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮尾淳一 西澤賢一 小根澤秀人 市村昌紀

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第18338号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. KA-1227

3 登録品種の特性の概要

タイプの区分はリーフ、種子の色は黒、植物体の直径は中、結球性は不結球、葉の形は倒卵形、葉の色相は帯赤系、葉の色の濃淡は暗、葉の着色は有、葉の着色の強さは強、葉の着色の分布は部分、葉の光沢は中、葉の縮みの程度は強、葉の縮みの大きさは中、葉縁の波打ちは強、葉縁の切れ込みの深さは浅、早晩性はやや早である。

出願品種「KA-1227」は、対照品種「レッドコーラル」と比較して、葉縁の切れ込みの密度が中であること、葉身頂部の切れ込みタイプが深波状であること等で区別性が認められる。対照品種「晩抽サンブライトレタス」と比較して、種子の色が黒であること、子葉の着色が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番地12

6 登録品種の育成をした者の氏名

堀内可一 木村智幸

7 出願公表の年月日 平成19年9月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第18339号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lilium L. プチフレーズ

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、茎のアントシアニンの着色の有無は有、葉全体の形は披針形、葉数は中、葉序は螺旋、葉の着生角度は上向き、葉長はやや長、葉幅はかなり狭、葉の光沢は有、花序は総状花序、つぼみの形はⅢ型、花数は中、花全体の形はⅢ型、花径はやや小、花の着生角度は斜上、外花被の長さは短、外花被の幅はかなり狭、花被の表面の主な色は49C、花被の裏面の主な色は36C、花被の表面の色のタイプは複色、花被の表面の複色の位置（複色品種のみ）は基部、花被の表面の複色の色（複色品種のみ）は49B、内花被の斑点の有無は有、内花被の斑点の数は少、内花被の形はⅢ型、外花被の形はⅢ型、花被の乳頭状突起の有無は有、内花被の外反部の位置は先端部、内花被の外反の程度は弱、外花被の外反部の位置は全体、外花被の外反の程度は弱、花粉の色は赤褐、開花の早晚性はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「プチフレーズ」は、対照品種「シャンティ」と比較して、花径がやや小であること、花被の表面の主な色が49Cであること、花糸の主な色が白であること等で区別性が認められる。対照品種「トスカーネ」と比較して、花被の表面の主な色が49Cであること、花糸の主な色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山口県
山口県山口市滝町1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

光永拓司 松本哲朗 尾関仁志 藤田淳史

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第18340号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lilium L. プチブラン

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、茎のアントシアニンの着色の有無は無、葉全体の形は披針形、葉数は中、葉序は螺旋生、葉の着生角度は上向き、葉長は中、葉幅はかなり狭、葉の光沢は有、花序は散形花序、つぼみの形はⅢ型、花数は中、花全体の形はⅢ型、花径はやや小、花の着生角度は斜上、外花被の長さは短、外花被の幅はかなり狭、花被の表面の主な色は155C、花被の裏面の主な色は155B、花被の表面の色のタイプは単色、内花被の斑点の有無は有、内花被の斑点の数は極少、内花被の形はⅢ型、外花被の形はⅡ型、花被の乳頭状突起の有無は有、内花被の外反部の位置は先端部、内花被の外反の程度は弱、外花被の外反部の位置は先端部、外花被の外反の程度はやや弱、花粉の色は淡褐、開花の早晩性はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「プチブラン」は、対照品種「ジュネーブ」と比較して、花径がやや小であること、花被の表面の色のタイプが単色であること等で区別性が認められる。対照品種「ナバラ」と比較して、花径がやや小であること、柱頭の色が紫赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山口県

山口県山口市滝町1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

光永拓司 松本哲朗 尾関仁志 藤田淳史

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第18341号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lilium L. プチルナ

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、茎のアントシアニンの着色の有無は無、葉全体の形は披針形、葉数はやや多、葉序は螺旋生、葉の着生角度は上向き、葉長は中、葉幅はかなり狭、葉の光沢は有、花序は散形花序、つぼみの形はⅡ型、花数は多、花全体の形はⅢ型、花径は小、花の着生角度は斜上、外花被の長さは短、外花被の幅はかなり狭、花被の表面の主な色は9A、花被の裏面の主な色は7A、花被の表面の色のタイプは単色、内花被の斑点の有無は無、内花被の形はⅢ型、外花被の形はⅣ型、花被の乳頭状突起の有無は無、内花被の外反部の位置は先端部、内花被の外反の程度は中、外花被の外反部の位置は先端部、外花被の外反の程度は中、花粉の色は黄、開花の早晚性はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「プチルナ」は、対照品種「モナ」と比較して、花径が小であること、花粉の色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「ソレミーオ」と比較して、花径が小であること、内花被の斑点の有無が無であること、花粉の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山口県

山口県山口市滝町1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

光永拓司 松本哲朗 尾関仁志 藤田淳史

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第18342号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lilium L. プチロゼ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、茎のアントシアニンの着色の有無は無、葉全体の形は披針形、葉数はやや多、葉序は螺旋生、葉の着生角度は上向き、葉長はやや長、葉幅はかなり狭、葉の光沢は有、花序は総状花序、つぼみの形はⅢ型、花数は多、花全体の形はⅢ型、花径はやや小、花の着生角度は斜上、外花被の長さは短、外花被の幅はかなり狭、花被の表面の主な色は63C、花被の裏面の主な色は55B、花被の表面の色のタイプは複色、花被の表面の複色の位置（複色品種のみ）はその他、花被の表面の複色の色（複色品種のみ）はN66C、内花被の斑点の有無は無、内花被の形はⅢ型、外花被の形はⅢ型、花被の乳頭状突起の有無は無、内花被の外反部の位置は先端部、内花被の外反の程度は弱、外花被の外反部の位置は先端部、外花被の外反の程度は弱、花粉の色は橙、開花の早晚性はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「プチロゼ」は、対照品種「シャンティ」と比較して、花径がやや小であること、花被の表面の主な色が63Cであること、花糸の主な色が白であること等で区別性が認められる。対照品種「トスカーネ」と比較して、花被の表面の主な色が63Cであること、内花被の斑点の有無が無であること、花糸の主な色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山口県

山口県山口市滝町1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

光永拓司 松本哲朗 尾関仁志 藤田淳史

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第18343号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. ピンク シャーベット

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、花序の数は多、葉長はやや短、葉幅は中、葉の形は狭倒卵形、葉の色は中、葉の毛の有無は有、葉表面の毛の密度は粗、葉縁の波打ちは中、葉の切れ込みの有無は有、葉の切れ込みは中、葉柄の有無は有、葉柄の長さはかなり短、葉柄のアントシアニンの着色程度は無又は極弱、茎出葉の有無は無、花茎の長さは長、花茎の太さは中、花茎の毛の密度は無又は極粗、花茎の翼の幅はやや狭、花茎の翼の波打ちは弱、一次分枝のたく葉の長さは中、花序のタイプはⅡ型、花序の分枝の程度は無又は極弱、花序の分枝の方向は直立、花数は少、がくの長さは中、がくの直径はやや長、がくのタイプはⅡ・Ⅱ型、がくの色はN74C、がくの中肋の色はN155A、花冠の形はⅢ型、花冠の多少は少、花冠の大きさは中、花冠の色は150D、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ピンク シャーベット」は、対照品種「ダイメモピンク」と比較して、葉柄の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「ダイフラピンク」と比較して、葉幅が中であること、花茎の毛の密度が無又は極粗であること、花茎の翼の波打ちが弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Barberet & Blanc, S. A.
Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

森本正幸 原紀代美 高梨信朗

7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第18344号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lyophyllum shimeji (Kawamura) Hongo 新生108 (シンセイイチマルハチ)

3 登録品種の特性の概要

菌さんの断面は丸山形、菌さん表面のいぼは無、菌さんの大きさは中、菌さん表面の中央部の色は暗灰色、菌さん表面の周縁部の色は灰色、菌さん表面の模様は無、菌さんの厚さはやや薄、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率はやや小、子実層たくの色は淡灰色、子実層たくの並び方は波状・ちぢれ、子実層たくの密度は中、菌柄の形はとっくり型、菌柄の長さは短、菌柄の太さは細、菌柄の色は白色、菌柄の肉質は中、菌さん下の菌柄径と菌柄最大径の比率はかなり大、子実体の発生型は群状型、最適培養期間は極長、覆土の有無は有、発生までの期間は短、原基形成最適温度は中、収量は少、有効茎数はかなり少である。

出願品種「新生108」は、対照品種「NBRC100325」と比較して、菌さん表面の中央部の色が暗灰色であること、子実層たくの並び方が波状・ちぢれであること等で区別性が認められる。対照品種「野生種（秋田県産）」と比較して、菌さん表面のいぼが無であること、菌柄の形がとっくり型であること、菌柄の長さが短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ヤマサ醤油株式会社
千葉県銚子市新生町2丁目10番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河戸哲弥 横手豊 守谷正明

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18345号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. サイグロ

3 登録品種の特性の概要

樹のタイプは普通型、樹姿は中間、樹勢は中、枝梢の太さは中、節間長はやや短、皮目の大きさは中、皮目の多少は少、えき花芽の着生は多、葉身長は短、葉形(葉身長/葉身幅)は長、葉色は緑、たく葉の形は線形、たく葉の長さは短、葉柄の長さは中、葉柄の太さは中、花の大きさは中、花色は淡桃、花卉の形は長円、やくの色は淡黄、果形は扁円、王冠は弱、がくの開閉は中、がくあゝの深さは中、がくあゝの幅は中、こうあゝの深さは中、こうあゝの幅は中、果実の大きさは中、果皮の地色は黄、果皮を被う色は紫紅、果皮を被う色の量は多、果皮を被う色の型は少、さびの位置はこうあゝ、さびの量は多、さび状果点是有、果点の大きさは中、果点の密度は高、スカーフスキンは極少、果皮のろう質は少、果皮の粗滑の程度は滑、果梗の長さは中、果梗の太さは太、肉こうの有無は有、果心の形は平円、果心の大きさは中、果肉の色は黄白、果肉の褐変化は強、果肉の硬さは軟、肉質は中、蜜の多少は極少、甘味は中、酸味は弱、渋味は極弱、香気は中、果汁の多少は中、種子の形は倒卵、種子の大きさは中、発芽期は中、開花期は中、成熟期は中、結果の早晩はやや晩、後期落果は中、普通貯蔵は短、冷蔵貯蔵は短、心かびの発生は極少である。

出願品種「サイグロ」は、対照品種「ガラ」と比較して、果皮を被う色が紫紅であること、果皮を被う色の濃さが濃であること等で区別性が認められる。対照品種「スプレnder」と比較して、果点の密度が高であること、果肉の硬さが軟であること等で区別性が認められる。対照品種「ふじ」と比較して、果皮を被う色の濃さが濃であること、果肉の硬さが軟であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ザ ホーティカルチャー アンド フード リサーチ インスティテュート オブ
ニュージーランド リミティド
ニュージーランド オークランド プライベート バッグ 92 169 マウント ア
ルバート ロード 120 ホートリサーチ マウント アルバート

6 登録品種の育成をした者の氏名

アラン ホワイト ドン マッケンジー

7 出願公表の年月日 平成11年3月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18346号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. サイアーリー

3 登録品種の特性の概要

樹のタイプは普通型、樹姿は中間、樹勢は中、枝梢の太さは中、節間長は中、皮目の大きさは大、皮目の多少は多、えき花芽の着生は多、葉身長は長、葉形(葉身長/葉身幅)は長、葉色は緑、たく葉の形は鎌形、たく葉の長さは短、葉柄の長さは長、葉柄の太さは中、花の大きさは中、花色は淡桃、花卉の形は長円、やくの色は淡黄、果形は扁円錐、王冠は弱、がくの開閉は閉、がくあゝの深さは中、がくあゝの幅は中、こうあゝの深さは深、こうあゝの幅は広、果実の大きさは中、果皮の地色は黄緑、果皮を被う色は赤、果皮を被う色の量は中、果皮を被う色の型は少、さびの位置はこうあゝ、さびの量は中、さび状果点是有、果点の大きさは中、果点の密度は中、スカーフスキンは中、果皮のろう質は中、果皮の粗滑の程度は滑、果梗の長さは中、果梗の太さは太、肉こうの有無は有、果心の形は平円、果心の大きさは大、果肉の色は黄白、果肉の褐変化は強、果肉の硬さはやや硬、肉質は密、蜜の多少は極少、甘味は中、酸味は弱、渋味は極弱、香気は多、果汁の多少は中、種子の形は長円、種子の大きさは中、発芽期は中、開花期は中、成熟期は早、結果の早晩は中、後期落果は中、普通貯蔵は短、冷蔵貯蔵は短、心かびの発生は極少である。

出願品種「サイアーリー」は、対照品種「ガラ」と比較して、果形が扁円錐であること、果皮を被う色の濃さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「サイロス」と比較して、果形が扁円錐であること、肉質が密であること等で区別性が認められる。対照品種「ふじ」と比較して、肉質が密であること、成熟期が早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ザ ホーティカルチャー アンド フード リサーチ インスティテュート オブ
ニュージーランド リミティド
ニュージーランド オークランド プライベート バッグ 92 169 マウント アルバート
ロード 120 ホートリサーチ マウント アルバート

6 登録品種の育成をした者の氏名

アラン ホワイト ドン マッケンジー

7 出願公表の年月日 平成14年2月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18347号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. サイレッド

3 登録品種の特性の概要

樹のタイプは普通型、樹姿は中間、樹勢は中、枝梢の太さは中、節間長は中、皮目の大きさは中、皮目の多少は中、えき花芽の着生は少、葉身長は長、葉形(葉身長/葉身幅)はやや長、葉色は緑、たく葉の形は鎌形、たく葉の長さは短、葉柄の長さは中、葉柄の太さは中、花の大きさは中、花色は淡桃、花卉の形は長円、やくの色は淡黄、果形は扁円、王冠は弱、がくの開閉は開、がくあゝの深さは中、がくあゝの幅は中、こうあゝの深さは深、こうあゝの幅は広、果実の大きさは大、果皮の地色は黄、果皮を被う色は紫紅、果皮を被う色の量は多、果皮を被う色の型は少、さびの位置はこうあゝ、さびの量は中、さび状果点は有、果点の大きさは中、果点の密度は高、スカーフスキンは中、果皮のろう質は少、果皮の粗滑の程度は滑、果梗の長さは中、果梗の太さは太、肉こうの有無は有、果心の形は長楕円、果心の大きさは小、果肉の色は黄、果肉の褐変化は強、果肉の硬さは硬、肉質は中、蜜の多少は極少、甘味は高、酸味は弱、渋味は極弱、香気は少、果汁の多少は多、種子の形は倒卵、種子の大きさはやや大、発芽期は中、開花期は中、成熟期は晩、結果の早晩は中、後期落果は極少、普通貯蔵はやや長、冷蔵貯蔵はやや長、心かびの発生は極少である。

出願品種「サイレッド」は、対照品種「ガラ」と比較して、果皮を被う色が紫紅であること、果皮を被う色の濃さが濃であること等で区別性が認められる。対照品種「サイロス」と比較して、果皮を被う色の濃さが濃であること、果点の密度が高であること等で区別性が認められる。対照品種「ふじ」と比較して、果皮を被う色が紫紅であること、果点の密度が高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ザ ホーティカルチャー アンド フード リサーチ インスティテュート オブ
ニュージーランド リミティド
ニュージーランド オークランド プライベート バッグ 92 169 マウント アルバート
ロード 120 ホートリサーチ マウント アルバート

6 登録品種の育成をした者の氏名

アラン ホワイト ドン マッケンジー

7 出願公表の年月日 平成14年2月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18348号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. まっしぐら

3 登録品種の特性の概要

止葉葉身の姿勢（初期観察）は立、出穂期（50%出穂）はやや早、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）は短、主軸の長さはやや短、穂数はやや少、芒の分布は全体、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期はやや早、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾1000粒重は中、穎のフェノール反応は無、玄米の長さはやや短、玄米の幅は中、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は淡緑、稈の太さは太、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さはかなり短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、障害型耐冷性はやや強、穂発芽性は難、耐倒伏性は強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPi-a, i、穂いもちほ場抵抗性は強、葉いもちほ場抵抗性は強、蛋白質含量は中である。

出願品種「まっしぐら」は、対照品種「むつほまれ」と比較して、穂発芽性が難であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-a, iであること等で区別性が認められる。対照品種「ゆめあかり」と比較して、穂いもちほ場抵抗性が強であること、葉いもちほ場抵抗性が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

地方独立行政法人青森県産業技術センター
青森県黒石市田中82番地9

6 登録品種の育成をした者の氏名

三上泰正 川村陽一 前田一春 横山裕正 舘山元春 高舘正男 小林渡 中堀登
示光 小山田善三

7 出願公表の年月日 平成18年6月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第18349号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. ニュウヒカリ

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、出穂期（50%出穂）は中、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）は中、主軸の長さは中、穂数は中、芒の分布は先端のみ、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期は中、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾1000粒重は中、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は半円、玄米の色は白、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、柱頭の色は白、稈の太さは中、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さは極短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は半糯、胚乳のアミロース含量は2型、障害型耐冷性はやや弱、穂発芽性は難、耐倒伏性は中、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPi-ta2、穂いもちほ場抵抗性はやや弱、葉いもちほ場抵抗性はやや弱、白葉枯病抵抗性品種群別は金南風群、白葉枯病ほ場抵抗性は中、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型（+）、萎縮病抵抗性品種群別は感受性群、ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別は感受性群、トビイロウンカ抵抗性遺伝子型は+、蛋白質含量はやや低である。出願品種「ニュウヒカリ」は、対照品種「コシヒカリ」と比較して、胚乳のアミロース含量が2型であること、耐倒伏性が中であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-ta2であること等で区別性が認められる。

対照品種「ミルキークイーン」と比較して、障害型耐冷性がやや弱であること、耐倒伏性が中であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-ta2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福井県
福井県福井市大手3丁目17番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

堀内久満 富田桂 小林麻子 田中勲 寺田和弘 田野井真 見延敏幸 古田秀雄
山本明志 神田謹爾 篠山治恵 青木研一 正木伸武 南忠員 杉本明夫 鹿子嶋力 堀内謙一

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18350号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. ほしまる

3 登録品種の特性の概要

止葉葉身の姿勢（初期観察）は立、出穂期（50%出穂）は早、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）はやや短、主軸の長さはやや短、穂数は多、芒の分布は全体、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は黄、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期はやや早、穎色は黄白、護穎の長さは短、護穎の色は黄白、籾1000粒重はやや大、穎のフェノール反応は無、玄米の長さはやや長、玄米の幅はやや広、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、柱頭の色は白、稈の太さはやや細、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さは極短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、障害型耐冷性は強、出穂遅延型耐冷性はやや強、耐倒伏性はやや強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPi-a, i、穂いもちほ場抵抗性は中、葉いもちほ場抵抗性はやや弱、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型（+）、蛋白質含量はやや低である。

出願品種「ほしまる」は、対照品種「ゆきまる」と比較して、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-a, iであること等で区別性が認められる。対照品種「ほしたろう」と比較して、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-a, iであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北海道

北海道札幌市中央区北3条西6丁目

ホクレン農業協同組合連合会

北海道札幌市中央区北4条西1丁目

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤毅 木内均 木下雅文 沼尾吉則 吉村徹 佐々木忠雄 粕谷雅志 品田博史

相川宗厳 前川利彦 平山裕治 新発田修治 藤野賢治 高橋智美 菊地治己 田

中一生 丹野久 新橋登

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18351号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 萌えみのり (モエミリ)

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、出穂期（50%出穂）はやや晩、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）は短、主軸の長さは中、穂数はやや多、芒の分布は上半分のみ、外穎の毛茸の多少(小穂)は中、外穎先端の色（ふ先色）(小穂)は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期はやや晩、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾1000粒重はやや小、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、柱頭の色は白、稈の太さは中、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さはやや短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、障害型耐冷性は強、穂発芽性は難、耐倒伏性は強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPi-a, i、穂いもちほ場抵抗性は中、葉いもちほ場抵抗性はやや弱、白葉枯病ほ場抵抗性は中、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型(+)、蛋白質含量はやや低である。

出願品種「萌えみのり」は、対照品種「ひとめぼれ」と比較して、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）が短であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-a, iであること等で区別性が認められる。対照品種「はえぬき」と比較して、穂発芽性が難であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

山口誠之 滝田正 片岡知守 遠藤貴司 中込弘二 横上晴郁 加藤浩

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18352号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. タチアオバ (タチアハ)

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、出穂期（50%出穂）は極晩、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）は極長、主軸の長さは長、穂数は少、芒の分布は先端のみ、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は褐、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期は極晩、穎色は黄白、護穎の長さは短、護穎の色は黄白、籾1000粒重は中、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、稈の太さは太、芒は有、最長芒の長さはやや長、胚乳の型は粳、穂発芽性は中、耐倒伏性は極強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPi-a, i、穂いもちほ場抵抗性はやや強、葉いもちほ場抵抗性は中、白葉枯病抵抗性品種群別は金南風群、白葉枯病ほ場抵抗性はやや弱、しま葉枯病抵抗性品種群別は外国稲型（St2i）である。

出願品種「タチアオバ」は、対照品種「ミナミヒカリ」と比較して、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）が極長であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-a, iであること等で区別性が認められる。対照品種「ニシホマレ」と比較して、出穂期（50%出穂）が極晩であること、主軸の長さが長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂井真 岡本正弘 田村克徳 梶亮太 溝淵律子 平林秀介 深浦壮一 八木忠之
西村実

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18353号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. タヤけもち (ㇿやけもち)

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、出穂期（50%出穂）は早、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）は短、主軸の長さはやや長、穂数はやや少、芒の分布は全体、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は紫、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期は早、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は紫、籾1000粒重は中、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は半円、玄米の色は赤、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、柱頭の色は白、稈の太さは中、芒は有、芒の色（初期観察）は紫、最長芒の長さは短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は糯、胚乳のアミロース含量は1型、障害型耐冷性は強、穂発芽性は中、耐倒伏性は強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型は+、穂いもちほ場抵抗性はやや弱、葉いもちほ場抵抗性はやや弱、白葉枯病ほ場抵抗性はやや弱、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型（+）である。

出願品種「タヤけもち」は、対照品種「紅衣」と比較して、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）が紫であること、胚乳の型が糯であること等で区別性が認められる。対照品種「たつこもち」と比較して、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）が紫であること、玄米の色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

山口誠之 滝田正 片岡知守 遠藤貴司 中込弘二 横上晴郁 加藤浩

7 出願公表の年月日 平成18年12月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18354号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. コシヒカリ関東HD1号 (コシヒカリトウエイチデイチゴリ)

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、出穂期（50%出穂）は極早、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）はやや長、主軸の長さはやや短、穂数は多、芒の分布は先端のみ、外穎の毛茸の多少(小穂)は中、外穎先端の色（ふ先色）(小穂)は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期はかなり早、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾1000粒重は中、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度はやや濃緑、稈の太さは中、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さは短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、穂発芽性は極難、耐倒伏性は弱、脱粒性は難である。

出願品種「コシヒカリ関東HD1号」は、対照品種「ヒカリッコ」と比較して、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）がやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「コシヒカリえいち3号」と比較して、成熟期がかなり早であること等で区別性が認められる。対照品種「コシヒカリ」と比較して、出穂期（50%出穂）が極早であること、穂数が多いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

独立行政法人農業生物資源研究所

茨城県つくば市観音台二丁目1番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名

竹内善信 安東郁男 井邊時雄 太田久稔 佐藤宏之 平山正賢 加藤浩 根本博

平林秀介 出田収 坂井真 青木法明 矢野昌裕 田口文緒 蛭谷武志 山本敏央

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18355号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Group ピンク パンサー

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは水平、葉の表面の色は黄緑、花序の型は総状、花序の花数は少、花型は平咲、花の縦径はやや長、花の横径はやや広、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は卵形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様は覆輪、脈斑、網斑、ドーサルセパルの地色はN74C、ドーサルセパルの模様の色は85D（覆輪）、N74A（脈斑、網斑）、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様は覆輪、脈斑、網斑、ラテラルセパルの地色はN74C、ラテラルセパルの模様の色は85D（覆輪）、N74A（脈斑、網斑）、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様は覆輪、脈斑、網斑、ペタルの地色はN74C、ペタルの模様の色は85D（覆輪）、N74A（脈斑、網斑）、リップの中央裂片の正面の形は半円形、リップの中央裂片の地色はN74C、リップの中央裂片の模様は覆輪、脈斑、網斑、リップの中央裂片の模様の色は85D（覆輪）、N74A（脈斑、網斑）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ピンク パンサー」は、対照品種「Mae Hitch」と比較して、リップの側裂片がないこと、リップの中央裂片の地色がN74Cであること等で区別性が認められる。対照品種「Kathy Sagaert」と比較して、ドーサルセパルの地色がN74Cであること、ペタルの地色がN74Cであること、リップの側裂片がないこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

渡邊武夫

栃木県下都賀郡都賀町大字家中2971番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

渡邊武夫 シェルダン タカサキ

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 3 5 6 号 平成 2 1 年 7 月 3 1 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pinus thunbergii Parl. 虹青 (コウセイ)
- 3 登録品種の特性の概要
樹形は単幹状、樹冠形は円錐体、幹の通直性は直、幹の完満性は完満、樹脂の多少は多、樹皮の色は褐、樹皮のき裂紋様は網、枝の太さは太、枝の長さは長、枝の着生角度は開張、針葉の長さは長、針葉の幅は細、針葉のねじれは中、針葉の曲りは弱である。
出願品種「虹青」は、対照品種「荒雄」と比較して、針葉の長さが長であること等で区別性が認められる。対照品種「波方ク-37-32」と比較して、枝の着生角度が開張であること、針葉の長さが長であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
佐賀県
佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
宮崎潤二 灰塚敏郎 馬場信貴 石松誠
- 7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 1 0 月 2 5 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 3 5 7 号 平成 2 1 年 7 月 3 1 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Ranunculus L. ラズベリル
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は高、葉高は高、株幅は広、葉の数は多、複葉の形式は3回3出、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉柄の長さは短、葉の表面の色は137B、花茎の本数は多、花茎の長さはかなり長、花茎の太さは中、花茎の色は143B、一花茎の花数はやや多、花形はピオーネ咲き、花弁の重ねは八重、花弁の数は中、花の大きさはやや小、花弁の形はⅡ型、花弁の長さは中、花弁の幅は中、花弁周辺部の切れ込みは無、花弁周辺部の波打ちは弱、花弁のしわはかなり少、花弁の内面の色はN57C、花弁の外面の色はN57C、花弁の単色、複色の別は単色、葯の色はN186A、柱頭部の色はN79A、がく片の大きさは短、がく片の色は137C、開花期は早、繁殖法は栄養繁殖である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ラズベリル」は、対照品種「エムピンク」と比較して、花弁の内面の色がN57Cであること、花弁の外面の色がN57Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
宮崎県
宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
八反田憲生 井上美樹 中村広 郡司定雄 本田由美子
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 3 月 4 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18358号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Saccharum L. NiH25

3 登録品種の特性の概要

草型は中葉、葉身長は中、葉幅はやや広、葉色は濃、葉鞘の長さは中、葉鞘のろう質物
は中、肥厚帯の形態は三角型、葉耳の形態は槍型、葉舌の形態は帯型、蔗茎の形態は
円筒型、蔗茎の基本色は黄緑、蔗茎の複色は緑、蔗茎のろう質物が多、茎肉の色は黄
緑、ずい孔率は小、気根発生節数は少、茎皮の硬度は中、芽子の形態は広翼円型、芽子
の突出度はやや凸、芽子の大きさは大、芽翼は中、芽溝の有無は無、根基の条数は三
条、根帯の幅は中、原料茎長は長、茎径(原料茎)はやや太、原料茎の均一性は中、原料
茎の直立性は中間、発芽性はやや不良、発芽の遅速性は中、萌芽性はやや不良、萌芽の
遅速性は中、分げつ性は中、初期伸長性はかなり強、地域適応性は中、出穂性はかなり
少、出穂の早晚性は晩、登熟性はやや早、梢頭部折損性は中、倒伏度は多、脱葉性は
中、収量構成型は茎重型、蔗茎の収量性は多、糖分は高、黒穂病抵抗性は弱である。

出願品種「NiH25」は、対照品種「NiF8」と比較して、初期伸長性がかなり強である
こと、出穂性がかなり少であること、出穂の早晚性が晩であること等で区別性が認めら
れる。対照品種「Nco310」と比較して、茎肉の色が黄緑であること、初期伸長性がかな
り強であること、収量構成型が茎重型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県

沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮城克浩 謝花治 内藤孝 崎山澄寿 伊禮信 太郎良和彦 仲宗根盛雄 金城鉄
男 大城良計 出花幸之介 島袋正樹 恵飛須則明 正田守幸 儀間靖

7 出願公表の年月日 平成20年1月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第18359号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Saccharum L. Ni26

3 登録品種の特性の概要

草型はやや立葉、葉身長はやや長、葉幅は中、葉色は中、葉鞘の長さは中、葉鞘のろう質物は中、肥厚帯の形態は角ばった三角型、葉耳の形態は槍型、葉舌の形態は三日月型、蔗茎の形態は糸巻型、蔗茎の基本色は黄緑、蔗茎の複色は褐、蔗茎のろう質物は多、茎肉の色はクリーム、ずい孔率は小、気根発生節数はかなり少、茎皮の硬度は硬、芽子の形態は広翼円型、中央に芽孔のある卵型（広翼円型）、芽子の突出度はやや凸、芽子の大きさはやや小、芽翼はやや狭、芽溝の有無は無、根基の条数は三条、根帯の幅は中、原料茎長はやや長、茎径(原料茎)は中、原料茎の均一性は中、原料茎の直立性は中間、発芽性は中、発芽の遅速性は中、萌芽性は中、萌芽の遅速性は中、分げつ性はやや強、初期伸長性は中、地域適応性は中、出穂性は中、登熟性は早、梢頭部折損性は難、倒伏度は中、脱葉性は中、収量構成型は中間型、蔗茎の収量性は多、糖分は高、黒穂病抵抗性は弱である。

出願品種「Ni26」は、対照品種「F161」と比較して、蔗茎の形態が糸巻型であること、糖分が高であること、黒穂病抵抗性が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「Nco310」と比較して、蔗茎の形態が糸巻型であること、糖分が高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県

沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮城克浩 謝花治 内藤孝 崎山澄寿 伊禮信 太郎良和彦 仲宗根盛雄 前田剛
希 金城鉄男

7 出願公表の年月日 平成20年1月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第18360号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Scutellaria costaricana H. Wendl. GARBO

3 登録品種の特性の概要

草型は直立、草丈はやや高、茎の太さは太、茎の色は紫褐、分枝性は極少、節間長はやや長、葉全体の形は楕円形、葉の基部の形は心形、葉縁鋸歯の型はまばら型、葉身長は長、葉身幅は広、葉表面の地色は緑、葉表面の斑の有無は無、葉裏面の色は緑、葉裏面葉脈のアントシアニン着色の有無は有、葉柄の長さは長、花序の形は総状花序、開花した花の向きは多方向、花序の長さはやや長、花序の幅は広、花冠の長さは長、花冠の幅は広、上唇弁外面の主たる色は25A、上唇弁外面の複色の有無は有、上唇弁外面の複色模様の種類はぼかし、上唇弁外面の複色模様の色は13B、下唇弁内面の地色は7B、下唇弁内面の複色の有無は無、がくの長さは中、がくの色は緑、花数は多である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「GARBO」は、対照品種「フレーム」と比較して、上唇弁外面の主たる色が25Aであること、下唇弁内面の地色が7Bであること等で区別性が認められる。対照品種「スカーレット」と比較して、上唇弁外面の主たる色が25Aであること、下唇弁内面の地色が7Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Sunny Gronnegyden Aps
Gronnegyden 148, Lumby, 5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Bjarne Nyholm Larsen

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 3 6 1 号 平成 2 1 年 7 月 3 1 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Sparassis crispa Wulf.: Fr. KSC-03号 (KSC-03コ`リ)
- 3 登録品種の特性の概要
子実体の径は中、子実体の高さは中、菌柄の色はその他（淡橙黄）、菌柄の厚さは中、菌柄の肉質は中、枝の多少は少、花卉の形（先端部の形状）はハボタン状、枝の色はその他（淡橙黄）、枝の厚さは中、枝の肉質は中、発生型は周辺発生、発生最適温度は中、生育最適温度は中、発生最盛期までの期間は中、発生操作から収穫までの期間は中、収量はやや多である。
出願品種「KSC-03号」は、対照品種「NBRC-102492」と比較して、菌柄の色がその他（淡橙黄）であること、枝の色がその他（淡橙黄）であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社かつらぎ産業
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町2244番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
久保貴弘 南智子
- 7 出願公表の年月日 平成 1 7 年 8 月 1 0 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18362号 平成21年7月31日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Sparassis crispa Wulf.: Fr. KSC-H2号 (KSC-H2コウリ)

3 登録品種の特性の概要

子実体の径はやや大、子実体の高さはやや高、菌柄の色はその他（淡橙黄）、菌柄の厚さは中、菌柄の肉質は中、枝の多少はやや少、花弁の形（先端部の形状）はハボタン状、枝の色はその他（淡橙黄）、枝の厚さは中、枝の肉質は中、発生型は全面発生、発生最適温度は中、生育最適温度は中、発生最盛期までの期間はやや短、発生操作から収穫までの期間は中、収量は中である。

出願品種「KSC-H2号」は、対照品種「KSC-03号」と比較して、発生型が全面発生であること等で区別性が認められる。対照品種「NBRC-102492」と比較して、菌柄の色がその他（淡橙黄）であること、枝の色がその他（淡橙黄）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社かつらぎ産業
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町2244番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

久保貴弘

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日