1 品種登録の番号及び年月日 第19305号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Arachis hypogaea L. おおまさり

3 登録品種の特性の概要

草型は中間型Ⅱ、主茎長は中、分枝長は中、小葉の形は長、葉色は淡緑、花色は黄、莢の長さはかなり長、莢の幅は広、1莢内粒数は少、粒形はやや長形、種皮の斑紋は無、種皮の色は淡橙褐、粒重は大の大、開花期は中、成熟期は晩、倒伏抵抗性は弱、粗脂肪含有率は低、茎腐病抵抗性は弱である。

出願品種「おおまさり」は、対照品種「ナカテユタカ」と比較して、主茎長が中であること、粒重が大の大であること、粗脂肪含有率が低であること等で区別性が認められる。対照品種「千葉半立」と比較して、主茎長が中であること、粒重が大の大であること、粗脂肪含有率が低であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千葉県
千葉県千葉市中央区市場町1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

岩田義治 清島浩之 長谷川誠 松田隆志 鈴木一男 曾良久男 新堀有香里

7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19306号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Aster L. キエスTRBL

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、分枝の向きは水平、分枝の粗密は密、茎の節間のアントシアニン着色の有無は無、葉の形は線形、葉の長さはかなり短、葉の幅（線形又は楕円形の葉に限る）は中、葉の鋸歯の分布は縁上部、葉の緑色の濃淡は緑、葉のアントシアニン着色の有無は無、頭花の分布は茎に沿って分布、舌状花の重ねは2、舌状花の数（舌状花の重ねが1又は2列の頭花に限る）は多、頭花の直径はやや大、舌状花の長さは中、舌状花の形は狭楕円形、舌状花の向きは水平、舌状花の縦断面の曲がり平、舌状花の頂部の曲がり平、舌状花の横断面の形は平、舌状花の先端の形は円形、舌状花の先端の鋸歯の有無は無、舌状花の表面の色はN87B、舌状花の色の濃淡の分布は均一に分布、総ほうの形は鐘形、総ほう片の付き方は離れる、総ほう片の重なるの強弱は中、花盤の直径は中、花盤の色は黄、管状花の形（花盤のある品種に限る）はロート形、管状花の花冠裂片の先端の形（花盤のある品種に限る）は鋭形、管状花の花冠裂片の色（花盤のある品種に限る）は帯黄、開花始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「キエスTRBL」は、対照品種「ファーストラブ」と比較して、舌状花の縦断面の曲がり平であること、舌状花の表面の色がN87Bであること、開花始期がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「ブルービーム」と比較して、葉の形が線形であること、舌状花の色の濃淡の分布が均一に分布であること、開花始期がやや早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン

愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

アンドレア ニダランダー

7 出願公表の年月日 平成19年2月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第19307号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Avena sativa L. 韋駄天 (イダテン)

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、出穂期はかなり早、茎の最上節の毛の有無は無、穂の分枝の向きは水平、えいの白粉の多少は無又は極少、えいの長さはやや短、乳熟期の内粒の外えいの白粉の多少は無又は極少、草丈はかなり低、穂の長さは短、原麦粒の殻の有無は有、第一えい果の基部ののぎの着生の多少は多、第一えい果の外えいの長さはやや短、原麦粒の外えいの色は茶、まき性は春まき性である。

出願品種「韋駄天」は、対照品種「隼」と比較して、茎の最上節の毛の有無が無であること、穂の長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「アキワセ」と比較して、出穂期がかなり早であること、穂の長さが短であること、原麦粒の外えいの色が茶であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌1条5丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

木下剛仁 細田尚次 岩田康男 八谷寿

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第19308号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calendula L. オレン

3 登録品種の特性の概要

草型は斜状、株の高さは低、花茎長はかなり短、茎の太さはかなり細、葉序は互生、葉の着生角度は斜上、葉形は倒披針形、葉先端の形は微突形、葉基部の形は鋭形脚、葉の欠刻は少、葉長はかなり短、葉幅はかなり狭、葉色は濃緑、花数はかなり少、花形は二重咲、花容は斜上、花の大きさは小、舌状花の重ねの程度は低、舌状花数はかなり少、管状花部の大きさは小、花弁全体の形は線形、花弁先端の形は波状形、花弁の長さの中、花弁の幅は狭、花弁の複色の有無は有、花弁表側の色は24A（地色）、14A（基部）、花弁裏側の色は23A（地色）、13A（基部）、花の中心部の色は黄、総ほうの直径はかなり小、花柄の長さはやや長である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「オレン」は、対照品種「ファッションサニーオレンジ」と比較して、花茎長がかなり短であること、花弁表側の色が24A（地色）、14A（基部）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岐阜県

岐阜県岐阜市藪田南2丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇次原清尚 鈴木尚司

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第19309号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calendula L. オレア

3 登録品種の特性の概要

草型は斜状、株の高さは低、花茎長はかなり短、茎の太さはかなり細、葉序は互生、葉の着生角度は斜上、葉形は倒披針形、葉先端の形は微突形、葉基部の形は鋭形脚、葉の欠刻は少、葉長はかなり短、葉幅はかなり狭、葉色は緑、花数は少、花形は二重咲、花容は斜上、花の大きさはやや小、舌状花の重ねの程度は低、舌状花数はかなり少、管状花部の大きさはやや小、花弁全体の形は線形、花弁先端の形は波状形、花弁の長さはやや長、花弁の幅は狭、花弁の複色の有無は有、花弁表側の色は25A（地色）、14A（基部）、花弁裏側の色は24A（地色）、14A（基部）、花の中心部の色は赤紫、総ほうの直径は小、花柄の長さは長である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「オレア」は、対照品種「ファッションサニーオレンジ」と比較して、花茎長がかなり短であること、花の中心部の色が赤紫であること等で区別性が認められる。対照品種「オレン」と比較して、花の中心部の色が赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岐阜県

岐阜県岐阜市藪田南2丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇次原清尚 鈴木尚司

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第19310号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calendula L. ミルク

3 登録品種の特性の概要

草型はやや斜状、株の高さは低、花茎長はかなり短、茎の太さはかなり細、葉序は互生、葉の着生角度は斜上、葉形はへら形、葉先端の形は微突形、葉基部の形は鋭形脚、葉の欠刻はかなり少、葉長はかなり短、葉幅は極狭、葉色は濃緑、花数はかなり少、花形は二重咲、花容は斜上、花の大きさは小、舌状花の重ねの程度は低、舌状花数はかなり少、管状花部の大きさは小、花弁全体の形は線形、花弁先端の形は波状形、花弁の長さはやや短、花弁の幅は狭、花弁の複色の有無は有、花弁表側の色は13D（地色）、9C（基部）、花弁裏側の色は12A、花の中心部の色は黄、総ほうの直径はかなり小、花柄の長さはやや短である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミルク」は、対照品種「レモンデージー」と比較して、花の大きさが小であること、花弁表側の色が13D（地色）、9C（基部）であること等で区別性が認められる。対照品種「ウインターサン」と比較して、花茎長がかなり短であること、花弁表側の色が13D（地色）、9C（基部）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岐阜県

岐阜県岐阜市藪田南2丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇次原清尚 鈴木尚司

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第19311号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calendula L. レモア

3 登録品種の特性の概要

草型は斜状、株の高さは低、花茎長はかなり短、茎の太さはかなり細、葉序は互生、葉の着生角度は斜上、葉形はへら形、葉先端の形は微突形、葉基部の形は鋭形脚、葉の欠刻はかなり少、葉長はかなり短、葉幅はかなり狭、葉色は濃緑、花数は少、花形は二重咲、花容は斜上、花の大きさはやや小、舌状花の重ねの程度は低、舌状花数はかなり少、管状花部の大きさはやや小、花弁全体の形は線形、花弁先端の形は波状形、花弁の長さは中、花弁の幅はやや狭、花弁の複色の有無は有、花弁表側の色は14A（地色）、8A（基部）、花弁裏側の色は14A（地色、先端部赤）、7C（縁部、基部）、花の中心部の色は赤紫、総ほうの直径は小、花柄の長さはやや短である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「レモア」は、対照品種「ミルク」と比較して、花弁表側の色が14A（地色）、8A（中央縁部）であること、花の中心部の色が赤紫であること等で区別性が認められる。対照品種「ウインターサン」と比較して、花弁の複色の有無が有であること、花の中心部の色が赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岐阜県
岐阜県岐阜市藪田南2丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇次原清尚 鈴村尚司

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第19312号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calendula L. レスカ

3 登録品種の特性の概要

草型は斜状、株の高さはやや低、花茎長はかなり短、茎の太さはかなり細、葉序は互生、葉の着生角度は斜上、葉形は砲弾形、葉先端の形は微突形、葉基部の形は鋭形脚、葉の欠刻はかなり少、葉長はかなり短、葉幅はかなり狭、葉色は緑、花数は少、花形は二重咲、花容は斜上、花の大きさは小、舌状花の重ねの程度は低、舌状花数はかなり少、管状花部の大きさは中、花弁全体の形は線形、花弁先端の形は波状形、花弁の長さの中、花弁の幅は中、花弁の複色の有無は有、花弁表側の色は10C（地色）、17A（先端部）、13A（基部）、花弁裏側の色は17A（地色）、12D（中央縁部）、花の中心部の色は黄、総ほうの直径は小、花柄の長さはやや短である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「レスカ」は、対照品種「ミルク」と比較して、花弁表側の色が10C（地色）、17A（先端部）、13A（基部）であること等で区別性が認められる。対照品種「レモア」と比較して、花弁表側の色が10C（地色）、17A（先端部）、13A（基部）であること、花の中心部の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岐阜県

岐阜県岐阜市藪田南2丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇次原清尚 鈴木尚司

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第19313号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calendula L. オスカ

3 登録品種の特性の概要

草型はやや斜状、株の高さは低、花茎長は短、茎の太さはかなり細、葉序は互生、葉の着生角度は斜上、葉形は砲弾形、葉先端の形は微突形、葉基部の形は鋭形脚、葉の欠刻は少、葉長はかなり短、葉幅はかなり狭、葉色は緑、花数は少、花形は二重咲、花容は斜上、花の大きさはやや小、舌状花の重ねの程度は低、舌状花数はかなり少、管状花部の大きさは中、花弁全体の形は線形、花弁先端の形は波状形、花弁の長さはやや短、花弁の幅は狭、花弁の複色の有無は有、花弁表側の色は7C（地色）、24A（先端部）、花弁裏側の色は23A（地色）、13A（基部）、花の中心部の色は黄、総ほうの直径は小、花柄の長さは長である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「オスカ」は、対照品種「オレン」と比較して、花弁表側の色が7C（地色）、24A（先端部）であること等で区別性が認められる。対照品種「レスカ」と比較して、花弁表側の色が7C（地色）、24A（先端部）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岐阜県

岐阜県岐阜市藪田南2丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇次原清尚 鈴木尚司

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第19314号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calendula L. エロア

3 登録品種の特性の概要

草型はやや斜状、株の高さは低、花茎長はかなり短、茎の太さはかなり細、葉序は互生、葉の着生角度は斜上、葉形は倒披針形、葉先端の形は微突形、葉基部の形は鋭形脚、葉の欠刻は少、葉長はかなり短、葉幅はかなり狭、葉色は緑、花数は少、花形は二重咲、花容は水平、花の大きさはやや小、舌状花の重ねの程度は低、舌状花数はかなり少、管状花部の大きさは小、花弁全体の形は線形、花弁先端の形は波状形、花弁の長さの中、花弁の幅は狭、花弁の複色の有無は無、花弁表側の色は7A、花弁裏側の色は7A（先端部赤）、花の中心部の色は赤紫、総ほうの直径は小、花柄の長さはやや長である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エロア」は、対照品種「レモア」と比較して、花弁表側の色が7Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ウインターサン」と比較して、花の中心部の色が赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岐阜県

岐阜県岐阜市藪田南2丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇次原清尚 鈴木尚司

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第19315号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calendula L. エロー

3 登録品種の特性の概要

草型はやや斜上、株の高さはかなり低、花茎長はかなり短、茎の太さはかなり細、葉序は互生、葉の着生角度は斜上、葉形は倒披針形、葉先端の形は微突形、葉基部の形は鋭形脚、葉の欠刻は少、葉長はかなり短、葉幅はかなり狭、葉色は緑、花数はかなり少、花形は二重咲、花容は斜上、花の大きさはやや小、舌状花の重ねの程度は低、舌状花数はかなり少、管状花部の大きさは小、花弁全体の形は線形、花弁先端の形は波状形、花弁の長さは中、花弁の幅は狭、花弁の複色の有無は有、花弁表側の色は9A（地色）、13A（中央帯状）、花弁裏側の色は9A、花の中心部の色は黄、総ほうの直径は小、花柄の長さはやや短である。（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「エロー」は、対照品種「エロア」と比較して、花の中心部の色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「ウインターサン」と比較して、葉形が倒披針形であること、花弁の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岐阜県

岐阜県岐阜市藪田南2丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇次原清尚 鈴木尚司

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第19316号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calendula L. ソフィア

3 登録品種の特性の概要

草型は斜状、株の高さは中、花茎長は短、茎の太さはかなり細、節間長はやや短、葉序は互生、葉の着生角度は斜上、葉形はへら形、葉先端の形は微突形、葉基部の形は鋭形脚、葉の欠刻はかなり少、葉長はかなり短、葉幅はかなり狭、葉色は緑、花数は少、花形は二重咲、花容は斜上、花の大きさは小、舌状花の重ねの程度は低、舌状花数はかなり少、管状花部の大きさは小、花弁全体の形は線形、花弁先端の形は波状形、花弁の長さはやや短、花弁の幅はやや狭、花弁の複色の有無は有、花弁表側の色は11C（地色）、9A（下部及び先端部）、花弁裏側の色は9A、花の中心部の色は黄、総ほうの直径は小、花柄の長さは長である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ソフィア」は、対照品種「ミルク」と比較して、株の高さが中であること、花弁表側の色が11C（地色）、9A（下部及び先端部）であること等で区別性が認められる。対照品種「レスカ」と比較して、葉形がへら形であること、花弁表側の色が11C（地色）、9A（下部及び先端部）であること、花柄の長さが長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岐阜県
岐阜県岐阜市藪田南2丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇次原清尚 鈴村尚司

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第19317号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calendula L. シロキ

3 登録品種の特性の概要

草型は斜状、株の高さは中、花茎長は短、茎の太さはかなり細、葉序は互生、葉の着生角度は斜上、葉形は砲弾形、葉先端の形は円形、葉基部の形は鋭形脚、葉の欠刻はかなり少、葉長はかなり短、葉幅はかなり狭、葉色は緑、花数はかなり少、花形は二重咲、花容は斜上、花の大きさは小、舌状花の重ねの程度は低、舌状花数はかなり少、管状花部の大きさは小、花弁全体の形は線形、花弁先端の形は波状形、花弁の長さはやや短、花弁の幅は狭、花弁の複色の有無は有、花弁表側の色は10D（地色）、9A（基部）、花弁裏側の色は12A（地色）、10C（側部）、花の中心部の色は黄、総ほうの直径は小、花柄の長さは長である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シロキ」は、対照品種「ミルク」と比較して、葉形が砲弾形であること、花弁表側の色が10D（地色）、9A（基部）であること等で区別性が認められる。対照品種「ソフィア」と比較して、葉形が砲弾形であること、花弁裏側の色が12A（地色）、10C（側部）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岐阜県

岐阜県岐阜市藪田南2丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇次原清尚 鈴木尚司

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第19318号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Llave & Lex. USCALI271-2

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや低、茎の長さはやや長、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は濃、小花柄の長さは中、がく片の長さはかなり長、がく片の幅はかなり広、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は大、花の切れ込みの強弱はやや強、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は2D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の先端の形は丸形、花筒の内面の主な色は4A、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「USCALI271-2」は、対照品種「ケイエルペティイエロー」と比較して、草姿が立性であること、がく片の長さがかなり長であること、花の直径が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant21, L. L. C
32149 Aqueduct Road, Bonsall, CA 92003, U. S. A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂崎潮

7 出願公表の年月日 平成20年1月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第19319号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Llave & Lex. CALYELL08

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は中、茎の長さはやや短、葉身の長さはやや長、葉身の幅は狭、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは短、がく片の長さは中、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は小、花の切れ込みの強弱はやや弱、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は9A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の先端の形は丸形、花筒の内面の主な色は17A、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「CALYELL08」は、対照品種「CALDEPYEL」と比較して、がく片の幅が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

GOLDSMITH SEEDS, INC.

2280 Hecker Pass Highway, Gilroy, California 95020, U.S.A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

Robert Pierce

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19320号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. KLECA05102

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は低、茎の長さはやや短、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は鈍形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）はやや濃、小花柄の長さはかなり短、がく片の長さは中、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はかなり小、花の切れ込みの強弱は弱、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は4D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の先端の形は丸形、花筒の内面の主な色は14A、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KLECA05102」は、対照品種「SAKCAL 1075」と比較して、葉身の幅がやや狭であること、小花柄の長さがかなり短であること、花の直径がかなり小であること、花冠裂片の先端の形が丸形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Nils Klemm
Hanfacker10, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Nils Klemm

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第19321号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. BALCABRED

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は中、茎の長さは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや広、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）はやや濃、小花柄の長さは短、がく片の長さは中、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径は小、花の切れ込みの強弱は弱、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は45A-45B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の先端の形は丸形、花筒の内面の主な色は17A、花筒の内面の脈の明瞭度は強である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALCABRED」は、対照品種「Sumcali 06」と比較して、花冠裂片の先端の形が丸形であること、花筒の内面の脈の明瞭度が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ティ・エム・ボール研究所
千葉県印旛郡酒々井町墨1538-6

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jianping Ren

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19322号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. BALCABLITPI

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さは短、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は鈍形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや短、がく片の長さは短、がく片の幅はやや狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径はやや小、花の切れ込みの強弱は弱、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色はN74B、花冠裂片の表面の二次色は71A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の先端の形は丸形、花筒の内面の主な色は17A-17C、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALCABLITPI」は、対照品種「Sunbelpapi」と比較して、葉身の長さがやや短であること、小花柄の長さがやや短であること、花冠裂片の先端の形が丸形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ティ・エム・ボール研究所
千葉県印旛郡酒々井町墨1538-6

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jianping Ren

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19323号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. BALCABLAV

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は低、茎の長さは短、葉身の長さはかなり短、葉身の幅は狭、葉身の先端の形は鈍形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは短、がく片の長さは短、がく片の幅はやや狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径は中、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN82A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は12A-12D、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALCABLAV」は、対照品種「ダンカルバイオブルー」と比較して、茎の長さが短であること、花の直径が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ティ・エム・ボール研究所
千葉県印旛郡酒々井町墨1538-6

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jianping Ren

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19324号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Llave & Lex. BALCABHOPI

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さはやや短、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の先端の形は鈍形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）はやや濃、小花柄の長さはかなり短、がく片の長さはやや短、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径は小、花の切れ込みの強弱は弱、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN66B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は14A-14B、花筒の内面の脈の明瞭度は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「BALCABHOPI」に類似した品種はない。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ティ・エム・ボール研究所
千葉県印旛郡酒々井町墨1538-6

6 登録品種の育成をした者の氏名
Jianping Ren

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19325号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. レッドダイヤモンド

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さは中、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは中、がく片の長さはやや長、がく片の幅はやや広、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は60B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は14A、花筒の内面の脈の明瞭度は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「レッドダイヤモンド」は、対照品種「ダンカルダレッド」と比較して、花冠裂片の先端の形が突形であること等で区別性が認められる。対照品種「掛川S73」と比較して、茎の長さが中であること、花冠裂片の先端の形が突形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社みのるガーデンセンター
岡山県赤磐市下市447番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

橋本正光 近藤秀穂

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第19326号 平成22年3月16日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Llave & Lex. x Petunia Juss. カリブラ ペチ ホワイトブラッシュ
シュ
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は立性、草丈はやや低、茎の長さは中、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや長、がく片の長さはやや長、がく片の幅はやや広、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は19D、花冠裂片の表面の二次色は31D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はやや弱、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「カリブラ ペチ ホワイトブラッシュ」は、対照品種「サンベルアップ」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が19Dであること、花筒の内面の主な色が12Aであること等で区別性が認められる。対照品種「DANOA35」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が19Dであること、花冠裂片の表面の脈の明瞭度がやや弱であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
井手重則
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田2511番地2
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
井手重則
- 7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第19327号 平成22年3月16日

- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Llave & Lex. x Petunia Juss. カリブラ ペチ ピンクホワイト

- 3 登録品種の特性の概要
草姿は這性、草丈は中、茎の長さは長、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は濃、小花柄の長さはやや長、がく片の長さは中、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は75B、花冠裂片の表面の二次色はN80B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は4A、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり弱である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「カリブラ ペチ ピンクホワイト」は、対照品種「ケイエルペティライトピンク」と比較して、葉身の幅がやや広であること等で区別性が認められる。

- 4 育成者権の存続期間 25年

- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
井手重則
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田2511番地2

- 6 登録品種の育成をした者の氏名
井手重則

- 7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第19328号 平成22年3月16日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Llave & Lex. x Petunia Juss. カリブラ ペチ ホワイト
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は這性、草丈は低、茎の長さはやや長、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは長、がく片の長さは中、がく片の幅はやや広、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の切れ込みの強弱は強、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はNN155D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の先端の形は丸形、花筒の内面の主な色は4A、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり弱である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「カリブラ ペチ ホワイト」は、対照品種「サンベルブラ」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がNN155Dであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
井手重則
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田2511番地2
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
井手重則
- 7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第19329号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華惑星 (コックワセイ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数は2、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は中生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや小、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）はさじ状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はかなり低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華惑星」は、対照品種「国華天授」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、頭花の舌状花の形の数が2であること等で区別性が認められる。対照品種「国華横綱」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）がかなり低であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第19330号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精まいづる (セイマイヅル)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精まいづる」は、対照品種「しぐれ」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）が多であること等で区別性が認められる。対照品種「イジュン」と比較して、葉の長さが短であること、葉の基部の形が凹形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第19331号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精たかまど (セイタカマド)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は60D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は186D, NN155A、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精たかまど」は、対照品種「TMウリズン」と比較して、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）が極多であること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が平であること等で区別性が認められる。対照品種「インチ」と比較して、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）が斜上であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鶴飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第19332号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精やえん (セイエン)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は6A、舌状花の表面の二次色は46B、舌状花の表面の二次色の分布は基部1/2、舌状花の表面の二次色の分布2は縁部、舌状花の表面の二次色の型は一様又はほぼ一様、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精やえん」は、対照品種「セイスナップ」と比較して、たく葉の大きさが小であること、舌状花の表面の二次色の分布2が縁部であること等で区別性が認められる。対照品種「アヴィエラス」と比較して、たく葉の大きさが小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鶴飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第19333号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイファウストクリーム

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は大、頭花の直径（摘らいしたもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は155A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2は11週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイファウストクリーム」は、対照品種「ゼンブラクリーム」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がわずかに凸であること、舌状花の縦断面の形状が外反であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第19334号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイソウルレッド

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は179A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイソウルレッド」は、対照品種「レクシー レッド」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが重なること、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）が密であること等で区別性が認められる。対照品種「デックジェニーオレンジ」と比較して、茎の色が紫であること、花らいの外面の色が59Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社精興園
広島県府中市鶴飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名
山手義彦

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第19335号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイロケットイエロー

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはかなり長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は一重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はアネモネ、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数は2、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形は管状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はかなり斜上、舌状花の花筒の長さはかなり長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比は極高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）は144B、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）は9A、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイロケットイエロー」は、対照品種「ベスビオ イエロー」と比較して、葉の長さがかなり長であること、葉の周縁の二次欠刻の深さが深であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第19336号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイパトリックイエロー

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は一重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さは長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は10A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は182A、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイパトリックイエロー」は、対照品種「デルブレスターイエロー」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数がかなり少であること、頭花の型が一重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第19337号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイパトリックサーモン

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはかなり短、葉の一次欠刻の深さは浅、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は一重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さは中、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は49D、舌状花の表面の二次色は60B、舌状花の表面の二次色の分布は基部3/4、舌状花の表面の二次色の型はぼかし、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は60B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイパトリックサーモン」は、対照品種「ビアリッツ」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数がかなり少であること、舌状花の表面の主な色が49Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第19338号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. グリーンドリームナース

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は露心する八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は154D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「グリーンドリームナース」は、対照品種「ドルチェファイン」と比較して、葉の一次欠刻の深さが深であること等で区別性が認められる。対照品種「セイピアース」と比較して、葉の長さが短であること、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）が小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

静岡県
静岡県静岡市葵区追手町9番6号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山田栄成

7 出願公表の年月日 平成20年2月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第19339号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 寄のときめき (キトキキ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径(摘らいしたもの)は小、頭花の舌状花の粗密(露心する八重及び八重品種に限る)は粗、頭花の舌状花の形の数は2、頭花の舌状花の主要な形は管状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の花筒の長さはかなり長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比はやや高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は9A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性(ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む)は類似する、開花習性は7月～9月咲き(夏秋)、各開花習性における早晩性は中生、側枝の多少(切り花用一輪ギク品種に限る)はかなり少、舌状花の基部の向き(露心する八重及び八重品種に限る)はやや斜上である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「寄のときめき」は、対照品種「精吟」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、頭花の舌状花の主要な形が管状であること等で区別性が認められる。対照品種「精宝」と比較して、たく葉の大きさが小であること、葉の裂片縁部の重なりが平行であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

寄能節雄
広島県福山市新市町常1598番地2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

寄能節雄

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第19340号 平成22年3月16日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum pacificum Nakai マリンマムお庭の赤ちゃん (マリンマムホニワアカチャン)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は低、草型は叢生、草姿（叢生品種に限る）は半直立、たく葉の大きさは小、葉の長さはかなり短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅はかなり高、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は鋭形、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）は中、葉の裏面の毛の粗密（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）は強、葉の裏面の色（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）は194A、頭花の型は一重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は極小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はかなり斜下、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は極狭、舌状花の長さ／幅の比は中、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は61A、舌状花の表面の二次色はNN155D、舌状花の表面の二次色の分布は先端、基部、舌状花の表面の二次色の分布2は中央部の縦線、舌状花の表面の二次色の型は一様又はほぼ一様（基部）、ぼかし（先端、中央部）、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「マリンマムお庭の赤ちゃん」は、対照品種「チャイナブリーズ」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さがやや浅であること、株当たりの頭花の総数（叢生品種に限る）が極多であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が10週間であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
静岡県東部花き流通センター農業協同組合
静岡県富士市大淵字丸山1686-2
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
藤井公行
- 7 出願公表の年月日 平成19年9月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第19341号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum pacificum Nakai KIBENGO

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり低、草型は叢生、草姿（叢生品種に限る）は半球、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはかなり短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は淡、葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（*Chrysanthemum* × *morifolium*品種を除く）は無又は極弱、葉の裏面の毛の粗密（*Chrysanthemum* × *morifolium*品種を除く）は弱、葉の裏面の色（*Chrysanthemum* × *morifolium*品種を除く）は138B、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は70B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性

（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KIBENGO」は、対照品種「マリンマムお庭の赤ちゃん」と比較して、葉の裏面の毛の粗密（*Chrysanthemum* × *morifolium*品種を除く）が弱であること、葉の裏面の色（*Chrysanthemum* × *morifolium*品種を除く）が138Bであること、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）が水平であること、舌状花の表面の色数が1であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andreas Niederlander

7 出願公表の年月日 平成20年2月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第19342号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Citrus unshiu Marcow. 潤 (ウルオイ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張、樹の大きさは中、樹勢は中、枝梢の太さは中、枝梢の長さは中、節間長は中、枝梢のとげの多少は無、葉身の形は紡錘形、葉身波状の程度は弱、葉身の大きさはやや小、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、葉形指数は小、網脈の鮮明度はやや明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さは中、葉柄の太さは中、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは中、花弁の形は紡錘形、花弁の長さは中、花弁の幅は広、花弁の数は5枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は少、果実の形は扁平、果頂部の形は平坦、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は不明瞭、果梗部の形は切平面、果梗部放射条溝の多少は少、果心の充実度は中、果心の大きさは中、果実の重さは中、果皮の色は濃橙、油胞の大きさは小、油胞の密度は中、油胞の凹凸は平、果面の粗滑は滑、果皮の厚さはやや厚、果皮歩合は中、剥皮の難易は易、じょうのう膜の硬さは軟、さじょうの形は中、さじょうの大きさは中、さじょう(果肉)の色は濃橙、果汁の多少は多、甘味はやや高、酸味はかなり低、香気の多少は少、種子数は無、発芽期は中、成熟期は早、浮皮果の発生は中、裂果の発生は無である。

出願品種「潤」は、対照品種「上野早生」と比較して、葉身の大きさがやや小であること、果皮の色が濃橙であること、甘味がやや高であること等で区別性が認められる。対照品種「豊福早生」と比較して、葉身の大きさがやや小であること、果皮の色が濃橙であること、酸味がかなり低であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
吉田友文
熊本県宇城市三角町大字郡浦3447番地の19

6 登録品種の育成をした者の氏名
吉田友文

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第19343号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fagopyrum esculentum Moench なつみ

3 登録品種の特性の概要

伸育性は無限、草型は直立・短枝型、草丈はやや短、主茎節数は少、茎色は淡紅、葉の形は中、花色は白、花房数は少、粒形は三角形、粒の長幅比は中、登熟中の果皮色は白～淡緑、完熟粒の果皮色は濃褐、千粒重はやや小、容積重(子実の粒重)は中、生態型は中間夏型、開花期(熟性)は早、成熟期(熟性)はやや早、第1次分枝数はやや少、耐倒伏性は中、脱粒の難易は中、果皮率は中、ルチン含量はやや高である。

出願品種「なつみ」は、対照品種「しなの夏そば」と比較して、完熟粒の果皮色が濃褐であること、千粒重がやや小であること、成熟期(熟性)がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「キタワセソバ」と比較して、完熟粒の果皮色が濃褐であること、生態型が中間夏型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

伊藤誠治 山口修 堤忠宏 大澤良 馬場孝秀 青木恵美子 荒川明 林敬子

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第19344号 平成22年3月16日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fagopyrum esculentum Moench 春のいぶき (ハルイブキ)
- 3 登録品種の特性の概要
伸育性は無限、草型は直立・短枝型、草丈はやや短、主茎節数はやや少、茎色は淡紅、葉の形は中、花色は白、花房数はやや少、粒形は三角形、登熟中の果皮色は白～淡緑、完熟粒の果皮色は濃褐、千粒重は中、容積重(子実の粒重)は中、生態型は中間夏型、開花期(熟性)はやや早、成熟期(熟性)はやや早、第1次分枝数は中、耐倒伏性は中、穂発芽の難易は中、脱粒の難易は中である。
出願品種「春のいぶき」は、対照品種「階上早生」と比較して、穂発芽の難易が中であること等で区別性が認められる。対照品種「しなの夏そば」と比較して、花房数がやや少であること、完熟粒の果皮色が濃褐であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
手塚隆久 松井勝弘 原貴洋
- 7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第19345号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fagopyrum esculentum Moench さちいずみ

3 登録品種の特性の概要

伸育性は無限、草型は開張・分枝伸長型、草丈はやや短、主茎節数は中、茎色は淡紅、葉の形は中、花色は白、花房数は中、粒形は三角形、登熟中の果皮色は白～淡緑、完熟粒の果皮色は黒、千粒重は中、容積重(子実の粒重)は大、生態型は中間秋型、開花期(熟性)は中、成熟期(熟性)は中、第1次分枝数は中、耐倒伏性はやや強、穂発芽の難易はやや易、脱粒の難易は中である。

出願品種「さちいずみ」は、対照品種「常陸秋そば」と比較して、完熟粒の果皮色が黒であること、千粒重が中であること等で区別性が認められる。対照品種「鹿屋在来」と比較して、草丈がやや短であること、完熟粒の果皮色が黒であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

手塚隆久 松井勝弘 原貴洋 森下敏和

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第19346号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fagopyrum esculentum Moench 宮崎早生かおり (ミヤザキワセカオリ)

3 登録品種の特性の概要

伸育性は無限、草型は開張・分枝伸長型、草丈は中、主茎節数は多、茎色は淡紅、葉の形は中、花色は白、花房数はやや多、粒形は三角形、粒の長幅比は中、登熟中の果皮色は白～淡緑、完熟粒の果皮色は濃褐、千粒重は大、容積重(子実の粒重)は大、生態型は中間秋型、開花期(熟性)はやや早、成熟期(熟性)は中、第1次分枝数は中、耐倒伏性はやや弱、穂発芽の難易は中、脱粒の難易は中である。

出願品種「宮崎早生かおり」は、対照品種「鹿屋在来」と比較して、千粒重が大であること、成熟期(熟性)が中であること等で区別性が認められる。対照品種「みやざきおおつぶ」と比較して、千粒重が大であること、成熟期(熟性)が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
宮崎県
宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
吉岡秀樹 永吉嘉文 藪押睦幸 中原孝博 黒木智 齋藤葵

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19347号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Gentiana L. 深山ラブ2 (ミヤマラブ2)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはかなり長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はやや少、茎の二節以上の側枝発生数はやや少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さは長、葉の幅はかなり広、葉の形は広披針形、葉脈の数は5脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）はやや少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）は中、花型は一重、花冠の長さはやや長、花筒部の直径はかなり大、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径はかなり大、花冠の先端の反りは外反、花冠裂片の表面の色は94A、花冠の内面上部の色は92C、花冠の外面上部の色は94A、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さはやや長、花冠裂片の幅はかなり広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は有、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径は中、がく筒の形は漏斗形、やくの発達の状態は正常、開花期は極晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「深山ラブ2」は、対照品種「深山秋」と比較して、茎の長さがかなり長であること、花筒部の直径がかなり大であること等で区別性が認められる。対照品種「深山ラブ」と比較して、葉の幅がかなり広であること、花冠の外面上部の色が94Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社スカイブルー・セト
長野県上伊那郡箕輪町中箕輪11260-215番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
瀬戸堯穂

7 出願公表の年月日 平成20年12月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第19348号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. 夢ハイジ4号 (ユメハイジ4コウ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さは極長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はやや少、茎の二節以上の側枝発生数はやや多、最長葉の着生位置は中央、葉の長さはやや長、葉の幅は広、葉の形は広披針形、葉脈の数は5脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）は少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）は多、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径はやや大、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径は大、花冠の先端の反りはやや外反、花冠裂片の表面の色はN80C、花冠の内面上部の色はN80C、花冠の外面上部の色はN80B、花冠裂片の表面の斑点の粗密は中、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さはやや長、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は有、がく筒の長さは中、がく筒の直径は中、がく筒の形は漏斗形、やくの発達の状態は正常、開花期は極晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「夢ハイジ4号」は、対照品種「夢ハイジ2号」と比較して、茎の長さが極長であること、開花期が極晩であること等で区別性が認められる。対照品種「夢ハイジ3号」と比較して、茎の長さが極長であること、花冠裂片の表面の色がN80Cであること、開花期が極晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社スカイブルー・セト
長野県上伊那郡箕輪町中箕輪11260-215番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

瀬戸堯穂

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第19349号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. ハイジラブ3号 (ハイジラブ3ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはかなり長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はやや少、茎の二節以上の側枝発生数は極少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さはやや長、葉の幅は広、葉の形は広披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）はやや少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）はやや少、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径はかなり大、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径は大、花冠の先端の反りはやや外反、花冠裂片の表面の色はN80B、花冠の内面上部の色は85D、花冠の外面上部の色はN80B、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅は広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は有、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径はやや小、がく筒の形は漏斗形、やくの発達の状態は正常、開花期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ハイジラブ3号」は、対照品種「夢ハイジ2号」と比較して、花筒部の直径がかなり大であること、花冠裂片の表面の斑点の粗密が無又は極粗であること等で区別性が認められる。対照品種「夢ハイジ3号」と比較して、花筒部の直径がかなり大であること、花冠裂片の表面の色がN80Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社スカイブルー・セト
長野県上伊那郡箕輪町中箕輪11260-215番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

瀬戸堯穂

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第19350号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. タマフクラ

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色は無、伸育型は有限、毛茸の色は褐、毛茸の多少は中、主茎長は中、小葉の形は卵形、花色は白、熟莢の色は淡、子実の大きさ（一般群）は極大、子実の形は球、種皮の地色は黄白、臍の色は黄、開花期は中、成熟期は晩、分枝数は少、主茎節数は少、最下着莢節位高は中、小葉の数は3枚葉、裂莢の難易は中、子実の大きさ（極大群）は中、種皮の単色・複色の別は単色、粒の子葉色は黄、生態型は夏大豆型、粗蛋白含有率は中、粗脂肪含有率は中、倒伏抵抗性は強である。

出願品種「タマフクラ」は、対照品種「ユウヅル」と比較して、子実の大きさ（極大群）が中であること、裂皮の難易が中であること、粗脂肪含有率が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ツルムスメ」と比較して、成熟期が晩であること、子実の大きさ（極大群）が中であること、ダイズ茎疫病抵抗性レース群Ⅱが強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北海道
北海道札幌市中央区北3条西6丁目

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中義則 白井和栄 村田吉平 三好智明 鴻坂扶美子 高宮泰宏 萩原誠司 鈴木真吾

7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19351号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Odontoglossum Group ハッピーウェディング

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、草姿は斜上、ぎ球茎の正面の形は卵形、ぎ球茎の平面の形は長楕円形、ぎ球茎の溝（稜）の有無は無、ぎ球茎の高さは41～60mm、ぎ球茎の長径は41～50mm、葉の正面の形は広線形、葉の横断面の形はⅢ型、葉の向きは斜上、葉の長さはやや短、葉の幅はやや広、葉の表面の色は暗緑、葉の上位葉数は2枚、葉の下位葉数は2枚、花序の型は総状、花序の再開花性は無、花序の長さは中、花序の幅は狭、花序の花数はやや少、花茎の抽出方向は斜上、花茎の強さは中、花型は平咲き、距の有無は無、花の横径はやや大、花の縦径は中、ドーサルセパルの正面の形は長楕円状披針形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ドーサルセパルのねじれは無、ドーサルセパルの長さは短、ドーサルセパルの幅はやや狭、ドーサルセパルの模様は無、ドーサルセパルの地色は46A、ラテラルセパルの正面の形は長楕円状披針形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルのねじれは無、ラテラルセパルの長さは短、ラテラルセパルの幅はやや狭、ラテラルセパルの模様は無、ラテラルセパルの地色は46A、ペタルの正面の形は広卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルのねじれの有無は無、ペタルの周縁の波打ちは有、リップの中央裂片の正面の形は長方形、リップの側裂片の明確度は不明確、リップの先端の形は銀杏形、リップの長さは短、リップの幅は狭、リップの模様はその他（ぼかし、帯状）、リップの地色は46A、リップの模様の色は31A（ぼかし）、29B（帯状）、花の香りは無、開花期は冬である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ハッピーウェディング」は、対照品種「ピカソ ルービス」と比較して、花序の型が総状であること、ペタルの地色が46Aであること、リップの先端の形が銀杏形であること等で区別性が認められる。対照品種「ルビー キャッスルヒル」と比較して、ペタルの地色が46Aであること、リップの先端の形が銀杏形であること、リップカルの色が橙色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成19年9月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第19352号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Odontoglossum Group Pink Puli

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは小、草姿は斜上、ぎ球茎の正面の形は卵形、ぎ球茎の平面の形は長楕円形、ぎ球茎の溝（稜）の有無は無、ぎ球茎の高さは41～60mm、ぎ球茎の長径は31～40mm、葉の正面の形は広線形、葉の横断面の形はIV型、葉の向きは斜上、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の表面の色は暗黄緑、葉の上位葉数は1枚、葉の下位葉数は3枚、花序の型は総状、花序の長さは中、花序の幅は狭、花序の花数は少、花茎の抽出方向は斜上、花茎の強さは中、花型は部分抱え平咲き、距の有無は無、花の横径は中、花の縦径は中、ドーサルセパルの正面の形は長楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鋭形、ドーサルセパルのねじれは無、ドーサルセパルの長さは短、ドーサルセパルの幅は狭、ドーサルセパルの模様はぼかし+点斑、ドーサルセパルの地色は69C、ドーサルセパルの模様の色は70B(ぼかし), 178B(点斑)、ラテラルセパルの正面の形は長楕円状披針形、ラテラルセパルの先端の形は鋭形、ラテラルセパルのねじれは無、ラテラルセパルの長さは短、ラテラルセパルの幅は狭、ラテラルセパルの模様はぼかし+点斑、ラテラルセパルの地色は69C、ラテラルセパルの模様の色は70B(ぼかし), 178B(点斑)、ペタルの正面の形は長楕円状披針形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルのねじれの有無は有、ペタルの周縁の波打ちは有、リップの中央裂片の正面の形はその他(半円形)、リップの側裂片の明確度は不明確、リップの先端の形は心形、リップの長さはやや短、リップの幅はやや狭、リップの模様はまだら斑、リップの地色は75C、リップの模様の色は178B、花の香りは無、開花期は秋である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Pink Puli」は、対照品種「ハワーズドリーム」と比較して、花の横径が中であること、ドーサルセパルの長さが短であること、ドーサルセパルの地色が69Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Chao, Cheng-Feng

No.16, Lane 537, Sec.1, Shian Rd., Puli Township, Nantou County, Taiwan

6 登録品種の育成をした者の氏名

Chao, Cheng-Feng

7 出願公表の年月日 平成20年2月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第19353号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Odontoglossum Group ラブリージュエル

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、草姿は斜上、ぎ球茎の正面の形は卵形、ぎ球茎の平面の形は長楕円形、ぎ球茎の溝（稜）の有無は無、ぎ球茎の高さは81～100mm、ぎ球茎の長径は51～60mm、葉の正面の形は広線形、葉の横断面の形はⅢ型、葉の向きは斜上、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の表面の色は暗緑、葉の上位葉数は2枚、葉の下位葉数は3枚、花序の型は複総状、花序の再開花性は無、花序の長さはやや長、花序の幅は中、花序の花数は多、花茎の抽出方向は斜上、花茎の強さは中、花型は平咲き、距の有無は無、花の横径は中、花の縦径はやや小、ドーサルセパルの正面の形は長楕円状披針形、ドーサルセパルの先端の形は突形、ドーサルセパルのねじれは無、ドーサルセパルの長さは短、ドーサルセパルの幅は狭、ドーサルセパルの模様はその他（中斑）、ドーサルセパルの地色は71A、ドーサルセパルの模様の色は53B、ラテラルセパルの正面の形は長楕円状披針形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルのねじれは無、ラテラルセパルの長さは短、ラテラルセパルの幅は狭、ラテラルセパルの模様はその他（中斑）、ラテラルセパルの地色は71A、ラテラルセパルの模様の色は53B、ペタルの正面の形は長楕円状披針形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルのねじれの有無は無、ペタルの周縁の波打ちは有、リップの中央裂片の正面の形は長方形、リップの側裂片の明確度は不明確、リップの先端の形は凹形、リップの長さは短、リップの幅は狭、リップの模様はまだら斑、リップの地色はN78D、リップの模様の色はN34B、花の香りは無、開花期は冬である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ラブリージュエル」は、対照品種「ラブリーペンギンエンペラー」と比較して、花序の型が複総状であること、ペタルの正面の形が長楕円状披針形であること、リップの先端の形が凹形であること等で区別性が認められる。対照品種「ピカソルービス」と比較して、ドーサルセパルの模様がその他（中斑）であること、リップの先端の形が凹形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第19354号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oncidium Group ファイト ゆうこ

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは小、草姿は斜上、ぎ球茎の正面の形は楕円形、ぎ球茎の平面の形は長楕円形、ぎ球茎の溝（稜）の有無は有、ぎ球茎の高さは26～50mm、ぎ球茎の長径は21～30mm、葉の正面の形は広線形、葉の横断面の形はⅡ型、葉の向きは斜上、葉の下垂性は弱、葉長はやや短、葉幅は中、葉表面の色は緑、全葉数は3枚、花序の型は複総状、花序の分枝回数は1回、無限花序の性質の強さは中、花序の長さは中、花序の幅は中、花序の花数は多、花茎の抽出方向は斜上、花茎の強さは強、花型は平、距の有無は無、花の横径はかなり小、花の縦径は小、ドーサルセパルの正面の形は長楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ドーサルセパルのねじれの程度は無、ドーサルセパルの長さはかなり短、ドーサルセパルの幅は狭、ドーサルセパルの模様は単色、ドーサルセパルの地色は5A、ラテラルセパルの正面の形は披針形、ラテラルセパルの先端の形は不等鈍形、ラテラルセパルのねじれの程度は無、ラテラルセパルの長さは短、ラテラルセパルの幅はかなり狭、ラテラルセパルの模様は単色、ラテラルセパルの地色は5A、ペタルの正面の形は長楕円状披針形、ペタルの先端の形は切形、ペタルのねじれの有無は無、ペタルの周縁の波打ちは有、ペタルの模様は単色、ペタルの地色は6A、リップの正面の形はⅢ型、リップの先端の形は銀杏形、リップの側裂片の大きさはかなり小、リップの長さはやや短、リップの幅はやや狭、リップの模様は単色、リップの地色は5A、花の香りは無、開花期は春である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ファイト ゆうこ」は、対照品種「ピンクシュガー」と比較して、ペタルの地色が6Aであること、リップの地色が5Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ハルリ」と比較して、ペタルの地色が6Aであること、リップの地色が5Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

兼綱英行
広島県山県郡北広島町阿坂360-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

兼綱英行

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19355号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. ベこごのみ

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は立、出穂期（50%出穂）は早、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）はやや短、主軸の長さはやや長、穂数は少、芒の分布は上半分のみ、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期は早、穎色は黄白、護穎の長さはやや長、護穎の色は黄白、籾1000粒重は中、穎のフェノール反応は無、玄米の長さはやや短、玄米の幅はやや狭、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、柱頭の色は白、稈の太さはやや太、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さは極短、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、障害型耐冷性はやや弱、穂発芽性は易、耐倒伏性は強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPi-b, k、穂いもちほ場抵抗性は中、葉いもちほ場抵抗性は強、白葉枯病ほ場抵抗性は弱、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稲型（+）である。

出願品種「ベこごのみ」は、対照品種「アキヒカリ」と比較して、主軸の長さがやや長であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-b, kであること等で区別性が認められる。対照品種「ふくひびき」と比較して、出穂期（50%出穂）が早であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-b, kであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

山口誠之 滝田正 片岡知守 遠藤貴司 中込弘二 横上晴郁 加藤浩

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第19356号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 吟のさと (ギンサト)

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢(初期観察)は半立、出穂期(50%出穂)は晩、稈の長さ(穂を除く、浮稲を除く)は中、主軸の長さはやや長、穂数はやや少、外穎の毛茸の多少(小穂)は中、外穎先端の色(ふ先色)(小穂)は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期は晩、穎色は黄白、護穎の色は黄白、籾1000粒重は大、穎のフェノール反応は無、玄米の長さはやや長、玄米の幅はやや狭、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、稈の太さは中、芒は無、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、穂発芽性は中、耐倒伏性は強、脱粒性は中、いもち病抵抗性推定遺伝子型は+、穂いもちほ場抵抗性はやや弱、葉いもちほ場抵抗性はやや弱、白葉枯病抵抗性品種群別は金南風群、白葉枯病ほ場抵抗性はやや弱、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型(+)、玄米の心白の発現(酒米)は40%以上、蛋白質含量はやや低である。

出願品種「吟のさと」は、対照品種「山田錦」と比較して、稈の長さ(穂を除く、浮稲を除く)が中であること、耐倒伏性が強であること等で区別性が認められる。対照品種「レイホウ」と比較して、穂数がやや少であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型が+であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

梶亮太 坂井真 岡本正弘 田村克徳 田村泰章 溝淵律子 平林秀介 深浦壯一
西村実

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第19357号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. ゆめまつり

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は立、出穂期（50%出穂）はやや晩、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）は短、主軸の長さはやや長、穂数の中、芒の分布は先端のみ、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期はやや晩、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾1000粒重は中、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは中、玄米の幅はやや狭、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、稈の太さは中、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さは極短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、穂発芽性は難、耐倒伏性は強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPi-a, i、穂いもちほ場抵抗性は強、葉いもちほ場抵抗性は中、白葉枯病抵抗性品種群別は金南風群、白葉枯病ほ場抵抗性は中、しま葉枯病抵抗性品種群別は外国稲型（St2i）、ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別は抵抗性群、蛋白質含量は中である。

出願品種「ゆめまつり」は、対照品種「あさひの夢」と比較して、ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別が抵抗性群であること等で区別性が認められる。対照品種「祭り晴」と比較して、ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別が抵抗性群であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

愛知県
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

工藤悟 中村充 藤井潔 辻孝子 濱田千裕 杉浦直樹 坂紀邦 中嶋泰則 加藤
恭宏 遠山孝通 船生岳人 澤田恭彦 井澤敏彦 鈴木敏夫 釋一郎 井上正勝
朱宮昭男 小島元

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第19358号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 関東HD2号 (カントウHD2コウ)

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢(初期観察)は半立、出穂期(50%出穂)はやや晩、稈の長さ(穂を除く、浮稲を除く)は長、主軸の長さは中、穂数の中、芒の分布は先端のみ、外穎の毛茸の多少(小穂)は中、外穎先端の色(ふ先色)(小穂)は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期はやや晩、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾1000粒重はやや小、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、稈の太さはやや太、芒は有、芒の色(初期観察)は黄白、最長芒の長さは短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、障害型耐冷性は強、穂発芽性は難、耐倒伏性は極弱、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型は+、穂いもち病抵抗性はやや弱、葉いもち病抵抗性は弱、白葉枯病ほ場抵抗性は中、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稲型(+)、ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別は感受性群、蛋白質含量は中である。

出願品種「関東HD2号」は、対照品種「コシヒカリ」と比較して、出穂期(50%出穂)がやや晩であること等で区別性が認められる。対照品種「日本晴」と比較して、稈の長さ(穂を除く、浮稲を除く)が長であること、穂発芽性が難であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

独立行政法人農業生物資源研究所

茨城県つくば市観音台二丁目1番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名

竹内善信 安東郁男 井邊時雄 太田久稔 佐藤宏之 平山正賢 加藤浩 根本博

平林秀介 出田収 石井卓朗 前田英郎 矢野昌裕 田口文緒 蛭谷武志 山本敏

央

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第19359号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. x Calibrachoa Llave & Lex. KAKEGAWA S89

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや高、茎の長さはやや短、葉身の長さは長、葉身の幅は狭、葉の形は楕円形、葉の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は濃、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは中、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN74A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は中、花筒の内面の主な色は15B、花筒の内面の脈の明瞭度は弱、やくの色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KAKEGAWA S89」は、対照品種「ダンカリペト」と比較して、草丈がやや高であること、小花柄の長さが中であること、花の直径が小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇井啓修 大石幸久 石川信

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第19360号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. x Calibrachoa Llave & Lex. KAKEGAWA S90

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや高、茎の長さはやや短、葉身の長さはかなり長、葉身の幅はかなり狭、葉の形は楕円形、葉の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）はやや濃、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや長、がく片の幅は極狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN74A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はやや弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は中、花筒の内面の主な色は7D-187A、花筒の内面の脈の明瞭度は強、やくの色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KAKEGAWA S90」に類似した品種はない。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇井啓修 大石幸久 石川信

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 3 6 1 号 平成 2 2 年 3 月 1 6 日

- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
 Petunia Juss. x Calibrachoa Llave & Lex. KAKEGAWA S91

- 3 登録品種の特性の概要
 草姿は立性、草丈はやや高、茎の長さはかなり短、葉身の長さはやや長、葉身の幅は狭、葉の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は濃、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN30A-N30D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はやや弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は中、花筒の内面の主な色は17B、花筒の内面の脈の明瞭度はやや強、やくの色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

- 4 育成者権の存続期間 2 5 年

- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
 株式会社サカタのタネ
 神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

- 6 登録品種の育成をした者の氏名
 宇井啓修 大石幸久 石川信

- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 1 2 月 1 0 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19362号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phlox L. BARTHIRTYNINE

3 登録品種の特性の概要

草型は直立性、草丈は中、株幅は中、茎の太さはやや細、茎の色は緑紫、茎の毛の有無は無、茎断面の形は丸、節間長は中、葉序は対生、葉形は長楕円形、葉の先端の形は鋭形、葉の基部の形は鈍形、葉縁鋸歯の形は全縁、葉長はやや長、葉幅はやや広、葉表面の色は緑、葉裏面の色は淡緑、斑の有無は無、葉数は多、葉表面の毛の有無は有、葉裏面の毛は無、葉柄の有無は無、花序の形は円錐花序、花の付き方は頂生と腋生、花序の長さは中、花序の幅は広、花冠全体の形は円形、花冠径はやや小、花冠裂片の幅は中、花冠裂片の形は楕円形、花筒の長さは短、花筒の幅はやや広、花冠の厚さは薄、花冠の単色・複色の別は単色、花冠裂片表面の地色は73B、花冠裂片裏面の色は73B(濃色部)、69B(淡色部)、花冠の模様の有無は無、花冠中心部の色は69D、花筒の色は76C、一重八重の別は一重、がくの有無は有、がく筒の形は円柱形、がくの色は淡緑、やくの色はその他(白)、花粉の色はその他(白)、雄ずいのは数は5本、小花柄の長さは短、花数は多である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「BARTHIRTYNINE」は、対照品種「バーイレブン」と比較して、花冠裂片表面の地色が73Bであること、花冠の模様の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「ジュニオール ブーケ」と比較して、花冠裂片表面の地色が73Bであること、花冠の模様の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bartels Breeding B.V.
Rietwijkeroordweg 15, 1432JG, Aalsmeer, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

G. B. H. Bartels

7 出願公表の年月日 平成20年1月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第19363号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phlox L. BARTHIRTYONE

3 登録品種の特性の概要

草型は直立性、草丈はやや低、株幅は中、茎の太さはやや細、茎の色は緑、茎の毛の有無は無、茎断面の形は丸、節間長は中、葉序は対生、葉形は長楕円形、葉の先端の形は鋭形、葉の基部の形は鈍形、葉縁鋸歯の形は全縁、葉長はやや長、葉幅はやや広、葉表面の色は緑、葉裏面の色は淡緑、斑の有無は無、葉数はやや多、葉表面の毛の有無は有、葉裏面の毛は無、葉柄の有無は無、花序の形は円錐花序、花の付き方は頂生と腋生、花序の長さはやや短、花序の幅は広、花冠全体の形は円形、花冠径はやや大、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は円型おう形、花筒の長さは中、花筒の幅はやや広、花冠の厚さは薄、花冠の単色・複色の別は複色、花冠裂片表面の地色はN74B、花冠裂片裏面の色は77B、花冠の模様の有無は有、花冠の模様の形はその他（目及びぼかし）、花冠の模様の色は64B(目), 75A(ぼかし)、花冠中心部の色は64B、花筒の色はN77B、一重八重の別は一重、がくの有無は有、がく筒の形は円柱形、がくの色は緑、やくの色はその他（白）、花粉の色はその他（白）、雄ずいのは数は5本、小花柄の長さは短、花数はやや多である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BARTHIRTYONE」は、対照品種「ブルーパラダイス」と比較して、茎の色が緑であること、花冠裂片表面の地色がN74Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ジュニオール ドリーム」と比較して、花冠裂片裏面の色が77Bであること、花筒の色がN77Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bartels Breeding B.V.

Rietwijkeroordweg 15, 1432JG, Aalsmeer, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

G. B. H. Bartels

7 出願公表の年月日 平成20年2月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第19364号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phlox L. BARTHIRTYTHREE

3 登録品種の特性の概要

草型は直立性、草丈は低、株幅は中、茎の太さは中、茎の色は緑紫、茎の毛の有無は無、茎断面の形は丸、節間長はやや短、葉序は対生、葉形は楕円形、葉の先端の形は鋭形、葉の基部の形は円形、葉縁鋸歯の形は全縁、葉長はやや長、葉幅はかなり広、葉表面の色は緑、葉裏面の色は淡緑、斑の有無は無、葉数は多、葉表面の毛の有無は無、葉裏面の毛は無、葉柄の有無は無、花序の形は円錐花序、花の付き方は頂生と腋生、花序の長さはやや短、花序の幅は広、花冠全体の形は円形、花冠径は中、花冠裂片の幅は中、花冠裂片の形は楕円形、花筒の長さはやや短、花筒の幅は広、花冠の厚さは薄、花冠の単色・複色の別は複色、花冠裂片表面の地色はN78B、花冠裂片裏面の色は76B、花冠の模様の有無は有、花冠の模様の形はその他（ぼかし）、花冠の模様の色は76C、花冠中心部の色は67B、花筒の色は76C、一重八重の別は一重、がくの有無は有、がく筒の形は円柱形、がくの色は淡緑、やくの色はその他（白）、花粉の色はその他（白）、雄ずいのは数は5本、小花柄の長さはかなり短、花数はやや多である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BARTHIRTYTHREE」は、対照品種「ジュニオール ドリーム」と比較して、花冠裂片表面の地色がN78Bであること、花冠裂片裏面の色が76Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bartels Breeding B.V.
Rietwijkeroordweg 15, 1432JG, Aalsmeer, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

G. B. H. Bartels

7 出願公表の年月日 平成20年2月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第19365号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phlox L. BARTHIRTYFOUR

3 登録品種の特性の概要

草型は直立性、草丈は中、株幅はやや狭、茎の太さはやや太、茎の色は緑紫、茎の毛の有無は無、茎断面の形は丸、節間長は中、葉序は対生、葉形は長楕円形、葉の先端の形は鋭尖形、葉の基部の形は鈍形、葉縁鋸歯の形は全縁、葉長は長、葉幅はかなり広、葉表面の色は緑、葉裏面の色は淡緑、斑の有無は無、葉数は多、葉表面の毛の有無は有、葉裏面の毛は無、葉柄の有無は無、花序の形は円錐花序、花の付き方は頂生と腋生、花序の長さは中、花序の幅はかなり広、花冠全体の形は円形、花冠径は中、花冠裂片の幅は中、花冠裂片の形は楕円形、花筒の長さは中、花筒の幅は広、花冠の厚さは薄、花冠の単色・複色の別は複色、花冠裂片表面の地色は71D、花冠裂片裏面の色は73B、花冠の模様の有無は有、花冠の模様の形は目、花冠の模様の色はN66B、花冠中心部の色はN66B、花筒の色は67D、一重八重の別は一重、がくの有無は有、がく筒の形は円柱形、がくの色は淡緑、やくの色はその他（白）、花粉の色はその他（白）、雄ずいの数は5本、小花柄の長さは短、花数は多である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BARTHIRTYFOUR」は、対照品種「ジュニオール ブーケ」と比較して、葉幅がかなり広であること、花冠裂片表面の地色が71Dであること等で区別性が認められる。対照品種「バーイレブン」と比較して、葉幅がかなり広であること、花冠の模様の色がN66Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bartels Breeding B.V.
Rietwijkeroordweg 15, 1432JG, Aalsmeer, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

G. B. H. Bartels

7 出願公表の年月日 平成20年2月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第19366号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phlox L. BARTHIRTYSIX

3 登録品種の特性の概要

草型は直立性、草丈は中、株幅は中、茎の太さは中、茎の色は緑紫、茎の毛の有無は無、茎断面の形は丸、節間長はやや長、葉序は対生、葉形は長楕円形、葉の先端の形は鋭形、葉の基部の形は鈍形、葉縁鋸歯の形は全縁、葉長は長、葉幅は広、葉表面の色は緑、葉裏面の色は淡緑、斑の有無は無、葉数はかなり多、葉表面の毛の有無は無、葉裏面の毛は無、葉柄の有無は無、花序の形は円錐花序、花の付き方は頂生と腋生、花序の長さはやや長、花序の幅は広、花冠全体の形は円形、花冠径はやや小、花冠裂片の幅は中、花冠裂片の形は楕円形、花筒の長さはやや短、花筒の幅は広、花冠の厚さは薄、花冠の単色・複色の別は単色、花冠裂片表面の地色は64B、花冠裂片裏面の色は54C、花冠の模様の有無は無、花冠中心部の色は67A、花筒の色は75C, 64C(条)、一重八重の別は一重、がくの有無は有、がく筒の形は円柱形、がくの色は緑、やくの色はその他(白)、花粉の色はその他(白)、雄ずいのは数は5本、小花柄の長さは短、花数はかなり多である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「BARTHIRTYSIX」は、対照品種「ジュニオール ダンス」と比較して、茎の色が緑紫であること、花冠裂片表面の地色が64Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bartels Breeding B.V.

Rietwijkeroordweg 15, 1432JG, Aalsmeer, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

G. B. H. Bartels

7 出願公表の年月日 平成20年2月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第19367号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phlox L. Sunphlotori

3 登録品種の特性の概要

草型は斜上性、草丈はかなり低、株幅はかなり狭、茎の太さは細、茎の色は緑、茎の毛の有無は有、茎断面の形は丸、節間長は短、葉序はその他（互生）、葉形は披針形、葉の先端の形は鋭形、葉の基部の形は鈍形、葉縁鋸歯の形は全縁、葉長は短、葉幅は狭、葉表面の色は緑、葉裏面の色は淡緑、斑の有無は無、葉数はやや少、葉表面の毛の有無は有、葉裏面の毛は有、葉柄の有無は無、花序の形は集散花序、花の付き方は頂生と腋生、花序の長さはかなり短、花序の幅はやや狭、花冠全体の形は円形、花冠径は小、花冠裂片の幅はやや狭、花冠裂片の形は円型おう形、花筒の長さは短、花筒の幅はやや狭、花冠の厚さは薄、花冠の単色・複色の別は複色、花冠裂片表面の地色はNN155D、花冠裂片裏面の色はNN155D, 143C(中央脈), 77A(絞り)、花冠の模様の有無は有、花冠の模様の形はその他（中央脈及び絞り）、花冠の模様の色は143C(中央脈), 71A(絞り)、花冠中心部の色はN79B、花筒の色は156C, N77B(条)、一重八重の別は一重、がくの有無は有、がく筒の形は鐘形、がくの色は緑、やくの色は黄、花粉の色は黄、雄ずいの数は5本、小花柄の長さはやや短、花数は極少である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunphlotori」は、対照品種「グラミー ピンク/ホワイト」と比較して、花冠の模様の色が143C(中央脈), 71A(絞り)であること、花冠中心部の色がN79Bであること等で区別性が認められる。対照品種「USPHLO3M」と比較して、花冠径が小であること、花冠の模様の形がその他（中央脈及び絞り）であること、花冠の模様の色が143C(中央脈), 71A(絞り)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都千代田区平河町二丁目13番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮崎潔

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第19368号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. エベラ122

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は多、とげの主な色は緑、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は62B、花弁の表面の二次色は25D、花弁の表面の二次色の分布は基部、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは中、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エベラ122」は、対照品種「エベラ168」と比較して、花の形が不整円形であること、花弁の表面の主な色が62Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

ローザ エスケランド

7 出願公表の年月日 平成18年3月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第19369号 平成22年3月16日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vaccinium L. 青い流星 (アオイリュウセイ)

3 登録品種の特性の概要

樹勢はやや弱、樹の大きさはやや小、樹姿は斜上、前年枝の色は赤黄、前年枝の長さは長、前年枝の節間長はやや長、葉の長さはやや長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや大、葉の形は楕円、葉の先端部の形は中、葉の表面の色は緑、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る）は中、葉の周縁の型は全縁、花芽のアントシアニン着色の強弱は強、花序の長さはやや短、花冠の形はつぼ、花冠の色は白、花筒の大きさは大、花筒のアントシアニン着色の強弱は極弱、花筒の稜の有無は有、果房の着生密度は中、未熟果の緑色の濃淡は淡、果実の大きさはかなり大、果実の縦断面の形は扁円、果柄痕の大きさは小、がくあいの形は円、がく片の向きは立、がく片の反り方は平、がくあいの直径は中、がくあいの深さは深、果粉の程度はやや弱、果皮の色は濃青、果実の硬さは中、果肉の色は淡黄、糖度はやや多、酸度は少、着果習性は前年枝のみ、裂果性は少、ほう芽期は中、前年枝の開花始期は中、前年枝の果実の成熟期は早、収穫期間は長である。

出願品種「青い流星」は、対照品種「ヌイ」と比較して、樹姿が斜上であること、酸度が少であること、収穫期間が長であること等で区別性が認められる。対照品種「パークレイ」と比較して、樹姿が斜上であること、酸度が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社天香園
山形県東根市中島通り1丁目34号

6 登録品種の育成をした者の氏名

齋藤里美

7 出願公表の年月日 平成20年12月19日