

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 7 0 3 号 平成 2 2 年 8 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Anthemis tinctoria L. チャーム
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は低、株の幅は中、茎の長さは短、茎のアントシアニン着色の有無は無、葉の長さは短、葉の幅はかなり狭、頭花の直径はかなり小、舌状花の数はやや少、舌状花の長さは短、舌状花の幅は中、舌状花の形は倒卵形、舌状花の表面の主な色は14A、舌状花の模様の有無は無、管状花部の直径は中、管状花部の色は黄、花盤の縦断面の形はI型、開花始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「チャーム」は、対照品種「ダイヤーズカモミール」と比較して、茎の長さが短であること、節間長が短であること、舌状花の長さが短であること、舌状花の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
松本正志
長崎県佐世保市針尾東町2999番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
BRIAN KABBES
- 7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 1 2 月 1 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19704号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Callistephus chinensis (L.) Nees SAKAST044

3 登録品種の特性の概要

草姿はほうき型、一次分枝の発生量の中、一次分枝の発生位置は低～中位、二次分枝の発生量はやや少、開花時草丈はやや高、節数はやや少、茎の太さ（地上10cm）は細、茎の太さ（最長側枝の1/2の点）は細、最長の一次分枝長はやや短、茎の強度は強、葉身長（最長側枝の最大葉）はやや短、葉柄長（最長側枝の最大葉）はやや短、葉身長（地上10cm付近の葉）は短、葉柄長（地上10cm付近の葉）は短、葉幅（最長側枝の最大葉）は狭、葉幅（地上10cm付近の葉）は狭、葉色は緑、花卉の形は舟底弁、花卉の形2は丁字状花卉、外花卉の反り方（長さ方向）は平、花径はやや小、花卉の長さ（最外弁）は短、花卉の幅（最外弁）は中、総ほう部の直径は中、外花卉の色（表）－1は187C、舌状花数はやや少、総ほう片数はやや多、開花期の早晩性はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKAST044」は、対照品種「福宝玉」と比較して、外花卉の色（表）－1が187Cであること、開花期の早晩性がやや晩であること等で区別性が認められる。対照品種「太陽」と比較して、外花卉の色（表）－1が187Cであること、内花卉の色（表）－1が59Cであること等で区別性が認められる。対照品種「改良くれない」と比較して、外花卉の色（表）－1が187Cであること、内花卉の色（表）－1が59Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

川嶋盛哉 井上廣光

7 出願公表の年月日 平成20年2月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第19705号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Callistephus chinensis (L.) Nees SAKAST045

3 登録品種の特性の概要

草姿はほうき型、一次分枝の発生量はやや少、一次分枝の発生位置は低～中位、二次分枝の発生量はやや少、開花時草丈はやや高、節数はやや少、茎の太さ（地上10cm）は細、茎の太さ（最長側枝の1/2の点）は細、最長の一次分枝長はやや短、茎の強度は強、葉身長（最長側枝の最大葉）は短、葉柄長（最長側枝の最大葉）は短、葉身長（地上10cm付近の葉）はかなり短、葉柄長（地上10cm付近の葉）は短、葉幅（最長側枝の最大葉）は狭、葉幅（地上10cm付近の葉）は狭、葉色は緑、花卉の形は舟底弁、花卉の形2は丁字状花卉、外花卉の反り方（長さ方向）は平、花径はやや小、花卉の長さ（最外弁）は短、花卉の幅（最外弁）はやや狭、総ほう部の直径は中、外花卉の色（表）－1は53A、舌状花数はやや少、総ほう片数はやや多、開花期の早晚性はやや晩である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKAST045」は、対照品種「福宝玉」と比較して、茎のアントシアニンの有無・程度が中であること、開花期の早晚性がやや晩であること等で区別性が認められる。対照品種「SAKAST044」と比較して、茎のアントシアニンの有無・程度が中であること、外花卉の色（表）－1が53Aであること等で区別性が認められる。対照品種「福陽」と比較して、外花卉の色（表）－1が53Aであること、内花卉の色（表）－1が59Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ

神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

川嶋盛哉 井上廣光

7 出願公表の年月日 平成20年2月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第19706号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Callistephus chinensis (L.) Nees SAKAST046

3 登録品種の特性の概要

草姿はほうき型、一次分枝の発生量はやや少、一次分枝の発生位置は低～中位、二次分枝の発生量はやや多、開花時草丈はやや高、節数は中、茎の太さ（地上10cm）はやや細、茎の太さ（最長側枝の1/2の点）は細、最長の一次分枝長は中、茎の強度はやや強、葉身長（最長側枝の最大葉）はやや短、葉柄長（最長側枝の最大葉）はやや長、葉身長（地上10cm付近の葉）はやや短、葉柄長（地上10cm付近の葉）はやや短、葉幅（最長側枝の最大葉）はやや狭、葉幅（地上10cm付近の葉）はやや狭、葉色は緑、花卉の形は舟底弁、花卉の形2は丁字状花卉、外花卉の反り方（長さ方向）は平、花径は小、花卉の長さ（最外弁）は短、花卉の幅（最外弁）は中、総ほう部の直径は中、外花卉の色（表）－1はN74A、舌状花数はやや少、総ほう片数は中、開花期の早晚性は晩である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKAST046」は、対照品種「筑摩ポンポン桃」と比較して、内花卉の色（表）－1が72Cであること等で区別性が認められる。対照品種「梅の舞」と比較して、外花卉の色（表）－1がN74Aであること、内花卉の色（表）－1が72Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ

神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

川嶋盛哉 井上廣光

7 出願公表の年月日 平成20年2月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第19707号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Callistephus chinensis (L.) Nees SAKAST048

3 登録品種の特性の概要

草姿はほうき型、一次分枝の発生量の中、一次分枝の発生位置は低～中位、二次分枝の発生量の中、開花時草丈はやや高、節数はやや少、茎の太さ（地上10cm）は細、茎の太さ（最長側枝の1/2の点）は細、最長の一次分枝長はやや短、茎の強度は強、葉身長（最長側枝の最大葉）は短、葉柄長（最長側枝の最大葉）はやや長、葉身長（地上10cm付近の葉）はかなり短、葉柄長（地上10cm付近の葉）は短、葉幅（最長側枝の最大葉）はやや狭、葉幅（地上10cm付近の葉）は狭、葉色は緑、花卉の形は舟底弁、花卉の形2は丁字状花卉、外花卉の反り方（長さ方向）は平、花径はやや小、花卉の長さ（最外弁）は短、花卉の幅（最外弁）は中、総ほう部の直径は中、外花卉の色（表）－1は67A、舌状花数はやや少、総ほう片数は多、開花期の早晩性はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKAST048」は、対照品種「福乃輝」と比較して、茎のアントシアニンの有無・程度が高であること、外花卉の色（表）－1が67Aであること等で区別性が認められる。対照品種「SAKAST044」と比較して、外花卉の色（表）－1が67Aであること、内花卉の色（表）－1が67Bであること等で区別性が認められる。対照品種「太陽」と比較して、胚軸のアントシアニンの発色程度が高であること、外花卉の色（表）－1が67Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

川嶋盛哉 井上廣光

7 出願公表の年月日 平成20年2月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第19708号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Capsicum L. 炎祭り (ホムマツリ)

3 登録品種の特性の概要

短節間の有無は無、節間長（短節間のない品種に限る。）は極短、草丈は極低、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉の緑色の濃淡は中、花の色は白、未熟果の色は紫、果実の着生の向きは直立、果実の長さはかなり短、果実の直径は小、果実の長さ／直径は小、果実の縦断面の形は三角形、果実の表面の粗滑は殆ど滑らか、成熟果の色は橙、果実の光沢の強弱は中、果実のこうあの有無は無、果実の先端の形は丸、果実の条溝の深さは無又は極浅、果実の心室数は2室が多い、果肉の厚さはかなり薄、胎座のカプサイシンの有無は有、成熟期はやや晩である。

出願品種「炎祭り」は、対照品種「サルサディープオレンジ」と比較して、短節間の有無が無であること、果実の長さ／直径が小であること等で区別性が認められる。対照品種「ひな祭」と比較して、短節間の有無が無であること、果実の長さ／直径が小であること、成熟果の色が橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

金澤美浩

福島県東白川郡矢祭町大字下関河内字下古宿8番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

金澤美浩

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19709号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. AAMTRO

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは極短、葉の幅はかなり狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は7C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は有、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「AAMTRO」は、対照品種「セイチェルシー」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さがやや浅であること、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）が中であること、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Allround Agri Management B.V.

Grote Inghweg 19, 5331PP Kerkdriel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

G. B. M. Lentjes

7 出願公表の年月日 平成19年2月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第19710号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. BRANSKY

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり低、草型は叢生、草姿（叢生品種に限る）は半球、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さはかなり短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）は無又は極弱、葉の裏面の毛の粗密（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）は極弱、葉の裏面の色（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）は147B、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は粗、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は65B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性はやや早生、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BRANSKY」は、対照品種「メプリロスカ」と比較して、頭花の型が八重であること、舌状花の表面の主な色が65Bであること等で区別性が認められる。対照品種「メプリカレイ」と比較して、頭花の型が八重であること、舌状花の表面の主な色が65Bであること、各開花習性における早晩性がやや早生であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Hubert Brandkamp

7 出願公表の年月日 平成19年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第19711号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DEKOSORNO

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は極多、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は157C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DEKOSORNO」は、対照品種「ブリーザー」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）が少であること、舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dekker Breeding B.V.

Julianaweg 6 a, 1711RP Hensbroek, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

C. W. Dekker

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 7 1 2 号 平成 2 2 年 8 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. BECORO

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、草型は叢生、草姿（叢生品種に限る）は半直立、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはかなり短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（*Chrysanthemum* × *morifolium*品種を除く）は無又は極弱、葉の裏面の毛の粗密（*Chrysanthemum* × *morifolium*品種を除く）は極弱、葉の裏面の色（*Chrysanthemum* × *morifolium*品種を除く）は147B、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数値は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は64A、舌状花の表面の二次色はNN155D、舌状花の表面の二次色の分布は縁上、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色はN155B, 64B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性は早生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BECORO」は、対照品種「星の子菊 レグルス」と比較して、草型が叢生であること、舌状花の表面の主な色が64Aであること、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Beekenkamp Plants B. V.
Korte Kruisweg 141, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Adrianus L. M. van der Meer

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 3 月 4 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19713号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 太陽の紅珊瑚 (タイヨウベニサンゴ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、頭花の型は八重、頭花の直径(摘らいしたもの)はやや大、頭花の舌状花の粗密(露心する八重及び八重品種に限る)はやや粗、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形(管状でない舌状花)はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはかなり長、舌状花の幅はやや広、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は72B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性(ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む)は著しく異なる、舌状花の裏面の色は186C、日長感応グループ(正確な日長制御での栽培)は8週間、開花習性は10月～11月咲き(秋)、側枝の多少(切り花用一輪ギク品種に限る)はやや少、舌状花の基部の向き(露心する八重及び八重品種に限る)は水平である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「太陽の紅珊瑚」は、対照品種「花秀芳」と比較して、舌状花の周縁の巻き方(管状でない舌状花)が弱い外巻きであること、舌状花の長さ／幅の比がやや低であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村晃三

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19714号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. レオ

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は極小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は65B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「レオ」は、対照品種「レフォンド」と比較して、茎の色が紫であること、舌状花の表面の主な色が65Bであること等で区別性が認められる。対照品種「セイロココ」と比較して、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）が極小であること、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

吉川民夫
富山県富山市東大久保580番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉川民夫

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第19715号 平成22年8月20日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. 太陽のウリズンブラウン(タイヨウウリズンブラウン)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅はかなり高、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は178D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色はN170D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「太陽のウリズンブラウン」は、対照品種「セイバッカス」と比較して、舌状花の表面の主な色が178Dであること等で区別性が認められる。対照品種「太陽のカーニバル」と比較して、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）が少であること、舌状花の表面の主な色が178Dであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
久保田篤 宮里友和
- 7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第19716号 平成22年8月20日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. 太陽のウリズンチェリー (タイヨウウリズンチェリー)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN66C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は62C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「太陽のウリズンチェリー」は、対照品種「舞扇」と比較して、草丈が中であること、葉の長さ／幅が高であること等で区別性が認められる。対照品種「フルーリー スプレンドッド」と比較して、葉の一次欠刻の深さが深であること、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）が少であること、舌状花の表面の主な色がN66Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
久保田篤 宮里友和
- 7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19717号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. エルイブ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは大、葉の長さは極短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はアネモネ、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は69D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は69D、75C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はかなり大、花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）は185B、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）は75C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エルイブ」は、対照品種「シャイニング」と比較して、葉の長さが極短であること、花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）が中であること、管状花の形（アネモネ型の品種に限る）が花弁状であること等で区別性が認められる。対照品種「サモス」と比較して、草丈がやや低であること、葉の長さが極短であること、管状花の形（アネモネ型の品種に限る）が花弁状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

牛田豊文
愛知県愛西市金棒町東101

6 登録品種の育成をした者の氏名

牛田豊文

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19718号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. エルサンガ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エルサンガ」は、対照品種「DEKSHEPODY」と比較して、舌状花の花筒の長さがかなり短であること、舌状花の縦断面の形状が内曲であること等で区別性が認められる。対照品種「レジャンボ」と比較して、葉柄の葉長に対する長さがやや短であること、花らいの外面の色が15Bであること、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

牛田豊文
愛知県愛西市金棒町東101

6 登録品種の育成をした者の氏名

牛田豊文

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19719号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. エルーナ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は露心する八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比はかなり低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は5D, 181D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エルーナ」は、対照品種「栗まんじゅう」と比較して、舌状花の表面の主な色が5Cであること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）がやや斜下であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

牛田豊文
愛知県愛西市金棒町東101

6 登録品種の育成をした者の氏名

牛田豊文

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19720号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. エルギャレット

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN34B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は168D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エルギャレット」は、対照品種「セイソウルレッド」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数が中であること、舌状花の表面の主な色がN34Bであること等で区別性が認められる。対照品種「レクシー レッド」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、舌状花の内花弁の裏面の色（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が12Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

牛田豊文
愛知県愛西市金棒町東101

6 登録品種の育成をした者の氏名

牛田豊文

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19721号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. エルスマイル

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エルスマイル」は、対照品種「フェロー」と比較して、葉の基部の形が平形であること、葉の周縁の二次欠刻の深さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「セイジャポン」と比較して、たく葉の大きさが中であること、葉の基部の形が平形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

牛田豊文
愛知県愛西市金棒町東101

6 登録品種の育成をした者の氏名

牛田豊文

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19722号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. エルプリズム

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は72D、舌状花の表面の二次色はNN155C、舌状花の表面の二次色の分布は基部（一様又はほぼ一様）、舌状花の表面の二次色の分布2は至る所（ぼかし）、舌状花の表面の二次色の型は一様又はほぼ一様、ぼかし、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エルプリズム」は、対照品種「セイピノ」と比較して、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）が斜上であること、舌状花の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。対照品種「コイミリオン」と比較して、舌状花の表面の主な色が72Dであること、舌状花の表面の二次色の分布が基部であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

牛田豊文
愛知県愛西市金棒町東101

6 登録品種の育成をした者の氏名

牛田豊文

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19723号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. エルレジーナ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは大、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはやや長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は61A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エルレジーナ」は、対照品種「舞姫」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数がやや少であること、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
牛田豊文
愛知県愛西市金棒町東101

6 登録品種の育成をした者の氏名
牛田豊文

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19724号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. エルマンデル

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は12A、舌状花の表面の二次色は179B、舌状花の表面の二次色の分布は先端部1/2、舌状花の表面の二次色の型はぼかし、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は179B, 9B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エルマンデル」は、対照品種「フィサファイア」と比較して、草丈がやや低であること、茎の色が紫であること、舌状花の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「フィロリポップ イエロー」と比較して、草丈がやや低であること、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）が中であること、舌状花の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

牛田豊文
愛知県愛西市金棒町東101

6 登録品種の育成をした者の氏名

牛田豊文

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19725号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. エルアトム

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は露心する八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エルアトム」は、対照品種「アイブルース」と比較して、葉の長さがやや短であること、葉の基部の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「カイマン」と比較して、舌状花の縦断面の形状が平であること、舌状花の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

牛田豊文
愛知県愛西市金棒町東101

6 登録品種の育成をした者の氏名

牛田豊文

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19726号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. エルパテオン

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エルパテオン」は、対照品種「エルジョイ」と比較して、草丈がやや低であること、たく葉の大きさが小であること、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）がやや密であること等で区別性が認められる。対照品種「セイトリニティー」と比較して、草丈がやや低であること、舌状花の表面の主な色が75Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

牛田豊文
愛知県愛西市金棒町東101

6 登録品種の育成をした者の氏名

牛田豊文

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第19727号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. マンダリンデコ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らしていないもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は17A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「マンダリンデコ」は、対照品種「フィサファイア」と比較して、草丈がやや低であること、葉の一次欠刻の深さがやや浅であること、舌状花の縦断面の形状が外反であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

牛田豊文
愛知県愛西市金棒町東101

6 登録品種の育成をした者の氏名

牛田豊文

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19728号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. エルドルフィン

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは大、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は露心する八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形は管状、舌状花の花筒の長さは中、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は157D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エルドルフィン」は、対照品種「グリーンサタン」と比較して、たく葉の大きさが大であること、舌状花の表面の主な色が157Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

牛田豊文
愛知県愛西市金棒町東101

6 登録品種の育成をした者の氏名

牛田豊文

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19729号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀寒しみず (シュカンシズ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり多、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は12月～2月咲き（冬）、各開花習性における早晩性は早生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀寒しみず」は、対照品種「雪景色」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、葉の基部の形が凹形であること、頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）が少であること、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）がかなり多であること等で区別性が認められる。対照品種「雪ロマン」と比較して、草丈が中であること、花序の最大幅（叢生でない品種に限る）がやや狭であること、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）がかなり多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地
山手正則
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一 山手正則

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第19730号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 小夏の風 (コナツカゼ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はかなり小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晩性は早生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「小夏ホワイト」は、対照品種「山水」と比較して、葉の長さが中であること、葉の裂片縁部の重なりが平行であること等で区別性が認められる。対照品種「流星」と比較して、葉の長さが中であること、葉の先端裂片の相対的な長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

群馬県

群馬県前橋市大手町一丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

春山実 小林智彦

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第19731号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. いずみ

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性はやや早生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「いずみ」は、対照品種「はじめ」と比較して、葉柄の葉長に対する長さが長であること、舌状花の縦断面の形状が平であること等で区別性が認められる。対照品種「夏の朝」と比較して、葉柄の葉長に対する長さが長であること、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）が小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

吉川民夫
富山県富山市東大久保580番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉川民夫

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第19732号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cucurbita L. 虹ロマン2 (ニジロマン2)

3 登録品種の特性の概要

種子の大きさは中、種皮の色は淡黄褐、子葉の大きさは中、胚軸の長さは中、胚軸の太さは太、胚軸の空洞の大きさは中、草姿はつる性、草勢は強、側枝の多少はやや多、葉の欠刻は浅、葉の大きさはやや大、果実の形は扁円、果実先端の形は平、果実基部の形は凹、果実の大きさは中、果面の状態は痘、果面の地色(出荷期)は緑(147A)、果面の模様(出荷期)は緑条、緑斑紋(147B)、果肉の色は黄(21B)、果肉の質は粉、は種～収穫まで日数は中、節成性の中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「虹ロマン2」は、対照品種「くりゆたか」と比較して、側枝の多少がやや多であること、果実基部の形が凹であること等で区別性が認められる。対照品種「くりひろ」と比較して、種皮の状態が滑であること、果実基部の形が凹であること、果梗の太さがやや細であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高田正衛

北海道夕張郡長沼町東4線北9番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

高田正衛

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第19733号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. サマーエンジェル

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草勢は強、葉色は黄緑、葉の横断面の形状は平面、頂小葉の縦横比は縦長、頂小葉の鋸歯の形は中間、ランナー数はやや多、花の大きさは中、花房当たりの花数は少、果実の縦横比は同等、果実の大きさは中、果形は円錐、果皮の色は濃紅、果実の光沢はやや強、そう果の落ち込みは落ち込み中、がく片の着き方は離、果径に対するがく片の大きさは同等、果実の硬さはやや軟、果肉色は鮮紅、果心の色は淡赤、果実の空洞は無～極小、季性は四季成りである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「サマーエンジェル」は、対照品種「サマープリンセス」と比較して、葉色が黄緑であること、果皮の色が濃紅であること、果肉色が鮮紅であること等で区別性が認められる。対照品種「とちひとみ」と比較して、葉色が黄緑であること、花房当たりの花数が少であること、果皮の色が濃紅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

木下義明 矢澤有紀 山口秀和 山西久夫 原廣美 斎藤稔 中澤伸夫

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第19734号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. あわっ娘 (アワッコ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草勢は強、葉色は濃緑、葉の横断面の形状は平面、頂小葉の縦横比は縦長、頂小葉の鋸歯の形は中間、葉柄の長さはやや短、ランナー数は極少、花の大きさは中、花房当たりの花数はやや少、果実の縦横比は同等、果実の大きさはやや小、果形は円錐、果皮の色は濃紅、果実の光沢は強、そう果の落ち込みは落ち込み小、がく片の着き方は反転、果径に対するがく片の大きさは同等、果実の硬さは中、果肉色は鮮紅、果心の色は赤、果実の空洞は無～極小、季性は四季成りである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「あわっ娘」は、対照品種「スイートチャーミー」と比較して、果皮の色が濃紅であること、果実の光沢が強であること、果肉色が鮮紅であること、果心の色が赤であること等で区別性が認められる。対照品種「ティンカーベリー」と比較して、果皮の色が濃紅であること、果実の硬さが中であること、果肉色が鮮紅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

川人新一

徳島県三好市池田町西山峯ノ久保2889の3

川人茂

徳島県三好市池田町西山峯ノ久保2889の3

川人健一

徳島県三好市池田町西山峯ノ久保2889の3

6 登録品種の育成をした者の氏名

川人新一 川人茂 川人健一

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第19735号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. ティンカーベリー

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草勢はやや強、葉色は濃緑、葉の横断面の形状は平面、頂小葉の縦横比は縦長、頂小葉の鋸歯の形は中間、葉柄の長さは短、ランナー数は極少、花の大きさはやや大、花房当たりの花数は中、果実の縦横比は同等、果実の大きさは中、果形は円錐、果皮の色は赤、果実の光沢は強、そう果の落ち込みは落ち込み小、果径に対するがく片の大きさはやや小、果実の硬さは硬、果肉色は橙赤、果心の色は淡赤、果実の空洞は無～極小、季性は四季成りである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ティンカーベリー」は、対照品種「あわっ娘」と比較して、果皮の色が赤であること、果実の硬さが硬であること、果肉色が橙赤であること等で区別性が認められる。対照品種「スイートチャーミー」と比較して、果実の光沢が強であること、果実の硬さが硬であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

川人新一
徳島県三好市池田町西山峯ノ久保2889の3
川人茂
徳島県三好市池田町西山峯ノ久保2889の3
川人健一
徳島県三好市池田町西山峯ノ久保2889の3

6 登録品種の育成をした者の氏名

川人新一 川人茂 川人健一

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 7 3 6 号 平成 2 2 年 8 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hedera L. 翠雲（スイウン）
- 3 登録品種の特性の概要
樹性はつる性、茎の太さは極細、茎の長さは短、茎の色は緑褐、分枝性は粗、葉全体の形は円形、葉裂片の切れ込み程度は中裂、葉裂片の切れ込み数は 5 裂～ 7 裂、底裂片全体の形は楕円形、側裂片全体の形は楕円形、頂裂片全体の形は楕円形、側裂片先端の形は鈍形、頂裂片先端の形は鈍形、葉基部の形は心形、葉縁の波打ちは無, 有（春葉：無、秋葉：有）、葉縁の形は欠刻、葉身長は短、葉身幅はやや狭、成葉表面の色は 137A、成葉裏面の色は緑、葉脈の色は淡緑、葉柄の色は紅、斑の有無は無、成葉表面の光沢は弱、葉柄の長さは短である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「翠雲」は、対照品種「コーラ」と比較して、分枝性が粗であること、葉縁の形が欠刻であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
重野幹夫
愛知県知多郡武豊町大字東大高字浦之島82番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
重野幹夫
- 7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 9 月 2 4 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 7 3 7 号 平成 2 2 年 8 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hedera L. ゴールド ラッシュ

3 登録品種の特性の概要

樹性はつる性、茎の太さは太、茎の長さは長、茎の色は紅、分枝性は中、葉全体の形は五角形、葉裂片の切れ込み程度は浅裂、葉裂片の切れ込み数は 3 裂、底裂片全体の形は半円形、側裂片全体の形は三角形、頂裂片全体の形は三角形、側裂片先端の形は鈍形、頂裂片先端の形は鈍形、葉基部の形は心形、葉縁の波打ちは無、葉縁の形は全縁、葉身長はかなり長、葉身幅はかなり広、新葉の色は137A、成葉表面の色は137D、成葉裏面の色は灰緑、葉脈の色は淡緑、葉柄の色は紅、斑の有無は有、斑のパターンは覆輪、斑の色数は 2 色、葉の主たる斑色は10C、葉の 2 次の斑色はN138D、斑色の变化性は後ざえ、成葉表面の光沢は弱、葉柄の長さは極長である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ゴールド ラッシュ」は、対照品種「Variegata」(H. canariensis)と比較して、葉の主たる斑色が10Cであること、斑色の变化性が後ざえであること等で区別性が認められる。対照品種H. canariensisと比較して、新葉の色が137Aであること、成葉表面の色が137Dであること、斑の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

堤一生
静岡県浜松市北区三ヶ日町大崎800
長田文康
静岡県浜松市北区都田町1440

6 登録品種の育成をした者の氏名

後藤道司

7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 4 月 2 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19738号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hypericum L. マーブルハニーイエロー

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張性、樹高は低、枝の形は円形、枝の太さは細、枝の色は紅、葉全体の形は卵形、葉先端の形は鋭形、葉身長は短、葉身幅は狭、未成葉の色は黄緑、成葉表面の色は黄緑、斑の有無は有、斑のパターンは覆輪、斑色はその他（黄緑）、葉柄の長さは有、花序のタイプは集散花序、花弁の重なりはやや重なる、花径はやや小、花色は9A、花弁全体の形は倒卵形、花弁先端の形は円形、花弁の長さはやや短、花弁の幅はやや広、花柱の長さは雄ずいより低い、やくの色は橙、一花茎の花数はやや少である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「マーブルハニーイエロー」は、対照品種「Tricolor」と比較して、成葉表面の色が黄緑であること、斑色がその他（黄緑）であること等で区別性が認められる。対照品種H. x moserianumと比較して、成葉表面の色が黄緑であること、斑の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小関正司

岐阜県加茂郡坂祝町黒岩1498番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小関正司

7 出願公表の年月日 平成21年11月30日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 7 3 9 号 平成 2 2 年 8 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Phalaenopsis Group SEKAI-1314
- 3 登録品種の特性の概要
株の大きさはやや小、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは水平、葉の表面の色は緑、花序の型は複総状、花序の花数は中、花型は平咲、花の縦径はやや短、花の横径はやや狭、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様は単色、ドーサルセパルの地色は NN155C、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様は単色、ラテラルセパルの地色は NN155C、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様は単色、ペタルの地色は NN155C、リップの中央裂片の正面の形は卵形、リップの中央裂片の模様はぼかし、リップの中央裂片の地色は N155C、リップの中央裂片の模様の色は 9B(上部)、リップの側裂片の模様は縞斑、リップの側裂片の地色は NN155C、リップの側裂片の模様の色は 61A である。(カラーチャートは RHS を使用)
出願品種「SEKAI-1314」は、対照品種「SOGO-F1880」と比較して、花の横径がやや狭であること、ペタルの幅が狭であること、リップの中央裂片の正面の形が卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「SOGO-F1777」と比較して、ペタルの配列が開くであること、ラテラルセパルの模様が単色であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Chiang Kuei Feng
49-1, Shiao Fen Lane, Zhongzheng Rd., Linlue Township, Pingtung County, 909
Taiwan
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Chiang Kuei Feng
- 7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 5 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19740号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Group シーナズパール ゲイシャワルツ

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは斜上、葉の表面の色は緑、花序の型は複総状、花序の花数は少、花型は平咲、花の縦径は中、花の横径はやや広、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は卵形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様はぼかし、脈斑、点斑、ドーサルセパルの地色はN78A、ドーサルセパルの模様の色は155C(ぼかし), N78A(脈斑), N79C(点斑)、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様はぼかし、脈斑、点斑、ラテラルセパルの地色はN78A、ラテラルセパルの模様の色は155C(ぼかし), N78A(脈斑), N79C(点斑)、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様はぼかし、脈斑、点斑、ペタルの地色はN78A、ペタルの模様の色は155C(ぼかし), N78A(脈斑), N79C(点斑)、リップの中央裂片の正面の形は菱形、リップの中央裂片の模様はぼかし、リップの中央裂片の地色はN78A、リップの中央裂片の模様の色は59B、リップの側裂片の模様はぼかし、縞斑、リップの側裂片の地色は155C、リップの側裂片の模様の色は59B(ぼかし), 176A(縞斑)である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シーナズパール ゲイシャワルツ」は、対照品種「ユピンパール」と比較して、ペタルの模様がぼかし、脈斑、点斑であること、ペタルの地色がN78Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ビューティーセンチュリーパープルレイン」と比較して、ドーサルセパルの模様がぼかし、脈斑、点斑であること、ペタルの模様がぼかし、脈斑、点斑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社椎名洋ラン園
千葉県旭市井戸野1222

6 登録品種の育成をした者の氏名

椎名正剛

7 出願公表の年月日 平成21年4月6日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 7 4 1 号 平成 2 2 年 8 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Salvia L. ピナフォア ダークレッド
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は直立、草丈はやや高、茎の太さはやや細、茎の色は緑紫、1 次分枝数はやや少、最長節間長は中、葉序は対生、葉形はその他（楕円形）、最大葉長は極短、最大葉幅は極狭、葉色は緑、葉の厚さは中、葉柄の長さは極短、花穂の形は円筒、花穂長は長、花首長は短、花間長はやや長、花段数は少、花冠の形は唇状、花冠径（幅）は大、花冠筒長はやや短、花色の単色・複色の別は単色、花冠の地色は45B、がくの形は円筒状、がくの長さは中、がくの幅はやや長、がくの単色・複色の別は単色、がくの地色は187Bである。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ピナフォア ダークレッド」は、対照品種「ピナフォア ディープローズ」と比較して、葉縁の形が単鋸歯であること等で区別性が認められる。対照品種「マグナスチェリー」と比較して、葉形がその他（楕円形）であること、がくの単色・複色の別が単色であること等で区別性が認められる。対照品種「川端C1号」と比較して、葉形がその他（楕円形）であること、がくの地色が187Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
小林俊之
埼玉県深谷市大谷1654番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
小林俊之
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 3 月 4 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19742号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Salvia L. ピナフォア ピンクアイ

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈は中、茎の太さはやや細、茎の色は緑紫、1次分枝数は中、最長節間長は中、葉序は対生、葉形はその他（長楕円形）、最大葉長は極短、最大葉幅は極狭、葉色は緑、葉の厚さは中、葉柄の長さは極短、花穂の形は円筒、花穂長はやや長、花首長はかなり短、花間長はやや短、花段数はかなり少、花冠の形は唇状、花冠径（幅）は大、花冠筒長は短、花色の単色・複色の別は複色、複色の発現パターンはその他（喉部）、花冠の地色はN66A、花冠の複色の色は69D、がくの形は円筒状、がくの長さは中、がくの幅はやや長、がくの単色・複色の別は複色、がくの色は複色発現パターンはぼかし、がくの地色は183A、がくの複色の色は144Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ピナフォア ピンクアイ」は、対照品種「ピナフォア パステルバイオレット」と比較して、花冠の地色がN66Aであること、がくの単色・複色の別が複色であること等で区別性が認められる。対照品種「ピナフォア ディープローズ」と比較して、花色の単色・複色の別が複色であること、がくの地色が183Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小林俊之
埼玉県深谷市大谷1654番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小林俊之

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19743号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Salvia L. ピナフォアピュアホワイト

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈は中、茎の太さは中、茎の色は緑紫、1次分枝数はやや少、最長節間長はやや短、葉序は対生、葉形はその他（楕円形）、最大葉長はかなり短、最大葉幅は極狭、葉色は緑、葉の厚さは中、葉柄の長さは極短、花穂の形は円筒、花穂長はやや長、花首長はかなり短、花間長はやや短、花段数はかなり少、花冠の形は唇状、花冠径（幅）は大、花冠筒長は短、花色の単色・複色の別は単色、花冠の地色はNN155B、がくの形は円筒状、がくの長さは中、がくの幅はやや長、がくの単色・複色の別は単色、がくの地色は144Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ピナフォアピュアホワイト」は、対照品種「ピナフォア ホワイト」と比較して、茎長がやや長であること、がくの幅がやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「白花チェリーセージ」と比較して、茎長がやや長であること、葉形がその他（楕円形）であること、花冠径（幅）が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小林俊之
埼玉県深谷市大谷1654番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小林俊之

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19744号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Salvia L. TL468

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈は低、茎の太さはやや細、茎の色は緑、1次分枝数はやや少、最長節間長は短、葉序は対生、葉形は卵形、最大葉長は短、最大葉幅はやや狭、葉色は緑、葉の厚さは中、葉柄の長さは極短、花穂の形は円筒、花穂長はやや短、花首長は短、花間長は短、花段数は少、花冠の形は筒状、花冠径（幅）は小、花冠筒長は中、花色の単色・複色の別は単色、花冠の地色は51B、がくの形は鐘状、がくの長さは長、がくの幅はやや長、がくの単色・複色の別は単色、がくの地色は32Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TL468」は、対照品種「ピカンテ サーモン」と比較して、最大葉幅がやや狭であること、がくの地色が32Bであること等で区別性が認められる。対照品種「シズラー サーモン」と比較して、がくの地色が32Bであること、開花期が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

馬庭弘和

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19745号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Salvia L. TL469

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈は低、茎の太さはやや細、茎の色は緑、1次分枝数はやや少、最長節間長はかなり短、葉序は対生、葉形は卵形、最大葉長は短、最大葉幅は中、葉色は緑、葉の厚さはやや薄、葉柄の長さはかなり短、花穂の形は円筒、花穂長はやや短、花首長はやや短、花間長はやや短、花段数はかなり少、花冠の形は筒状、花冠径（幅）は小、花冠筒長は中、花色の単色・複色の別は単色、花冠の地色は53C、がくの形は鐘状、がくの長さはかなり長、がくの幅はやや長、がくの単色・複色の別は単色、がくの地色は45Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TL469」は、対照品種「シズラー バーガンディー」と比較して、花冠の地色が53Cであること、がくの地色が45Aであること等で区別性が認められる。対照品種「フラメンコ レッド」と比較して、花冠の地色が53Cであること、がくの地色が45Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

馬庭弘和

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19746号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Salvia L. TL470

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈は低、茎の太さは中、茎の色は緑紫、1次分枝数はやや少、最長節間長はかなり短、葉序は対生、葉形は卵形、最大葉長はやや短、最大葉幅はやや広、葉色は緑、葉の厚さは中、葉柄の長さは短、花穂の形は円筒、花穂長は中、花首長はかなり短、花間長は短、花段数は少、花冠の形は筒状、花冠径（幅）はやや小、花冠筒長は中、花色の単色・複色の別は単色、花冠の地色はN79C、がくの形は鐘状、がくの長さは極長、がくの幅は長、がくの単色・複色の別は単色、がくの地色はN79Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TL470」は、対照品種「ビスタ パープル」と比較して、花首長がかなり短であること、開花期が早であること等で区別性が認められる。対照品種「シズラー パープル」と比較して、花首長がかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「カラビニエール バイオレット」と比較して、花穂長が中であること、開花期が早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

馬庭弘和

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19747号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Salvia L. TL471

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈は低、茎の太さはやや細、茎の色は緑、1次分枝数はやや少、最長節間長は極短、葉序は対生、葉形は卵形、最大葉長はやや短、最大葉幅は中、葉色は濃緑、葉の厚さは中、葉柄の長さはかなり短、花穂の形は円筒、花穂長は短、花首長は短、花間長は短、花段数は少、花冠の形は筒状、花冠径（幅）は小、花冠筒長はやや長、花色の単色・複色の別は単色、花冠の地色はNN155C、がくの形は鐘状、がくの長さは長、がくの幅はやや長、がくの単色・複色の別は単色、がくの地色は150Dである。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TL471」は、対照品種「ビスタ ホワイト」と比較して、がくの長さが長であること等で区別性が認められる。対照品種「サルサ ホワイト」と比較して、花穂長が短であること等で区別性が認められる。対照品種「シズラー ホワイト」と比較して、葉色が濃緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

馬庭弘和

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19748号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Salvia L. DANSALGRE1

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈はやや高、茎の太さは細、茎の色は緑紫、1次分枝数はかなり少、最長節間長はやや短、葉序は対生、葉形はその他（楕円形）、最大葉長は極短、最大葉幅は極狭、葉色は緑、葉の厚さは中、葉柄の長さは極短、花穂の形は円筒、花穂長は中、花首長は短、花間長はやや短、花段数は少、花冠の形は唇状、花冠径（幅）は大、花冠筒長は短、花色の単色・複色の別は単色、花冠の地色はN57A、がくの形は円筒状、がくの長さは中、がくの幅は中、がくの単色・複色の別は単色、がくの地色は187Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DANSALGRE1」は、対照品種「ピナフォア ディープローズ」と比較して、茎長が極長であること、がくの地色が187Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ピナフォア ダークレッド」と比較して、葉縁の形が全縁であること、花冠の地色がN57Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger-Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297 Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gabriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19749号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Silene L. ローリーズフェイヴォリット

3 登録品種の特性の概要

草型は直立、草丈は低、分枝性の中、茎の太さは細、茎の色は緑、葉の形は卵形、葉身長は短、葉身幅は中、葉の表面の色は138A、葉のアントシアンの着色の有無は有、裏面の色は淡緑、斑の有無は無、花序の形は集散花序、花序の大きさは小、花型は一重、花容は内曲、花の向きは上向き、横向き、花径は中、花弁の形は倒心形、花弁先端の切れ込みは2裂、花弁先端の切れ込みの深さはやや深、花弁のフリルは無、花弁基部突起(scale)の有無は有、花弁基部突起(scale)の形は鈍形、花弁の長さは中、花弁の幅は中、花色パターンは単色、花弁表面の色は64C、花弁表面の脈の着色は無、花弁裏面の色はN57D、花弁裏面の脈の着色は無、花弁基部突起(scale)の色は155B、花色の変化の有無は無、萼の形は長円形、萼の膨らみは有、萼の大きさは中、萼の色は59A、萼の脈の明・不明は不明瞭、雄蕊の長さは中、雄蕊の色はクリーム、1花序当りの花数は少である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ローリーズフェイヴォリット」は、対照品種「Flore Pleno」と比較して、花序の形が集散花序であること、花型が一重であること、花弁表面の色が64Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フューチャープランツ ライセンティ B.V.

オランダ王国 トウルスポール 53A 2165AW リセルブルグ

6 登録品種の育成をした者の氏名

ヘルバート オウドスホーン

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第19750号 平成22年8月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Silene L. ナッキー ホワイト

3 登録品種の特性の概要

草型はカーペット状、草丈は低、分枝性は中、茎の太さは細、茎の色は灰緑、葉の形は線状楕円形、葉身長は短、葉身幅は狭、葉の表面の色は189A、葉のアントシアンの着色の有無は無、裏面の色は灰緑、斑の有無は有、斑の色の数は1色、斑の色は白、斑の形は覆輪、花序の形は散形、花序の大きさは小、花型は一重、花容は内曲、花の向きは上向き、花径は中、花弁の形は倒心形、花弁先端の切れ込みは2裂、花弁先端の切れ込みの深さは深、花弁のフリルは無、花弁基部突起(scale)の有無は有、花弁基部突起(scale)の形は鈍形、花弁の長さはやや短、花弁の幅は中、花色パターンは単色、花弁表面の色は155C、花弁表面の脈の着色は無、花弁裏面の色は155C、花弁裏面の脈の着色は無、花弁基部突起(scale)の色は155C、花色の変化の有無は無、萼の形は卵形、萼の膨らみは有、萼の大きさはやや大、萼の色は193D、萼のアントシアンの着色は有、萼のアントシアンの着色の程度は中、萼の脈の明・不明は明瞭、萼の脈の色は桃、萼の脈の形は網目状、雌蕊の長さは長、雄蕊の長さは短、雌蕊の色は白、雄蕊の色は白、1花序当りの花数は少である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ナッキー ホワイト」は、対照品種「ドレッツバリエータ」と比較して、萼の形が卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「ミドリ」と比較して、葉の表面の色が189Aであること、斑の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

矢澤稔
埼玉県鴻巣市北根1306

6 登録品種の育成をした者の氏名

矢澤稔

7 出願公表の年月日 平成20年2月19日