1 品種登録の番号及び年月日 第19751号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott RIJN200038

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の裂片の重なりは内曲で非接触、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡は中、葉柄の長さは中、花茎の長さは中、花茎の緑色の濃淡は中、花茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、仏炎苞の大きさは中、仏炎苞の形は広卵形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは内曲で非接触、仏炎苞の先端部の形は円形、仏炎苞の先端の形は広鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色は45B, 141A(裂片下部)、仏炎苞の凹凸の強弱は中、仏炎苞の花柄との角度は直角、肉穂花序の長さはやや短、肉穂花序の太さは中、肉穂花序の曲がりは直、肉穂花序の先細りの強弱は極弱、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は黄、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は黄、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は黄である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「RIJN200038」は、対照品種「ファラン」と比較して、仏炎苞の形が広卵形であること、仏炎苞裏面の主な色が46D, 143C(裂片下部)であること等で区別性が認められる。対照品種「アンスBNZL」と比較して、仏炎苞の形が広卵形であること、仏炎苞裏面の主な色が46D, 143C(裂片下部)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

RIJNPLANT B. V.

Hofzichtlaan 5, 2678NC De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Leo van Rijn

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19752号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott RIJN200023

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の裂片の重なりは内曲で非接触、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡は中、葉柄の長さはやや長、花茎の長さは中、花茎の緑色の濃淡は淡、花茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、仏炎苞の大きさは中、仏炎苞の形は卵形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは離れる、仏炎苞の先端部の形は円形、仏炎苞の先端の形は広鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色は45A, 143B(裂片下部)、仏炎苞の凹凸の強弱は強、仏炎苞の花柄との角度は鋭角、肉穂花序の長さは中、肉穂花序の太さはやや細、肉穂花序の曲がり直は直、肉穂花序の先細りの強弱は弱、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は黄、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は黄である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「RIJN200023」は、対照品種「アンセペディ」と比較して、仏炎苞の花柄との角度が鋭角であること、肉穂花序の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

RIJNPLANT B. V.
Hofzichtlaan 5, 2678NC De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Leo van Rijn

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第19753号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott RIJN200310

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は狭卵形、葉身の裂片の重なりは内曲で非接触、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡は中、葉柄の長さはやや長、花茎の長さは中、花茎の緑色の濃淡は中、花茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、仏炎苞の大きさはやや小、仏炎苞の形は卵形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは内曲で非接触、仏炎苞の先端部の形は円形、仏炎苞の先端の形は広鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色は46A, 144A(裂片下部)、仏炎苞の凹凸の強弱は中、仏炎苞の花柄との角度は鈍角、肉穂花序の長さはやや短、肉穂花序の太さはやや細、肉穂花序の曲がり直、肉穂花序の先細りの強弱は弱、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は黄、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は黄である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「RIJN200310」は、対照品種「アンスブネク」と比較して、仏炎苞の形が卵形であること、仏炎苞の裂片の重なりが内曲で非接触であること等で区別性が認められる。対照品種「アンセペディ」と比較して、仏炎苞の形が卵形であること、仏炎苞の裂片の重なりが内曲で非接触であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

RIJNPLANT B. V.
Hofzichtlaan 5, 2678NC De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Leo van Rijn

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第19754号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott RIJN200325

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は狭卵形、葉身の裂片の重なりは離れる、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡は中、葉柄の長さは中、花茎の長さはやや短、花茎の緑色の濃淡は中、花茎のアントシアニン着色の強弱は中、仏炎苞の大きさは小、仏炎苞の形は卵形、仏炎苞の裂片の有無は無、仏炎苞の先端部の形は鋭形、仏炎苞の先端の形は鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色は53C、仏炎苞の凹凸の強弱は極弱、仏炎苞の花柄との角度は鈍角、肉穂花序の長さは短、肉穂花序の太さはやや細、肉穂花序の曲がりは直、肉穂花序の先細りの強弱は極弱、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は紫、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は紫、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は紫、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は紫である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「RIJN200325」は、対照品種「ピンクチャンピオン」と比較して、仏炎苞の表面の主な色が53Cであること、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色が紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

RIJNPLANT B. V.
Hofzichtlaan 5, 2678NC De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Leo van Rijn

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第19755号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott RIJN200327

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや小、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の裂片の重なりは内曲で非接触、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡は中、葉柄の長さは中、花茎の長さは中、花茎の緑色の濃淡は中、花茎のアントシアニン着色の強弱は弱、仏炎苞の大きさは小、仏炎苞の形は卵形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは離れる、仏炎苞の先端部の形は鋭形、仏炎苞の先端の形は鋭形、仏炎苞の表面の主な色は45C, 144A(裂片下部)、仏炎苞の凹凸の強弱は弱、仏炎苞の花柄との角度は直角、肉穂花序の長さは短、肉穂花序の太さは細、肉穂花序の曲がりには弱く内曲、肉穂花序の先細りの強弱は中、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は黄、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は黄である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「RIJN200327」は、対照品種「ビバロ」と比較して、花茎のアントシアニン着色の強弱が弱であること、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色が白～淡黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

RIJNPLANT B. V.

Hofzichtlaan 5, 2678NC De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Leo van Rijn

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第19756号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott RIJN200332

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや小、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の裂片の重なりは離れる、葉身の先端の形は狭鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡は中、葉柄の長さはやや短、花茎の長さはやや短、花茎の緑色の濃淡は中、花茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、仏炎苞の大きさは小、仏炎苞の形は広卵形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは離れる、仏炎苞の先端部の形は円形、仏炎苞の先端の形は広鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色はN30A, 147A(裂片下部)、仏炎苞の凹凸の強弱は中、仏炎苞の花柄との角度は直角、肉穂花序の長さは短、肉穂花序の太さは細、肉穂花序の曲がり直、肉穂花序の先細りの強弱は弱、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は黄、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は黄である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「RIJN200332」は、対照品種「ユークン」と比較して、仏炎苞の葉に対する位置が同位であること、仏炎苞の先端部の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

RIJNPLANT B. V.

Hofzichtlaan 5, 2678NC De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Leo van Rijn

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第19757号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott RIJN200402

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや小、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の裂片の重なりは内曲で非接触、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡は濃、葉柄の長さは中、花茎の長さは中、花茎の緑色の濃淡は濃、花茎のアントシアニン着色の強弱は中、仏炎苞の大きさはやや小、仏炎苞の形は卵形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは内曲で非接触、仏炎苞の先端部の形は鋭形、仏炎苞の先端の形は鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色は177A, 146B(裂片下部)、仏炎苞の凹凸の強弱は弱、仏炎苞の花柄との角度は直角、肉穂花序の長さは中、肉穂花序の太さはやや太、肉穂花序の曲がり直は直、肉穂花序の先細りの強弱は弱、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は赤紫、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は褐、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は赤紫、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は褐である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「RIJN200402」は、対照品種「ブラウンジャイアント」と比較して、仏炎苞の凹凸の強弱が弱であること、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色が赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

RIJNPLANT B. V.

Hofzichtlaan 5, 2678NC De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Leo van Rijn

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第19758号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott RIJN200420

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや小、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の形は狭卵形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の表面の緑色の濃淡は中、葉柄の長さはやや短、花茎の長さはやや短、花茎の緑色の濃淡は中、花茎のアントシアニン着色の強弱は中、仏炎苞の大きさは小、仏炎苞の形は卵形、仏炎苞の裂片の有無は無、仏炎苞の先端部の形は鋭形、仏炎苞の先端の形は狭鋭形、仏炎苞の表面の主な色は52A, 146C(下部周縁)、仏炎苞の凹凸の強弱は極弱、仏炎苞の花柄との角度は直角、肉穂花序の長さは短、肉穂花序の太さは細、肉穂花序の曲がり直、肉穂花序の先細りの強弱は中、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は桃、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は橙、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は桃、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は橙である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「RIJN200420」は、対照品種「ビバロ」と比較して、葉身の裂片の有無が無であること、仏炎苞の裂片の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「ピンクチャンピオン」と比較して、葉身の裂片の有無が無であること、仏炎苞の裂片の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

RIJNPLANT B. V.

Hofzichtlaan 5, 2678NC De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Leo van Rijn

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第19759号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott RIJN200449

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや小、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の裂片の重なりは内曲で非接触、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡は濃、葉柄の長さは中、花茎の長さはやや短、花茎の緑色の濃淡は濃、花茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、仏炎苞の大きさはやや小、仏炎苞の形は広楕円形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは内曲で非接触、仏炎苞の先端部の形は円形、仏炎苞の先端の形は広鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色は187A, 143A(裂片下部)、仏炎苞の凹凸の強弱は強、仏炎苞の花柄との角度は鈍角、肉穂花序の長さはやや短、肉穂花序の太さは中、肉穂花序の曲がりは弱く内曲、肉穂花序の先細りの強弱は弱、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は黄、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は緑、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は黄、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は褐である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「RIJN200449」は、対照品種「ブラウンジャイアント」と比較して、仏炎苞の大きさがやや小であること、仏炎苞の形が広楕円形であること等で区別性が認められる。対照品種「チョコ」と比較して、植物体の大きさがやや小であること、仏炎苞の大きさがやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

RIJNPLANT B. V.
Hofzichtlaan 5, 2678NC De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Leo van Rijn

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第19760号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Athyrium niponicum (Mett.) Hance バーガンディーレース

3 登録品種の特性の概要

草型は開張、草丈はやや低、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は狭三角形、羽片の長さは中、羽片の幅は中、小羽片の切れ込みの深さは深、葉身の表面の色数は3色以上、葉身の表面の主な色は189A、葉身の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）は189B、葉身の表面の二次色の分布（2色以上の品種に限る。）は中斑、葉身の表面の三次色（3色以上の品種に限る。）は147A、葉身の表面の三次色の分布（3色以上の品種に限る。）は羽片下部、葉身表面の羽軸のアントシアニン着色の有無は有、葉身表面の羽軸のアントシアニン着色の強弱は強、葉身の裏面の主な色は137B、中軸の表面の色はN186C、葉柄の長さは中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「バーガンディーレース」は、対照品種「アースラスレッド」と比較して、葉身の表面の主な色が189Aであること、葉身表面の羽軸のアントシアニン着色の強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種「ピューターレース」と比較して、小羽片の切れ込みの深さが深であること、葉身表面の羽軸のアントシアニン着色の強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

テラ ノバ ナーセリー

アメリカ合衆国 オレゴン キャンベイ マックスバーグ ロード 10051

6 登録品種の育成をした者の氏名

ダニエル ヘイムズ

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第19761号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia L. ARCTICBREEZE

3 登録品種の特性の概要

草型は横走根茎型、草丈は低、葉の型は単葉、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉身の厚さは厚、葉身の形(単葉の品種に限る。)は卵形、葉身における葉柄の着生位置(単葉の品種に限る。)は葉縁、葉身の基部の形(葉柄が葉縁に着生する品種に限る。)は僅かに重なる、葉身の先端部の形は鋭形、葉身の切れ込みの深さ(単葉の品種に限る。)はかなり浅、葉身の周縁の形は重複鈍鋸歯状、葉身の周縁の鋸歯の深さはかなり浅、葉身の周縁の波打ちの強弱(単葉の品種に限る。)は弱、葉身の表面の色数は3色、葉身の表面の主な色は189C、葉身の表面の模様の有無は無、葉身の表面の脈上模様の有無は有、葉身の表面の脈上模様の分布は全体、葉身の表面の脈上模様の幅は中、葉身の表面の脈上模様の色は濃緑、葉身の表面の葉底の色は赤、葉身の表面の毛の粗密は粗、葉身の表面の突起の粗密は粗、葉身の凹凸の強弱は弱、葉身の裏面の主な色は赤紫、葉身の裏面の二次色は淡緑、葉身の裏面の主脈の色は赤紫、葉柄の長さは中、葉柄の太さはやや細、葉柄の模様の有無は無、葉柄の毛の有無は有、葉柄の毛の色は赤、花房の向きは上向き、花柄の長さは短、雄花の花弁の数は4、雄花の直径は小、雄花の表面の色数は2色以上、雄花の外花弁の形は卵形、雄花の外花弁の表面の先端部の色はN155B、雄花の外花弁の表面の基部の色はN155B、雄花の内花弁の表面の先端部の色(2弁花を除く。)はN155A、雄花の内花弁の表面の基部の色(2弁花を除く。)はN155A、やくの色(八重品種を除く。)は橙、子房の長さは中、子房の幅はかなり狭、子房の中央部の色は緑、子房の翼の色は淡緑である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ARCTICBREEZE」は、対照品種「ホワイトスノー」と比較して、葉身の表面の色数が3色であること、葉身の裏面の主な色が赤紫であること、葉身の裏面の二次色が淡緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Koppe Royalty B. V.
Putterbrink 1, 3881LK Putten, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Lubbertus H. Koppe

7 出願公表の年月日 平成20年2月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第19762号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia L. INCA FIRE

3 登録品種の特性の概要

草型は横走根茎型、草丈は低、葉の型は単葉、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉身の厚さはやや薄、葉身の形(単葉の品種に限る。)は卵形、葉身における葉柄の着生位置(単葉の品種に限る。)は葉縁、葉身の基部の形(葉柄が葉縁に着生する品種に限る。)は僅かに重なる、葉身の先端部の形は鋭尖形、葉身の切れ込みの深さ(単葉の品種に限る。)は浅、葉身の周縁の形は鋸歯状、葉身の周縁の鋸歯の深さは中、葉身の周縁の波打ちの強弱(単葉の品種に限る。)は弱、葉身の表面の色数は単色、葉身の表面の主な色は60A、葉身の表面の模様の有無は無、葉身の表面の脈上模様の有無は無、葉身の表面の葉底の色は赤、葉身の表面の毛の粗密は粗、葉身の表面の突起の粗密は粗、葉身の凹凸の強弱は弱、葉身の裏面の主な色は灰緑、葉身の裏面の主脈の色は赤紫、葉柄の長さは長、葉柄の太さは中、葉柄の模様の有無は無、葉柄の毛の有無は有、葉柄の毛の色は赤、花房の向きは上向き、花柄の長さはやや長、雄花の花弁の数は4、雄花の直径は中、雄花の表面の色数は1色、雄花の外花弁の形は卵形、雄花の外花弁の表面の先端部の色は62B、雄花の外花弁の表面の基部の色は62B、雄花の内花弁の表面の先端部の色(2弁花を除く。)は62B、雄花の内花弁の表面の基部の色(2弁花を除く。)は62B、やくの色(八重品種を除く。)は橙、子房の長さは中、子房の幅は広、子房の中央部の色は赤紫、子房の翼の色は赤紫である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「INCA FIRE」は、対照品種「ステンドグラス」と比較して、葉身の表面の色数が単色であること、葉身の裏面の主な色が灰緑であること等で区別性が認められる。対照品種「ベネチアンレッド」と比較して、葉身の表面の主な色が60Aであること、葉身の裏面の主な色が灰緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Koppe Royalty B. V.
Putterbrink 1, 3881LK Putten, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Lubbertus H. Koppe

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第19763号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia L. INDIAN SUMMER

3 登録品種の特性の概要

草型は横走根茎型、草丈はやや低、葉の型は単葉、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉身の厚さはやや厚、葉身の形(単葉の品種に限る。)は卵形、葉身における葉柄の着生位置(単葉の品種に限る。)は葉縁、葉身の基部の形(葉柄が葉縁に着生する品種に限る。)は閉じる、葉身の先端部の形は鋭尖形、葉身の切れ込みの深さ(単葉の品種に限る。)はかなり浅、葉身の周縁の形は鋸歯状、葉身の周縁の鋸歯の深さはかなり浅、葉身の周縁の波打ちの強弱(単葉の品種に限る。)は弱、葉身の表面の色数は3色、葉身の表面の主な色は187D、葉身の表面の模様の有無は無、葉身の表面の脈上模様の有無は有、葉身の表面の脈上模様の分布は中央、葉身の表面の脈上模様の幅は中、葉身の表面の脈上模様の色は暗褐、葉身の表面の葉底の色は赤、葉身の表面の毛の粗密は無又は極粗、葉身の表面の突起の粗密は粗、葉身の凹凸の強弱はかなり弱、葉身の裏面の主な色は淡緑、葉身の裏面の二次色は赤紫、葉身の裏面の主脈の色は赤紫、葉柄の長さは長、葉柄の太さは細、葉柄の模様の有無は無、葉柄の毛の有無は有、葉柄の毛の色は黄白、花房の向きは上向き、花柄の長さはやや短、雄花の花弁の数は4、雄花の直径はやや大、雄花の表面の色数は1色、雄花の外花弁の形は卵形、雄花の外花弁の表面の先端部の色は68C、雄花の外花弁の表面の基部の色は68C、雄花の内花弁の表面の先端部の色(2弁花を除く。)は68C、雄花の内花弁の表面の基部の色(2弁花を除く。)は68C、やくの色(八重品種を除く。)は黄、子房の長さはやや長、子房の幅はやや狭、子房の中央部の色は濃ピンク、子房の翼の色は濃ピンクである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「INDIAN SUMMER」は、対照品種「金環」と比較して、葉身の表面の色数が3色であること、葉身の表面の主な色が187Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ベネチアン レッド」と比較して、葉身の裏面の主な色が淡緑であること、葉身の裏面の二次色が赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Koppe Royalty B.V.

Putterbrink 1, 3881LK Putten, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Lubbertus H. Koppe

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第19764号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia L. GREEN VALLEYLEAF

3 登録品種の特性の概要

草型は横走根茎型、草丈はやや低、葉の型は単葉、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉身の厚さは中、葉身の形(単葉の品種に限る。)は卵形、葉身における葉柄の着生位置(単葉の品種に限る。)は葉縁、葉身の基部の形(葉柄が葉縁に着生する品種に限る。)は開く、葉身の先端部の形は鋭形、葉身の切れ込みの深さ(単葉の品種に限る。)はかなり浅、葉身の周縁の形は鈍鋸歯状、葉身の周縁の鋸歯の深さはかなり浅、葉身の周縁の波打ちの強弱(単葉の品種に限る。)は弱、葉身の表面の色数は5色以上、葉身の表面の主な色は190B、葉身の表面の二次色は138A、葉身の表面の二次色の分布は周縁部、葉身の表面の三次色は175B、葉身の表面の三次色の分布は周縁部、葉身の表面の模様の有無は有、葉身の表面の主な模様の型は班点、葉身の表面の主な模様の分布は周縁部、葉身の表面の主な模様の色は190B、葉身の表面の脈上模様の有無は有、葉身の表面の脈上模様の分布は中央、葉身の表面の脈上模様の幅は中、葉身の表面の脈上模様の色は濃緑、葉身の表面の葉底の色は赤、葉身の表面の毛の粗密はかなり粗、葉身の表面の突起の粗密は粗、葉身の凹凸の強弱は中、葉身の裏面の主な色は暗褐、葉身の裏面の主脈の色は赤紫、葉柄の長さは中、葉柄の太さは中、葉柄の模様の有無は無、葉柄の毛の有無は有、葉柄の毛の色は赤、花房の向きは上向き、花柄の長さはやや短、雄花の花弁の数は4、雄花の直径はやや大、雄花の表面の色数は2色以上、雄花の外花弁の形は卵形、雄花の外花弁の表面の先端部の色はN155A、雄花の外花弁の表面の基部の色は64D、雄花の内花弁の表面の先端部の色(2弁花を除く。)はN155A、雄花の内花弁の表面の基部の色(2弁花を除く。)はN155A、やくの色(八重品種を除く。)は黄、子房の長さはやや長、子房の幅は中、子房の中央部の色は赤紫、子房の翼の色は赤紫である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「GREEN VALLEYLEAF」は、対照品種「ホワイトスノー」と比較して、葉身の表面の三次色が175Bであること、葉身の表面の模様の有無が有であること、葉身の表面の脈上模様の分布が中央であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Koppe Royalty B.V.
Putterbrink 1, 3881LK Putten, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Lubbertus H. Koppe

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第19765号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia L. コタキレッド

3 登録品種の特性の概要

草型は横走根茎型、草丈はかなり低、葉の型は単葉、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉身の厚さは厚、葉身の形(単葉の品種に限る。)は卵形、葉身における葉柄の着生位置(単葉の品種に限る。)は葉縁、葉身の基部の形(葉柄が葉縁に着生する品種に限る。)は僅かに重なる、葉身の先端部の形は鋭形、葉身の切れ込みの深さ(単葉の品種に限る。)はかなり浅、葉身の周縁の形は重複鈍鋸歯状、葉身の周縁の鋸歯の深さは浅、葉身の周縁の波打ちの強弱(単葉の品種に限る。)は弱、葉身の表面の色数は3色、葉身の表面の主な色は184A、葉身の表面の模様の有無は無、葉身の表面の脈上模様の有無は有、葉身の表面の脈上模様の分布は全体、葉身の表面の脈上模様の幅は中、葉身の表面の脈上模様の色は暗褐、葉身の表面の葉底の色は赤、葉身の表面の毛の粗密は中、葉身の表面の突起の粗密は粗、葉身の凹凸の強弱は中、葉身の裏面の主な色は暗褐、葉身の裏面の二次色は暗褐、葉身の裏面の主脈の色は赤紫、葉柄の長さはやや短、葉柄の太さはやや太、葉柄の模様の有無は無、葉柄の毛の有無は有、葉柄の毛の色は赤、花房の向きは上向き、花柄の長さは極短、雄花の花弁の数は4、雄花の直径は小、雄花の表面の色数は1色、雄花の外花弁の形は卵形、雄花の外花弁の表面の先端部の色は62C、雄花の外花弁の表面の基部の色は62C、雄花の内花弁の表面の先端部の色(2弁花を除く。)は62C、雄花の内花弁の表面の基部の色(2弁花を除く。)は62C、やくの色(八重品種を除く。)は黄、子房の長さはやや短、子房の幅は狭、子房の中央部の色はピンク、子房の翼の色はピンクである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「コタキレッド」は、対照品種「インカファイヤー」と比較して、葉身の表面の色数が3色であること、葉身の表面の脈上模様の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「金環」と比較して、葉身の表面の色数が3色であること、葉身の表面の主な色が184Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

古滝義己
千葉県市原市米原699-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

古滝義己

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19766号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia L. MAORI HAZE

3 登録品種の特性の概要

草型は横走根茎型、草丈は低、葉の型は単葉、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉身の厚さは中、葉身の形(単葉の品種に限る。)は卵形、葉身における葉柄の着生位置(単葉の品種に限る。)は葉縁、葉身の基部の形(葉柄が葉縁に着生する品種に限る。)は開く、葉身の先端部の形は鋭尖形、葉身の切れ込みの深さ(単葉の品種に限る。)は無又極浅、葉身の周縁の形は重複鋸歯状、葉身の周縁の鋸歯の深さは浅、葉身の周縁の波打ちの強弱(単葉の品種に限る。)は弱、葉身の表面の色数は3色、葉身の表面の主な色は191A、葉身の表面の二次色は64A、葉身の表面の二次色の分布は周縁部及び中央部、葉身の表面の模様の有無は無、葉身の表面の脈上模様の有無は無、葉身の表面の葉底の色は赤、葉身の表面の毛の粗密は無又は極粗、葉身の表面の突起の粗密は無又は極粗、葉身の凹凸の強弱は弱、葉身の裏面の主な色は灰、葉身の裏面の二次色は赤紫、葉身の裏面の主脈の色は赤紫、葉柄の長さは中、葉柄の太さは細、葉柄の模様の有無は無、葉柄の毛の有無は無、花房の向きは横向き、花柄の長さはやや短、雄花の花弁の数は4、雄花の直径は小、雄花の表面の色数は1色、雄花の外花弁の形は卵形、雄花の外花弁の表面の先端部の色は69A、雄花の外花弁の表面の基部の色は62A、雄花の内花弁の表面の先端部の色(2弁花を除く。)は69A、雄花の内花弁の表面の基部の色(2弁花を除く。)は62A、やくの色(八重品種を除く。)は黄、子房の長さは中、子房の幅は狭、子房の中央部の色は赤、子房の翼の色は赤紫である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「MAORI HAZE」は、対照品種「Volcanoleaf」と比較して、葉身の表面の主な色が191Aであること、葉身の表面の脈上模様の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「パープルシャドー」と比較して、葉身の表面の二次色が64Aであること、葉身の表面の脈上模様の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Koppe Royalty B.V.
Putterbrink 1, 3881LK Putten, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Lubbertus H. Koppe

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19767号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia L. MORNING DEW

3 登録品種の特性の概要

草型は横走根茎型、草丈は低、葉の型は単葉、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉身の厚さはやや薄、葉身の形(単葉の品種に限る。)は卵形、葉身における葉柄の着生位置(単葉の品種に限る。)は葉縁、葉身の基部の形(葉柄が葉縁に着生する品種に限る。)は開く、葉身の先端部の形は鋭尖形、葉身の切れ込みの深さ(単葉の品種に限る。)は浅、葉身の周縁の形は鋸歯状、葉身の周縁の鋸歯の深さは浅、葉身の周縁の波打ちの強弱(単葉の品種に限る。)は弱、葉身の表面の色数は4色、葉身の表面の主な色は143A、葉身の表面の二次色は79A、葉身の表面の二次色の分布は中央部、葉身の表面の模様の有無は有、葉身の表面の主な模様の型は班点、葉身の表面の主な模様の分布は全面、葉身の表面の主な模様の色は192C、葉身の表面の脈上模様の有無は無、葉身の表面の葉底の色は赤、葉身の表面の毛の粗密は無又は極粗、葉身の表面の突起の粗密は無又は極粗、葉身の凹凸の強弱は弱、葉身の裏面の主な色は灰緑、葉身の裏面の二次色は赤紫、葉身の裏面の主脈の色は赤紫、葉柄の長さはやや長、葉柄の太さは中、葉柄の模様の有無は無、葉柄の毛の有無は有、葉柄の毛の色は赤、花房の向きは横向き、花柄の長さはかなり長、雄花の花弁の数は4、雄花の直径は中、雄花の表面の色数は1色、雄花の外花弁の形は卵形、雄花の外花弁の表面の先端部の色はN66B、雄花の外花弁の表面の基部の色は65D、雄花の内花弁の表面の先端部の色(2弁花を除く。)はN66B、雄花の内花弁の表面の基部の色(2弁花を除く。)は69D、やくの色(八重品種を除く。)は黄、子房の長さはやや長、子房の幅は狭、子房の中央部の色は淡緑、子房の翼の色は赤紫である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「MORNING DEW」は、対照品種「MONTGOMERY」と比較して、葉身の切れ込みの深さ(単葉の品種に限る。)が浅であること、葉身の表面の脈上模様の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Koppe Royalty B.V.

Putterbrink 1, 3881LK Putten, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Lubbertus H. Koppe

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19768号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia L. AFRICAN JUNGLE

3 登録品種の特性の概要

草型は横走根茎型、草丈は低、葉の型は単葉、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉身の厚さは中、葉身の形(単葉の品種に限る。)は卵形、葉身における葉柄の着生位置(単葉の品種に限る。)は葉縁、葉身の基部の形(葉柄が葉縁に着生する品種に限る。)は僅かに重なる、葉身の先端部の形は鋭尖形、葉身の切れ込みの深さ(単葉の品種に限る。)はかなり浅、葉身の周縁の形は鋸歯状、葉身の周縁の鋸歯の深さは中、葉身の周縁の波打ちの強弱(単葉の品種に限る。)は弱、葉身の表面の色数は5色以上、葉身の表面の主な色は143A、葉身の表面の二次色はN77A、葉身の表面の二次色の分布は周縁部及び中央部、葉身の表面の模様の有無は有、葉身の表面の主な模様の型は斑点、葉身の表面の主な模様の分布は中間部、葉身の表面の主な模様の色は69D、葉身の表面の二次の模様の型は斑点、葉身の表面の二次の模様の分布は中央部、葉身の表面の二次の模様の色は63B、葉身の表面の脈上模様の有無は無、葉身の表面の葉底の色は赤、葉身の表面の毛の粗密は無又は極粗、葉身の表面の突起の粗密は無又は極粗、葉身の凹凸の強弱は弱、葉身の裏面の主な色は灰緑、葉身の裏面の二次色は赤紫、葉身の裏面の主脈の色は赤紫、葉柄の長さはやや長、葉柄の太さは中、葉柄の模様の有無は無、葉柄の毛の有無は無、花房の向きは横向き、花柄の長さは長、雄花の花弁の数は4、雄花の直径はやや大、雄花の表面の色数は2色以上、雄花の外花弁の形は卵形、雄花の外花弁の表面の先端部の色は62A、雄花の外花弁の表面の基部の色は69C、雄花の内花弁の表面の先端部の色(2弁花を除く。)は69C、雄花の内花弁の表面の基部の色(2弁花を除く。)は69C、やくの色(八重品種を除く。)は黄、子房の長さはやや長、子房の幅はやや狭、子房の中央部の色は淡緑、子房の翼の色は赤紫である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「AFRICAN JUNGLE」は、対照品種「Dark jungleleaf」と比較して、葉身の表面の二次色がN77Aであること、葉身の表面の主な模様の分布が中間部であること、葉身の表面の二次の模様の型が斑点であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Koppe Royalty B.V.

Putterbrink 1, 3881LK Putten, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Lubbertus H. Koppe

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19769号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Boronia Sm. MOMMO

3 登録品種の特性の概要

樹姿は立性、樹高は高、枝の太さは中、枝の色は緑、分枝数は中、節間長は長、単葉、複葉の別は複葉、葉の形は線形、葉身長(Ⅱ)は長、葉身幅(Ⅱ)は広、葉の表面の色は緑、葉の斑の有無は無、葉軸基部の長さは長、葉の香りは強、花房形成の有無は花房を形成、花の向きは上、花形は盃形、花径は大、花の高さは小、花弁内部の地色は75C、花弁外部の単色、複色の別は単色、花弁外部の地色は77C、花弁の形は卵形、花弁数は少、がく筒の色は黄緑、花柄の長さは長、一花房の花数は中、花の香りは中、開花の早晚性は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「MOMMO」は、対照品種*B. pinnata*と比較して、枝の色が緑であること、がく筒の色が黄緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

田口将士
愛知県田原市小塩津町字山井戸27番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

田口将士

7 出願公表の年月日 平成20年12月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第19770号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Boronia Sm. ももひめ

3 登録品種の特性の概要

樹姿は立性、樹高は高、枝の太さは中、枝の色は淡緑、分枝数はやや多、節間長は中、単葉、複葉の別は複葉、葉の形は線形、葉身長(Ⅱ)はやや長、葉身幅(Ⅱ)は中、葉の表面の色は緑、葉の斑の有無は無、葉軸基部の長さは長、葉の香りは強、花房形成の有無は花房を形成、花の向きは上、花形は盃形、花径はやや大、花の高さは小、花弁内部の単色、複色の別は単色、花弁内部の地色は75A、花弁外部の単色、複色の別は単色、花弁外部の地色はN80B、花弁の形は卵形、花弁数は少、がく筒の色は緑、花柄の長さは短、一花房の花数は中、花の香りは強、開花の早晚性は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ももひめ」は、対照品種*B. pinnata* (小輪)と比較して、小葉の枚数が5～7枚であること、花柄の長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「ホワイトラブ」と比較して、小葉の枚数が5～7枚であること、葉の斑の有無が無であること、花柄の長さが短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

井上堅太
新潟県胎内市富岡1296-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

井上堅太

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19771号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Crowea Sm. ファイリーナ

3 登録品種の特性の概要

樹姿は中間、樹高は低、節間長は中、茎の太さはやや細、茎の色は淡緑、葉形は線形、葉の先端の形は鋭先形、葉の基部の形は鋭形、葉縁の形は全縁、葉身長は中、葉身の幅は狭、葉の厚さは薄、葉の表面の色は146A, 4D（覆輪）、花の大きさはやや小、花弁の形は卵形、花弁先端の形は鈍形、花弁数は5枚、花弁の長さはやや長、花弁の幅はやや狭、花弁の厚さはかなり薄、花弁表面の地色はN74A、花弁表面の複色の有無は無、花弁表面の退色の程度は中、花心の高さは低、花心の太さは細、雄ずいの色：花糸付属物の色は20D、花糸上部の色は77A、花糸下部の色は77D、花柱の毛の有無は有、がくの毛の有無は無、がくの色は淡緑、がく先端のアントシアニン着色の有無は有、花硬の長さはやや短、花硬の太さは中、花硬の色は淡緑、葉の香りは有、花の香りは有、開花習性は二季咲き、開花の早晩は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ファイリーナ」は、対照品種「サザンクロス」と比較して、葉の先端の形が鋭先形であること、葉の表面の色が146A, 4D（覆輪）であること等で区別性が認められる。対照品種「サザンクロス白」と比較して、葉の表面の色が146A, 4D（覆輪）であること、花弁表面の地色がN74Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

井上堅太
新潟県胎内市富岡1296-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

井上堅太

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第19772号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Epidendrum L. 東風桃 (コチモチ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立性、株の大きさは中、ぎ球茎の有無は無、茎の太さはやや太、葉の展開状態は斜上、葉の全体の形は披針形、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉枚数は多、成葉表面の色は緑、葉の模様の有無は無、斑の有無は無、花序のタイプは総状花序、花序の長さは短、花序の幅は中、花の着生方向は斜上向き、花の向きは上向き、花型は平開咲、花の縦径は中、花の横径は中、ドーサルセパルの全体の形は長楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鋭形、ドーサルセパルのねじれは無、ドーサルセパルの縦断面の形は平型、ドーサルセパルの横断面の形は平型、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は中、ラテラルセパルの全体の形は長楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鋭形、ラテラルセパルのねじれは無、ラテラルセパルの縦断面の形は平型、ラテラルセパルの横断面の形は平型、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は中、ペタルの全体の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルのねじれは無、ペタルの縦断面の形は平型、ペタルの横断面の形は平型、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、リップの全体の形は中央裂片二裂型、リップの周縁の波打ちは少、リップの周縁の切れ込みの深さはやや浅、リップの縦断面の形は平型、リップの横断面の形は弱外反型、リップの長さは中、リップの幅は中、ドーサルセパルの色はN74A、ドーサルセパルの模様の有無は無、ラテラルセパルの色はN74A、ラテラルセパルの模様の有無は無、ペタルの色はN74A、ペタルの模様の有無は無、リップの色はN74B、リップの基部の色は155C、リップの模様の有無は無、リップの裏面の色はN74C、リップとずい柱の合着は合着、小花柄の色は緑、褐、花茎の着生位置は頂生、花茎の向きは直立、花数は多、開花期は冬咲である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「東風桃」は、対照品種「コスモドリームカラー あすかーな」と比較して、ペタルの横断面の形が平型であること、小花柄の色が緑、褐であること等で区別性が認められる。対照品種「ナラティールバゲンジ光源氏」と比較して、リップの基部の色が155Cであること、小花柄の色が緑、褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

徳平英亀
高知県土佐市中島414番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

徳平英亀

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19773号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gazania Gaertn. 鴻巣1号 (コウノシリコウ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや低、株の幅は中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉身の形は披針形及び深裂形、葉の表面の色は緑、頭花の直径は極大、舌状花の数は多、舌状花の長さは極長、舌状花の幅は極広、舌状花の形は倒披針形、舌状花の表面の主な色はN25B、舌状花の基部の色は175A(上部)、200A(下部)、花盤の直径は極大、花盤の色は橙、花柄の長さはかなり短、花柄の太さは太である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「鴻巣1号」は、対照品種「デイブレイク オレンジ」と比較して、頭花の直径が極大であること、舌状花の長さが極長であること等で区別性が認められる。対照品種「デイブレイク イエロー」と比較して、舌状花の表面の主な色がN25Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

石河正義
埼玉県鴻巣市川面115

6 登録品種の育成をした者の氏名

石河正義

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第19774号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gazania Gaertn. 鴻巣2号 (コウノス2ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は中、株の幅は中、葉の長さはやや短、葉の幅は広、葉身の形は披針形及び深裂形、葉の表面の色は緑、頭花の直径はかなり大、舌状花の数は多、舌状花の長さは極長、舌状花の幅は極広、舌状花の形は倒披針形、舌状花の表面の主な色は155A、舌状花の表面の二次色は17B、舌状花の基部の色はN25C、花盤の直径は極大、花盤の色は橙、花柄の長さは短、花柄の太さは太である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「鴻巣2号」は、対照品種「デイブレイク オレンジクリーム」と比較して、頭花の直径がかなり大であること、舌状花の基部の色がN25Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ガズー クリアバニラ」と比較して、舌状花の基部の色がN25Cであること、花盤の色が橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

石河正義
埼玉県鴻巣市川面115

6 登録品種の育成をした者の氏名

石河正義

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第19775号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gazania Gaertn. CAN みかん

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は中、株の幅はやや狭、茎の太さ（ロゼット型の品種の品種を除く。）は中、茎の毛の粗密（ロゼット型の品種を除く。）は粗、葉の長さはやや短、葉の幅はかなり狭、葉身の形は披針形、葉の表面の色は緑、頭花の直径はやや小、舌状花の数は中、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや広、舌状花の形は倒披針形、舌状花の表面の主な色はN25C、舌状花の基部の色は10D、花盤の直径はやや小、花盤の色は橙、花柄の長さはやや長、花柄の太さはやや細である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「CAN みかん」は、対照品種「ガズー クリアオレンジ」と比較して、舌状花の表面の主な色がN25Cであること、舌状花の基部の色が10Dであること等で区別性が認められる。対照品種「在来系（黄）」と比較して、舌状花の表面の主な色がN25Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

須永健司
埼玉県鴻巣市加美2-7-60

6 登録品種の育成をした者の氏名

須永健司

7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第19776号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gossypium hirsutum L. ハダス

3 登録品種の特性の概要

草姿は球形、最下結果枝の着生位置は中、茎の色は濃緑、葉身の大きさは大、葉の形は掌状形、葉の裏面の毛の粗密はやや粗、葉身の蜜腺の有無は有、柱頭のやくに対する位置は同等、花の着き方は密、花卉の色はクリーム、花卉のスポットの強弱は無又は極弱、さく果の開じょの強弱は弱、さく果の大きさは中、さく果の縦断面の形は円形、さく果の表面のくぼみの細かさはやや細かい、さく果の先端の突出の強弱はやや弱、100粒重は中、種子の地毛の色は褐、種子の地毛の有無は有、繰綿の実綿に対する重さの割合(%)は極低、繊維の色は白以外、さく果の開じょ期は晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ハダス」は、対照品種「ヌリート」と比較して、結果枝の節間長が中であること、種子の地毛の色が褐であること、繊維の色が白以外であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ガド サリ

イスラエル国 20600 ヨクネアム モシャバ

レブ アミ バジヤン

イスラエル国 20600 ヨクネアム モシャバ

6 登録品種の育成をした者の氏名

ガド サリ

7 出願公表の年月日 平成19年2月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第19777号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gypsophila L. ギブソクィーン

3 登録品種の特性の概要

草型は立性、草丈はやや低、最長茎長はやや短、茎の太さは中、茎の色は緑、茎のアントシアニンの有無及び程度は淡、分枝の多少は多、分枝の長さはやや短、分枝の角度は中、節間長はやや短、葉形は披針形、葉長はかなり短、葉幅はやや狭、葉の表面の色は濃緑、葉のアントシアニンの有無は無、花の着生密度は密、花弁の重ねは八重咲き、花の大きさはやや小、花色の単色、複色の別は単色、単色もしくは複色の地色はNN155D、花弁の形はへら形、花弁先端の形は凹形、花弁数はやや多、がくの形は杯状、がくの大きさは中、がくの色は緑、雌雄ずいの長さは中、一花茎当たりの花数は中、花の香りは中、早晩性は晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ギブソクィーン」は、対照品種「ダンギップホワイファ」と比較して、葉長がかなり短であること、花弁数がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種「ホワイトフェアリー」と比較して、葉長がかなり短であること、花弁数がやや多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン
イスラエル国 ベニーツイオン 60910

6 登録品種の育成をした者の氏名

ブライヤー ハイム イラン

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第19778号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gypsophila L. ESM CHISPA

3 登録品種の特性の概要

草型は開張、草丈はかなり低、最長茎長は極短、茎の太さはやや細、茎の色は緑、茎のアントシアニンの有無及び程度は中、分枝の多少は多、分枝の長さはかなり短、分枝の角度はやや鈍、節間長は極短、葉形は披針形、葉長は極短、葉幅は極狭、葉の表面の色は濃緑、葉のアントシアニンの有無は無、花の着生密度はかなり密、花卉の重ねは半八重咲き、花の大きさは小、花色の単色、複色の別は単色、単色もしくは複色の地色はNN155D、花卉の形はへら形、花卉先端の形は凹形、花卉数はやや少、がくの形は杯状、がくの大きさは中、がくの色は緑、雌雄ずいの長さは長、一花茎当たりの花数は中、花の香りは中、早晩性はやや晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ESM CHISPA」は、対照品種「ダンフェスター」と比較して、草型が開張であること、花卉数がやや少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Esmeralda Breeding B.V.

Noordpolderweg 17, 1432JH Aalsmeer, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Aloysius A. J. Hooijman

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第19779号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gypsophila L. Tosto

3 登録品種の特性の概要

草型は立性、草丈はやや低、最長茎長はやや短、茎の太さは中、茎の色は淡緑、茎のアントシアニンの有無及び程度は淡、分枝の多少は中、分枝の長さはやや短、分枝の角度はやや鋭、節間長は中、葉形は披針形、葉長はやや短、葉幅はやや広、葉の表面の色は緑、葉のアントシアニンの有無は無、花の着生密度は中、花弁の重ねは八重咲き、花の大きさはやや小、花色の単色、複色の別は単色、単色もしくは複色の地色はNN155D、花弁の形はへら形、花弁先端の形は凹形、花弁数はやや多、がくの形は杯状、がくの大きさは中、がくの色は緑、雌雄ずいの長さは中、一花茎当たりの花数は少、花の香りは中、早晩性は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Tosto」は、対照品種「ダンギップファーム」と比較して、花弁数がやや多であること、早晩性が中であること等で区別性が認められる。対照品種「アルタイル」と比較して、節数が中であること、花の着生密度が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Biological Industries Beit Haemek
Kibbutz Beit Haemek 25115, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jaime Fiselzon

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第19780号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gypsophila L. Dangyp3114

3 登録品種の特性の概要

草型は立性、草丈はやや低、最長茎長はやや短、茎の太さはやや細、茎の色は淡緑、茎のアントシアニンの有無及び程度は無、分枝の多少はやや多、分枝の長さはやや短、分枝の角度はやや鋭、節間長は短、葉形は披針形、葉長は短、葉幅は狭、葉の表面の色は緑、葉のアントシアニンの有無は無、花の着生密度は密、花弁の重ねは八重咲き、花の大きさはやや大、花色の単色、複色の別は単色、単色もしくは複色の地色はNN155D、花弁の形はへら形、花弁先端の形は切形、花弁数は多、がくの形は杯状、がくの大きさは中、がくの色は緑、雌雄ずいの長さは短、一花茎当たりの花数は少、花の香りは中、早晚性は極晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Dangyp3114」は、対照品種「MYポラ」と比較して、花の大きさがやや大であること、花弁数が多であること等で区別性が認められる。対照品種「ニューフェイス」と比較して、分枝の発生位置が主に上部であること、花の大きさがやや大であること、花弁数が多であること等で区別性が認められる。対照品種「ESMAMERICA」と比較して、分枝の発生位置が主に上部であること、花の大きさがやや大であること、花弁数が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger-Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva 50297 Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gabriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19781号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gypsophila L. Dangyp3253

3 登録品種の特性の概要

草型は立性、草丈は中、最長茎長はやや短、茎の太さは中、茎の色は淡緑、茎のアントシアニンの有無及び程度は淡、分枝の多少は中、分枝の長さはやや短、分枝の角度はやや鋭、節間長はやや短、葉形は披針形、葉長は短、葉幅はやや狭、葉の表面の色は緑、葉のアントシアニンの有無は無、花の着生密度は密、花弁の重ねは八重咲き、花の大きさは中、花色の単色、複色の別は単色、単色もしくは複色の地色はNN155D、花弁の形はへら形、花弁先端の形は切形、花弁数はかなり多、がくの形は杯状、がくの大きさは中、がくの色は緑、雌雄ずいの長さは短、一花茎当たりの花数は少、花の香りは中、早晩性はやや晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Dangyp3253」は、対照品種「フジミピースグ」と比較して、花の大きさが中であること、花弁数がかなり多であること等で区別性が認められる。対照品種「ホワイトフェアリー」と比較して、花弁先端の形が切形であること、花弁数がかなり多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger-Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva 50297 Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gabriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19782号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gypsophila L. Dangyp3526

3 登録品種の特性の概要

草型は中間、草丈は低、最長茎長は短、茎の太さはやや細、茎の色は緑、茎のアントシアニンの有無及び程度は中、分枝の多少はやや多、分枝の長さはやや短、分枝の角度はやや鈍、節間長はやや短、葉形は披針形、葉長はかなり短、葉幅はかなり狭、葉の表面の色は緑、葉のアントシアニンの有無は無、花の着生密度は中、花弁の重ねは八重咲き、花の大きさはやや大、花色の単色、複色の別は単色、単色もしくは複色の地色はNN155D、花弁の形はへら形、花弁先端の形は凹形、花弁数は中、がくの形は杯状、がくの大きさは大、がくの色は緑、雌雄ずいの長さは中、一花茎当たりの花数は少、花の香りは中、早晩性は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Dangyp3526」は、対照品種「パーフェクタ」と比較して、葉長がかなり短であること、花の大きさがやや大であること等で区別性が認められる。対照品種「ニューホープ」と比較して、葉長がかなり短であること、花の着生密度が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger-Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva 50297 Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gabriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19783号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gypsophila L. Dangyp3834

3 登録品種の特性の概要

草型は中間、草丈はやや低、最長茎長はやや短、茎の太さは中、茎の色は淡緑、茎のアントシアニンの有無及び程度は無、分枝の多少はやや多、分枝の長さはやや短、分枝の角度は中、節間長はやや短、葉形は披針形、葉長はかなり短、葉幅はやや狭、葉の表面の色は緑、葉のアントシアニンの有無は無、花の着生密度は密、花弁の重ねは八重咲き、花の大きさはやや小、花色の単色、複色の別は単色、単色もしくは複色の地色はNN155D、花弁の形はへら形、花弁先端の形は凹形、花弁数は中、がくの形は杯状、がくの大きさは中、がくの色は緑、雌雄ずいの長さは短、一花茎当たりの花数はやや少、花の香りは中、早晚性はやや晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Dangyp3834」は、対照品種「ダンギップクリス」と比較して、葉長がかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「アルタイル」と比較して、葉幅がやや狭であること、花弁先端の形が凹形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger-Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva 50297 Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gabriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19784号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gypsophila L. Dangyp3836

3 登録品種の特性の概要

草型は中間、草丈はやや低、最長茎長はやや短、茎の太さは中、茎の色は淡緑、茎のアントシアニンの有無及び程度は淡、分枝の多少は多、分枝の長さは中、分枝の角度は中、節間長はやや短、葉形は披針形、葉長は短、葉幅はやや狭、葉の表面の色は緑、葉のアントシアニンの有無は無、花の着生密度は密、花弁の重ねは八重咲き、花の大きさは中、花色の単色、複色の別は単色、単色もしくは複色の地色はNN155D、花弁の形はへら形、花弁先端の形は凹形、花弁数はかなり多、がくの形は杯状、がくの大きさは中、がくの色は緑、雌雄ずいの長さは短、一花茎当たりの花数はやや少、花の香りは中、早晚性は晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Dangyp3836」は、対照品種「Dangyp3834」と比較して、花の大きさが中であること、花弁数がかなり多であること等で区別性が認められる。対照品種「ダンギップクリス」と比較して、花の大きさが中であること、花弁数がかなり多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger-Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva 50297 Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gabriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19785号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus L. なつ姫 (ナツメ)

3 登録品種の特性の概要

樹皮の亀裂の形は線状、樹皮の色は灰、枝の粗密は密、葉全体の形は心形、葉先端の形は突形、葉基部の形は円形、葉縁の形は欠刻、葉身の長さは中、葉身の幅は中、新葉表面の色は144A、成葉表面の色は137B、斑の有無は無、新葉表面の光沢は中、成葉表面の光沢は中、新葉表面の毛は無、成葉表面の毛は無、葉脈の形は掌状型、葉柄の太さは中、葉柄の長さは長、葉柄の色は淡緑、托葉の形は線状披針形、托葉の長さは中、花冠の向きは横向き、花冠の開き方はロート型、花冠の型は一重咲き、花弁の重なりはすこし重なる、花冠の長径は極小、つぼみの色は46A、単色・複色の別は二色、複色のタイプはバンド、花弁のバンド1の色は46A、花弁のバンド2の色は46D、花弁の脈の明瞭さは不明瞭、花弁のバンド1の幅は狭、花弁のバンド2の幅は中、花弁全体の形は靴へら型、花弁のねじれは無、花弁の長さは短、花弁の幅は狭、花弁の数は少、花弁の光沢は無、ずい柱の弁化の有無は無、ずい柱の曲りは無、ずい柱の太さは細、ずい柱の長さは短、ずい柱の色タイプは二色、ずい柱基部の色は42A、ずい柱先端の色は39D、ずい柱先端裂片の数は5裂、花柱枝の色はピンク、花柱枝の毛は有(赤)、柱頭の色は赤、花糸の長さは短、花糸の色はその他(淡桃)、やくの色は黄、花柄上部の太さは細、花柄上部の長さは中、花柄上部の色は146A、花柄下部の太さは細、花柄下部の長さは中、花柄下部の色は146A、副がくの形は狭披針形、副がくの開放の方向はやや接着、副がくの色は緑、がく筒の形は筒形、がく筒の長さは中、がく筒の色は黄緑、がく裂片の形態は鋭形、がく裂片の切れ込みは浅裂、がく裂片の毛は無、花の香りは無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「なつ姫」は、対照品種Hibiscus L.と比較して、花弁のバンド2の色が46Dであること、ずい柱先端の色が39Dであること、柱頭の色が赤であること等で区別性が認められる。対照品種「ブリリアント」と比較して、異葉性が有であること、花冠の長径が極小であること、花弁全体の形が靴へら型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社岸本農園
徳島県徳島市丈六町丈領15番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸本昇

7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第19786号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Mecardonia Ruiz et Pav. ウスメカ67

3 登録品種の特性の概要

草姿は下垂、茎の長さは短、茎の色は淡緑、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は広楕円形、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の周縁部の形は鋸歯状、花柄の長さは中、花の長さは中、花の幅は中、がくの形は広卵形、がくの色は緑、上唇弁の長さは中、上唇弁の幅は中、上唇弁の形はV型、上唇弁の先端の形は歯形（波状）、上唇弁の主な色は13A、上唇弁の二次色の有無は有、上唇弁の二次色の型は条斑、上唇弁の二次色は赤紫、下唇弁の中央裂片の長さは長、下唇弁の中央裂片の幅は中、下唇弁の中央裂片の形はV型、下唇弁の先端の形は凹形、下唇弁の主な色は12A、下唇弁の二次色の有無は有、下唇弁の二次色の型は条斑、下唇弁の二次色は赤紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ウスメカ67」は、対照品種「M. dianthera」と比較して、葉の長さが中であること、葉の形が広楕円形であること等で区別性が認められる。対照品種「M. grandiflora」と比較して、葉の長さが中であること、葉の形が広楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

プラント 21 LLC
アメリカ合衆国 カリフォルニア 92003 ボンソール アクダクトロード 32149

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂寄潮

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第19787号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. SUNOST0802

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、主茎の長さはやや長、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の周縁の切れ込みの深さは深、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、開花初期の頭花の舌状花表面の主な色は42B、副花冠の有無は無、頭花の直径はやや小、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の先端の形は鈍形、舌状花の形（内巻きのない品種に限る。）は長楕円形、舌状花の基部の向きは水平、舌状花の下部の色は42A, 71A、舌状花の表面の色数は単色、舌状花の表面の主な色は42A、舌状花の表面の色の分布（単色の品種に限る。）は先端に向かって淡くなる、舌状花の裏面中央部の色の区分は紫～褐紫、花盤の色は紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SUNOST0802」は、対照品種「サニーシエラ」と比較して、舌状花の表面の主な色が42Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Sunny Gronnegyden Aps
Gronnegyden 148, 5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Bjarne Nyholm Larsen

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第19788号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Osteospermum L. グランドチャイルドシンフォニー

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、主茎の長さはやや短、葉の長さは長、葉の幅は広、葉の周縁の切れ込みの深さは中、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡は中、開花初期の頭花の舌状花表面の主な色は21A、副花冠の有無は無、頭花の直径はやや小、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の先端の形は鋭形、舌状花の形（内巻きのない品種に限る。）は長楕円形、舌状花の基部の向きは斜上、舌状花の下部の色は17B, 99B、舌状花の表面の色数は単色、舌状花の表面の主な色は17B、舌状花の表面の色の分布（単色の品種に限る。）は均一、舌状花の裏面中央部の色の区分は黄～暗黄、花盤の色は暗灰緑である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「グランドチャイルドシンフォニー」は、対照品種「マザーシンフォニー」と比較して、舌状花の先端の形が鋭形であること、舌状花の表面の主な色が17Bであること等で区別性が認められる。対照品種「マイキー」と比較して、舌状花の数が中であること、舌状花の表面の主な色が17Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社はなせきぐち
群馬県前橋市北代田町497番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
関口政行

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第19789号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. DUETIBROCHA

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、主茎の長さは中、葉の長さは長、葉の幅は中、葉の周縁の切れ込みの深さは中、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡は中、開花初期の頭花の舌状花表面の主な色は26C、副花冠の有無は無、頭花の直径は小、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の先端の形は鈍形、舌状花の形（内巻きのない品種に限る。）は倒披針形、舌状花の基部の向きは斜上、舌状花の下部の色は37D, 11D、舌状花の表面の色数は単色、舌状花の表面の主な色は37D、舌状花の表面の色の分布（単色の品種に限る。）は基部に向かって淡くなる、舌状花の裏面中央部の色の区分2は黄褐、花盤の色は青紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DUETIBROCHA」は、対照品種「ラナバリア」と比較して、舌状花の表面の主な色が37Dであること、花盤の色が青紫であること等で区別性が認められる。対照品種「アクテルラ」と比較して、舌状花の数が中であること、舌状花の長さ／幅がやや小であること、舌状花の表面の主な色が37Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Tobias Dummen
Am Steg 14, Rheinberg 47495 Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tobias Dummen

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第19790号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. DUETIBUBERRY

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、主茎の長さは中、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の周縁の切れ込みの深さは無又は極浅、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡は中、開花初期の頭花の舌状花表面の主な色は63A、副花冠の有無は無、頭花の直径は小、舌状花の長さは短、舌状花の幅は中、舌状花の先端の形は鈍形、舌状花の形（内巻きのない品種に限る。）は長楕円形、舌状花の基部の向きは斜上、舌状花の下部の色は63A, N78A、舌状花の表面の色数は単色、舌状花の表面の主な色は63A、舌状花の表面の色の分布（単色の品種に限る。）は均一、舌状花の裏面中央部の色の区分2は褐～暗褐、花盤の色は青紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DUETIBUBERRY」は、対照品種「在来紫」と比較して、舌状花の表面の主な色が63Aであること等で区別性が認められる。対照品種「サニーエリザベス」と比較して、舌状花の表面の主な色が63Aであること等で区別性が認められる。対照品種「はるなシンフォニー」と比較して、頭花の直径が小であること、舌状花の表面の主な色が63Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Tobias Dummen
Am Steg 14, Rheinberg 47495 Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tobias Dummen

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第19791号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. DUETICABERRY

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、主茎の長さはやや短、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の周縁の切れ込みの深さは浅、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡は中、開花初期の頭花の舌状花表面の主な色は26D, 72B(下部)、副花冠の有無は無、頭花の直径は小、舌状花の長さは短、舌状花の幅は中、舌状花の先端の形は鈍形、舌状花の形(内巻きのない品種に限る。)は倒披針形、舌状花の基部の向きは斜上、舌状花の下部の色は71A、舌状花の表面の色数は2色、舌状花の表面の主な色は49A, 71A(ストライプ)、舌状花の表面の二次色(2色以上の品種に限る。)は71A、舌状花の表面の二次色の分布(2色以上の品種に限る。)は下部、舌状花の裏面中央部の色の区分2は褐~暗褐、花盤の色は紫である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「DUETICABERRY」は、対照品種「サニーセレナ」と比較して、開花初期の頭花の舌状花表面の主な色が26D, 72B(下部)であること、舌状花の表面の主な色が49A, 71A(ストライプ)であること等で区別性が認められる。対照品種「DUETIBUBERRY」と比較して、開花初期の頭花の舌状花表面の主な色が26D, 72B(下部)であること、舌状花の表面の主な色が49A, 71A(ストライプ)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Tobias Dummen
Am Steg 14, Rheinberg 47495 Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tobias Dummen

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第19792号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. DUETIMDEPUR

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、主茎の長さはやや短、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の周縁の切れ込みの深さは浅、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡は中、開花初期の頭花の舌状花表面の主な色はN80A、副花冠の有無は無、頭花の直径はやや小、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の先端の形は鈍形、舌状花の形（内巻きのない品種に限る。）は倒披針形、舌状花の基部の向きは水平、舌状花の下部の色はN78A, N186B、舌状花の表面の色数は単色、舌状花の表面の主な色はN78A、舌状花の表面の色の分布（単色の品種に限る。）は均一、舌状花の裏面中央部の色の区分は青紫～褐青紫、花盤の色は紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DUETIMDEPUR」は、対照品種「デネボラ」と比較して、開花初期の頭花の舌状花表面の主な色がN80Aであること、舌状花の表面の主な色がN78Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Tobias Dummen
Am Steg 14, Rheinberg 47495 Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tobias Dummen

7 出願公表の年月日 平成21年4月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第19793号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. DUETISUNSET

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、主茎の長さは中、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の周縁の切れ込みの深さは深、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡は中、開花初期の頭花の舌状花表面の主な色は12A、副花冠の有無は無、頭花の直径は小、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の先端の形は鈍形、舌状花の形（内巻きのない品種に限る。）は長楕円形、舌状花の基部の向きは斜上、舌状花の下部の色は17D, 77A、舌状花の表面の色数は単色、舌状花の表面の主な色は17D、舌状花の表面の色の分布（単色の品種に限る。）は基部に向かって淡くなる、舌状花の裏面中央部の色の区分2は橙に褐の条、花盤の色2は褐である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DUETISUNSET」は、対照品種「グランドチャイルドシンフォニー」と比較して、舌状花の先端の形が鈍形であること、舌状花の下部の色が17D, 77Aであること、舌状花の表面の主な色が17Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Tobias Dummen
Am Steg 14, Rheinberg 47495 Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tobias Dummen

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第19794号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. DUETIYELLOW

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、主茎の長さは中、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の周縁の切れ込みの深さはかなり浅、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡は中、開花初期の頭花の舌状花表面の主な色は9A、副花冠の有無は無、頭花の直径は小、舌状花の長さは短、舌状花の幅は中、舌状花の先端の形は鈍形、舌状花の形（内巻きのない品種に限る。）は倒披針形、舌状花の基部の向きは水平、舌状花の下部の色は12B, 6D、舌状花の表面の色数は単色、舌状花の表面の主な色は12B、舌状花の表面の色の分布（単色の品種に限る。）は基部に向かって淡くなる、舌状花の裏面中央部の色の区分2は黄に褐の条、花盤の色は明灰である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DUETIYELLOW」は、対照品種「マイキー」と比較して、舌状花の数が中であること、花盤の色が明灰であること等で区別性が認められる。対照品種「在来黄」と比較して、葉の周縁の切れ込みの深さがかなり浅であること、舌状花の長さ／幅がやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Tobias Dummen
Am Steg 14, Rheinberg 47495 Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tobias Dummen

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第19795号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Scoparia L. サンチュチュキ

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、草丈は中、茎の長さは中、茎の緑色の濃淡は中、茎のアントシアニン着色の有無は無、茎の毛の有無は無、茎の分枝の粗密は中、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形はVI型、葉の緑色の濃淡は中、葉の毛の有無は無、葉の香りの有無は有、花型は一重、花の直径は中、花冠裂片の形は菱形、花冠裂片の表面の主な色は7A、花冠裂片の表面の二次色の有無は無、花冠裂片の表面の主な色に対する毛の色は花色と同程度、花冠裂片の表面の主な色に対する花糸の色は花色より淡である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「サンチュチュキ」は、対照品種「S. montevidensis 野生種(1)」と比較して、茎の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「S. montevidensis 野生種(2)」と比較して、葉の幅が狭であること、葉の形がVI型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都千代田区平河町二丁目13番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

村上保之

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第19796号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Scoparia L. ウススコ10

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、草丈は中、茎の長さはやや短、茎の緑色の濃淡は中、茎のアントシアニン着色の有無は無、茎の毛の有無は無、茎の分枝の粗密は中、葉の長さはやや長、葉の幅はかなり狭、葉の形はI型、葉の緑色の濃淡は中、葉の毛の有無は無、葉の香りの有無は有、花型は一重、花の直径はやや大、花冠裂片の形は倒卵形、花冠裂片の表面の主な色は94C、花冠裂片の表面の二次色の有無は無、花冠裂片の表面の主な色に対する毛の色は花色と同程度、花冠裂片の表面の主な色に対する花糸の色は花色より濃である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ウススコ10」は、対照品種「サンチュチュキ」と比較して、葉の形がI型であること、花冠裂片の表面の色が94Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

プラント 21 LLC

アメリカ合衆国 カリフォルニア 92003 ボンソール アクダクトロード 32149

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂寄潮

7 出願公表の年月日 平成18年2月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第19797号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Scoparia L. USSC0401-3

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、草丈は中、茎の長さは中、茎の緑色の濃淡は中、茎のアントシアニン着色の有無は無、茎の毛の有無は無、茎の分枝の粗密は密、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の形はⅦ型、葉の緑色の濃淡は中、葉の毛の有無は無、葉の香りの有無は有、花型は一重、花の直径は中、花冠裂片の形は倒卵形、花冠裂片の表面の主な色は7A、花冠裂片の表面の二次色の有無は無、花冠裂片の表面の主な色に対する毛の色は花色と同程度、花冠裂片の表面の主な色に対する花糸の色は花色より淡である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「USSC0401-3」は、対照品種「サンチュチュキ」と比較して、葉の形がⅦ型であること、花冠裂片の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant21, L. L. C

32149, Aqueduct road, Bonsall, CA92003, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂寄潮

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第19798号 平成22年9月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vriesea Lindl. Mundo

3 登録品種の特性の概要

草型は中間型、草丈は中、葉形は広線形、葉の先端の形は急鋭頭、葉の断面の形は湾曲、葉身の反りはIV、葉身のねじれは無、葉身の長さは21～30cm、葉身の幅は3.1～5.0cm、成葉の表面先端部の色はN137A、成葉の表面中間部の色はN137A、成葉の裏面先端部の色は137B、成葉の裏面中間部の色は137B、斑の有無は無、吸収鱗片の模様は模様なし、苞状葉の色はN77A、花序の型は扁平・単穂、花序の長さは11～15cm、花序の幅は4.1～5.0cm、花穂の長さは11～15cm、花穂の幅は3.1～5.0cm、花穂の中央部の色はN79A、花穂の周縁部の色はN79A、1花序の小花数は11～20個、花糸の抽出は抽出する、花柱の抽出は抽出する、花茎の抽出角度は直上である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Mundo」は、対照品種「Nora」と比較して、花序の型が扁平・単穂であること、花茎の長さが31～40cmであること等で区別性が認められる。対照品種「Solo」と比較して、花穂の中央部の色がN79Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Corn. Bak B.V.

Dorpsstraat 11 B, 1566AA Assendelft, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Elly Bak Nicolaas David Maria Steur

7 出願公表の年月日 平成21年8月18日