

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 8 5 1 号 平成 2 2 年 9 月 2 2 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. TB524

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、株の直径はかなり小、着色葉部が株の直径に占める割合はやや小、株の中央部の色はN79C、外葉の形は倒卵、外葉の葉縁の波打ちの程度は微、外葉の葉縁の波打ちの粗密は粗、外葉の中ろく断面の形は半円、外葉の葉柄長は無、外葉の色は濃緑、着色葉の形は倒卵、着色葉の葉縁の波打ちの程度は低、着色葉の葉縁の波打ちの粗密は粗、着色葉の葉縁の切れ込みの深さの程度はかなり浅、着色葉の葉縁の切れ込みの粗密は粗、着色葉の中ろく断面の形は半円、着色葉の葉柄長は無、着色葉の中心部の主たる色は76A、着色葉外縁の色は76B、葉の色数は3色、着色の時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TB524」は、対照品種「ウィンター チェリー」と比較して、外葉の色が濃緑であること等で区別性が認められる。対照品種「瀬戸の舞姫」と比較して、着色葉の中心部の主たる色が76Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

前田裕行

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 7 月 1 1 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 8 5 2 号 平成 2 2 年 9 月 2 2 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. TB556

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり低、株の直径はやや小、着色葉部が株の直径に占める割合は中、株の中央部の色はN79B、外葉の形は円、外葉の葉縁の波打ちの程度は中、外葉の葉縁の波打ちの粗密は中、外葉の中ろく断面の形は半円、外葉の葉柄長は中、外葉の色は灰緑＋濃紫、着色葉の形は円、着色葉の葉縁の波打ちの程度はやや高、着色葉の葉縁の波打ちの粗密は密、着色葉の葉縁の切れ込みの深さの程度は深、着色葉の葉縁の切れ込みの粗密は密、着色葉の中ろく断面の形は楕円、着色葉の葉柄長は中、着色葉の中心部の主たる色は71A、着色葉外縁の色は71A、葉の色数は3色、着色の時期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TB556」は、対照品種「紅かもめ」と比較して、着色葉の葉縁の切れ込みの深さの程度が深であること等で区別性が認められる。対照品種「紅すずめ」と比較して、外葉の色が灰緑＋濃紫であること、着色葉の葉縁の切れ込みの深さの程度が深であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

前田裕行

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 7 月 1 1 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 8 5 3 号 平成 2 2 年 9 月 2 2 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. TB557

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、株の直径はやや小、着色葉部が株の直径に占める割合はやや小、株の中央部の色はN79A、外葉の形は円、外葉の葉縁の波打ちの程度は中、外葉の葉縁の波打ちの粗密は中、外葉の中ろく断面の形は半円、外葉の葉柄長は中、外葉の色は灰緑＋濃紫、着色葉の形は円、着色葉の葉縁の波打ちの程度は高、着色葉の葉縁の波打ちの粗密は密、着色葉の葉縁の切れ込みの深さの程度は浅、着色葉の葉縁の切れ込みの粗密は中、着色葉の中ろく断面の形は半円、着色葉の葉柄長は中、着色葉の中心部の主たる色は71A、着色葉外縁の色は71A、葉の色数は3色、着色の時期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TB557」は、対照品種「TB556」と比較して、着色葉の葉縁の切れ込みの深さの程度が浅であること等で区別性が認められる。対照品種「紅すずめ」と比較して、外葉の色が灰緑＋濃紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

前田裕行

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 7 月 1 1 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19854号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum indicum L. Branpolar

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり低、草型は叢生、草姿（叢生品種に限る）は半球、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはかなり短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（*Chrysanthemum* × *morifolium*品種を除く）は無又は極弱、葉の裏面の毛の粗密（*Chrysanthemum* × *morifolium*品種を除く）は極弱、葉の裏面の色（*Chrysanthemum* × *morifolium*品種を除く）は147B、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は極多、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性は早生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Branpolar」は、対照品種「メプリブランカ」と比較して、舌状花の縦断面の形状が外反であること、各開花習性における早晩性が早生であること等で区別性が認められる。対照品種「ブランアイボリー」と比較して、頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）がやや少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Hubert Brandkamp

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第19855号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum indicum L. Branset

3 登録品種の特性の概要

草丈は極低、草型は叢生、草姿（叢生品種に限る）は半球、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはかなり短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（*Chrysanthemum* × *morifolium*品種を除く）は無又は極弱、葉の裏面の毛の粗密（*Chrysanthemum* × *morifolium*品種を除く）は極弱、葉の裏面の色（*Chrysanthemum* × *morifolium*品種を除く）は147B、頭花の型は露心する八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は粗、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は5C, N163C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや早生、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Branset」は、対照品種「BR00283」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さが深であること、舌状花の表面の主な色が6Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Hubert Brandkamp

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第19856号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum indicum L. Branroyal Pink

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり低、草型は叢生、草姿（叢生品種に限る）は半球、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さはかなり短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは浅、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（*Chrysanthemum* × *morifolium*品種を除く）は無又は極弱、葉の裏面の毛の粗密（*Chrysanthemum* × *morifolium*品種を除く）は極弱、葉の裏面の色（*Chrysanthemum* × *morifolium*品種を除く）は147B、頭花の型は露心する八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は粗、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は186C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや早生、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Branroyal Pink」は、対照品種「BRANSKY」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さがかなり浅であること、舌状花の表面の主な色が186Cであること等で区別性が認められる。対照品種「メプリロスカ」と比較して、株当たりの頭花の総数（叢生品種に限る）が少であること、舌状花の表面の主な色が186Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Hubert Brandkamp

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第19857号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. YELLOW PANGPANG

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり大、葉の長さは中、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロータ形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「YELLOW PANGPANG」は、対照品種「フォーカス」と比較して、葉の幅が広であること、葉の一次欠刻の深さが深であること等で区別性が認められる。対照品種「セイヒューイト」と比較して、たく葉の大きさがかなり大であること、舌状花の表面の主な色が6Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ゴールドヒーズ」と比較して、たく葉の大きさがかなり大であること、舌状花の表面の主な色が6Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Rural Development Administration
250th Seodun-dong, Gwonseon-gu Suwon-si Gyeonggi-do, Republic of Korea

6 登録品種の育成をした者の氏名

Lim, Jin Hee Choi, Seong Youl Shin, Hak Ki Cho, Hae Ryong Rhee, Hye Kyung Kim, Mi Seon Kim, Young Jin

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19858号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀貴公子 (シュウキコウシ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比はかなり低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2は11週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀貴公子」は、対照品種「イジュン」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さが短であること、葉の表面の光沢の強弱が無又は極弱であること、葉の周縁の二次欠刻の数がやや少であること等で区別性が認められる。対照品種「精やわら」と比較して、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）が中であること、頭花の舌状花の形の数1であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地
山手正則
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一 山手正則

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第19859号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀マリオ (シュマリオ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀マリオ」は、対照品種「秀園」と比較して、たく葉の大きさが中であること、舌状花の表面の主な色が3Aであること等で区別性が認められる。対照品種「フィプリー」と比較して、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）がやや少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地
山手正則
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一 山手正則

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第19860号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ノア

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ノア」は、対照品種「セリアルプス」と比較して、たく葉の大きさが小であること、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）が少であること等で区別性が認められる。対照品種「セイプリンス」と比較して、たく葉の大きさが小であること、葉の一次欠刻の深さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「AVIN」と比較して、たく葉の大きさが小であること、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Chrysanten B.V.
Korte Kruisweg 157, 2676BS Maasdijk The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan Hoek

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第19861号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. アナスタシアダークライム

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は管状、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比はかなり高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は154D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は154C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2は11週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜上である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アナスタシアダークライム」は、対照品種「アナスタシアグリーン」と比較して、舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「セイナイト」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること、舌状花の裏面の色が154Cであること等で区別性が認められる。対照品種「アナスタシアライム」と比較して、舌状花の先端の形が歯状であること、舌状花の表面の主な色が154Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Chrysanten B. V.
Korte Kruisweg 157, 2676BS Maasdijk The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan Hoek

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第19862号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. アドバンジークピンク2

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは極大、葉の長さは長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は69D、舌状花の表面の二次色は61A、舌状花の表面の二次色の分布2は至る所、舌状花の表面の二次色の型は斑点及び条、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アドバンジークピンク2」は、対照品種「セアーティストピンク」と比較して、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）がやや少であること、頭花の高さ（摘らいしていないもの）が高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第19863号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイフォルティシモ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はアネモネ、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は47A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はかなり大、花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）は162A、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）は178C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイフォルティシモ」は、対照品種「セイベルナール」と比較して、葉の一次欠刻の深さが深であること、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）が178Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第19864号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイテデオイエロー

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はアネモネ、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はかなり大、花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）は144B、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）は9A、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイテデオイエロー」は、対照品種「ルーブル」と比較して、葉の幅が中であること、花序の形（叢生でない品種に限る）が深いドーム形であること、舌状花の表面の主な色が6Aであること等で区別性が認められる。対照品種「イエロータイガー」と比較して、草丈が中であること、葉の長さ／幅がやや高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第19865号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ボッパ

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性

（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ

（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ボッパ」は、対照品種「セイカプルス」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がやや凹であること等で区別性が認められる。対照品種「ヨエッジ」と比較して、葉の長さ／幅が低であること、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること、舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）が先端部から1/4であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Cleangro Ltd

Leythorne Nursery Vinnetrow Road Chichester West Sussex PO20 1QD United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

Keith Lintott

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第19866号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ボッパーサニー

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は3B, 173D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ボッパーサニー」は、対照品種「YELLOW PANGPANG」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、舌状花の裏面の色が3B, 173Dであること等で区別性が認められる。対照品種「セイヒューイット」と比較して、葉の幅がやや広であること、舌状花の裏面の色が3B, 173Dであること等で区別性が認められる。対照品種「セイチロ」と比較して、葉の幅がやや広であること、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Cleangro Ltd
Leythorne Nursery Vinnetrow Road Chichester West Sussex PO20 1QD United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

Keith Lintott

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第19867号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. バンプタイムイエロー

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2は縁が接する強い凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2は11週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「バンプタイムイエロー」は、対照品種「デコラレモン」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、頭花の高さ（摘らいしていないもの）が極高であること等で区別性が認められる。対照品種「イントレパイド ゴールド」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2が縁が接する強い凸であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が強い外巻きであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Cleangro Ltd

Leythorne Nursery Vinnetrow Road Chichester West Sussex PO20 1QD United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ruth Parham

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第19868号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 沖の黄寿 (オキノキジュ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはかなり短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は9A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「沖の黄寿」は、対照品種「秋芳」と比較して、たく葉の大きさが中であること、葉の基部の形が凹形であること、舌状花の縦断面の形状が内曲であること等で区別性が認められる。対照品種「星の町」と比較して、たく葉の大きさが中であること、葉の一次欠刻の深さが深であること、花序の形（叢生でない品種に限る）が深いドーム形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県

沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

関塚史朗 照屋寛由 玉木力 儀間直哉 宮城悦子 首藤亜耶乃

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第19869号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 沖の百寿 (オキヒャクジュー)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「沖の百寿」は、対照品種「沖の白波」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、花序の形（叢生でない品種に限る）が深いドーム形であること、舌状花の縦断面の形状が平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県

沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

関塚史朗 照屋寛由 玉木力 儀間直哉 宮城悦子 首藤亜耶乃

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第19870号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 沖の紅寿 (オキナグジュ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は一重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は61B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「沖の紅寿」は、対照品種「エルレジーナ」と比較して、頭花の型が一重であること、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）がかなり少であること等で区別性が認められる。対照品種「舞姫」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数が中であること、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）が中であること、頭花の型が一重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県

沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

関塚史朗 照屋寛由 玉木力 儀間直哉 宮城悦子 首藤亜耶乃

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第19871号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. モーレピンク

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形は数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN74D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「モーレピンク」は、対照品種「セイピノ」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さがやや浅であること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）がややドーム状であること、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）が無であること等で区別性が認められる。対照品種「ペリカン」と比較して、たく葉の大きさが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県

沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

関塚史朗 照屋寛由 玉木力 儀間直哉 宮城悦子 首藤亜耶乃

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第19872号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀寒花月 (シュカンカゲツ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはかなり短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はかなり小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は71A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は有、開花習性は12月～2月咲き（冬）、各開花習性における早晩性は早生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀寒花月」は、対照品種「せとか」と比較して、頭花の舌状花の形の数1であること、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）が有であること等で区別性が認められる。対照品種「花の里」と比較して、舌状花の表面の主な色が71Aであること、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地
山手正則
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一 山手正則

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19873号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. マイコマチ

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は71C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は有、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晩性はかなり晩生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「マイコマチ」は、対照品種「アサマアオイ」と比較して、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）が少であること、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）が有であること等で区別性が認められる。対照品種「アート」と比較して、舌状花の表面の主な色が71Cであること、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）が有であること等で区別性が認められる。対照品種「フィーネミスティーロ」と比較して、葉の基部の形が鈍形であること、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

加藤藤人
長野県佐久市長土呂1354-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

加藤藤人

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19874号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 松風のあかり (ショウワアカリ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は粗、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅はやや広、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は70A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色はN74C、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は早生、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「松風のあかり」は、対照品種「松風の夢」と比較して、茎の色が紫又は褐を帯びた緑であること、頭花の花柄の長さがかなり短であること、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）が少であること等で区別性が認められる。対照品種「岡祭り」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さが中であること、葉の一次欠刻の深さが深であること、舌状花の縦断面の形状が外反であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

加藤由博

長野県南佐久郡佐久穂町大字海瀬4727番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

加藤由博

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第19875号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精の一世 (セイノイツセイ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形は船底状、頭花の舌状花の二次的な形は管状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比はやや高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は晩生、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精の一世」は、対照品種「精の波」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さがやや深であること、頭花の舌状花の形の数2であること、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）が少であること等で区別性が認められる。対照品種「精興新年」と比較して、葉の幅がやや広であること、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第19876号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 笑の駒 (シヨウコマ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は粗、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは長、舌状花の幅はかなり広、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性はやや早生、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「笑の駒」は、対照品種「笑栄」と比較して、茎の色が紫又は褐を帯びた緑であること、舌状花の幅がかなり広であること、舌状花の先端の形が歯状であること等で区別性が認められる。対照品種「笑の東」と比較して、葉の長さ／幅がやや低であること、葉の裂片縁部の重なりが接するであること、舌状花の先端の形が歯状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小井戸輝雄
長野県松本市元町一丁目1番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名

小井戸輝雄

7 出願公表の年月日 平成20年12月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第19877号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. シュースマイル

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は鋭形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は4月～6月咲き（夏）、各開花習性における早晚性は晩生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シュースマイル」は、対照品種「しずか」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、葉の基部の形が鋭形であること、花序の側枝の頭花の向き（叢生でない品種に限る）が上であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地
山手正則
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一 山手正則

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第19878号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus unshiu Marcow. いち陽 (イチヨウ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿はやや開張、樹の大きさは中、樹勢は中、枝梢の太さは中、枝梢の長さは中、節間長は中、枝梢のとげの多少は無、葉身の形は紡錘形、葉身波状の程度は弱、葉身の大きさは中、葉身長は中、葉身幅は中、葉形指数は大、網脈の鮮明度は明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さは中、葉柄の太さは中、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは重、花卉の形は紡錘形、花卉の長さは長、花卉の幅は広、花卉の数は5枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は少、果実の形は扁平、果頂部の形は平坦、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は不明瞭、果梗部の形は切平面、果梗部放射条溝の多少は少、果心の充実度は粗、果心の大きさは中、果実の重さは中、果皮の色は濃橙、油胞の大きさは中、油胞の密度は中、油胞の凹凸は平、果面の粗滑は滑、果皮の厚さは厚、果皮歩合は大、剥皮の難易は易、じょうのう膜の硬さは中、さじょうの形は中、さじょうの大きさは中、さじょう(果肉)の色は濃橙、果汁の多少は中、甘味は高、酸味は中、香気の多少は中、種子数は無、発芽期は晩、成熟期はかなり晩、浮皮果の発生は無、裂果の発生は無、貯蔵性は極長である。

出願品種「いち陽」は、対照品種「青島温州」と比較して、果面の粗滑が滑であること、浮皮果の発生が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岩下秀行

熊本県玉名市天水町小天675-61

6 登録品種の育成をした者の氏名

岩下秀行

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 8 7 9 号 平成 2 2 年 9 月 2 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Convolvulus L. ウェルスター海星 (ウェルスターカイイ)
- 3 登録品種の特性の概要
草型はほふく、株の高さは中、茎の長さは中、茎の太さは細、茎の色は緑、葉の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅は中、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉柄の有無は有、花形は花冠を形成しない、花の大きさはやや大、花の高さは低、花の色はN88D、花冠の模様の有無は有、花冠の模様のタイプは絞り、花冠の模様の色はN88B、がく裂片の全体の形は披針形、がく裂片の長さは中、開花期は中、花持ちは2日である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「ウェルスター海星」は、対照品種「ウェルスター」と比較して、花形が花冠を形成しないであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
伊藤新八
愛知県一宮市猿海道一丁目20番地15号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
伊藤新八
- 7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 8 月 1 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19880号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Convolvulus L. ウェルスター真澄 (ウェルスターマシ)

3 登録品種の特性の概要

草型はほふく、株の高さは中、茎の長さは中、茎の太さは細、茎の色は緑、葉の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅は中、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉柄の有無は有、花形はその他（桔梗咲き）、花の大きさは中、花の高さは中、花の色はNN155C、花冠の模様の有無は有、花冠の模様のタイプは絞り、花冠の模様の色はN88B、がく裂片の全体の形は披針形、がく裂片の長さは中、開花期は中、花持ちは2日である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ウェルスター真澄」は、対照品種「ウェルスター海星」と比較して、花形がその他（桔梗咲き）であること、花の色がNN155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ウェルスター」と比較して、花の色がNN155Cであること、花冠の模様のタイプが絞りであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

伊藤新八

愛知県一宮市猿海道一丁目20番地15号

6 登録品種の育成をした者の氏名

伊藤新八

7 出願公表の年月日 平成21年8月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第19881号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Guzmania Ruiz et Pav. Tinto

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、株の幅は狭、葉の数はやや少、葉しょうの長さはやや短、葉しょうの幅はやや狭、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は鋭形、葉身の表面の主な色は淡緑、葉身の表面の二次色の有無は無、葉身の裏面の主な色は淡緑、葉身の裏面のアントシアニン着色の有無は無、花序の型はリングラータ型、花序の位置は同位、花序の長さは短、花序の着花部の長さは短、花序の着花部の直径は中、花序のほうの数はやや少、花序の1ほう内の小花の数は1、ほうの長さはやや長、ほうの幅は中、ほうの先端の幅は狭、ほうの表面の色は53A、ほうの裏面の色は53A、がくの色はNN155B、花冠の色は14Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Tinto」は、対照品種「テンポ」と比較して、ほうの表面の色が53Aであること、ほうの裏面の色が53Aであること等で区別性が認められる。対照品種「Intro」と比較して、ほうの表面の色が53Aであること、ほうの裏面の色が53Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Corn. Bak B. V.

Dorpsstraat 11B, 1566AA Assendelft, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Elly Bak N. D. M. Steur

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19882号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Guzmania Ruiz et Pav. GLOSSITA

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり低、株の幅は狭、葉の数はやや少、葉しょうの長さはやや短、葉しょうの幅はやや狭、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は鋭形、葉身の表面の主な色は淡緑、葉身の表面の二次色の有無は無、葉身の裏面の主な色は淡緑、葉身の裏面のアントシアニン着色の有無は無、花序の型はリングラータ型、花序の位置は同位、花序の長さは短、花序の着花部の長さは短、花序の着花部の直径は中、花序のほうの数はやや少、花序の1ほう内の小花の数は1、ほうの長さはやや短、ほうの幅は狭、ほうの先端の幅は狭、ほうの表面の色は39A、ほうの裏面の色は39B、がくの色はNN155B、花冠の色は4Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「GLOSSITA」は、対照品種「テンポ」と比較して、ほうの長さがやや短であること、ほうの表面の色が39Aであること等で区別性が認められる。対照品種「Tinto」と比較して、ほうの長さがやや短であること、ほうの表面の色が39Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Corn. Bak B.V.

Dorpsstraat 11 B, 1566AA Assendelft, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Elly Bak N.D.M. Steur

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第19883号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Guzmania Ruiz et Pav. Fusion

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、株の幅はやや狭、葉の数は中、葉しょうの長さはやや短、葉しょうの幅はやや狭、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の表面の主な色は緑、葉身の表面の二次色の有無は無、葉身の裏面の主な色は緑、葉身の裏面のアントシアニン着色の有無は有、葉身の裏面のアントシアニン着色の分布は縞斑内、花序の型はザーニー型、花序の位置は上位、花序の長さはやや長、花序の着花部の長さは短、花序の着花部の直径は中、花序のほうの数はやや少、花序の1ほう内の小花の数は複数、花序の1ほう内の小花の総数（1ほう内の小花の数が複数の品種に限る。）はやや少、ほうの長さはやや長、ほうの幅は広、ほうの先端の幅は中、ほうの表面の色は61A、ほうの裏面の色は61A、前出葉の色は155B（主な色）、71B(上部)、がくの色はNN155A、花冠の色は155Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Fusion」は、対照品種「バクコンビ」と比較して、ほうの表面の色が61Aであること等で区別性が認められる。対照品種「Rock」と比較して、葉身の裏面のアントシアニン着色の有無が有であること、ほうの表面の色が61Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Corn. Bak B.V.

Dorpsstraat 11 B, 1566AA Assendelft, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Elly Bak N.D.M. Steur

7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第19884号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Guzmania Ruiz et Pav. Meteor

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、株の幅はやや広、葉の数はやや多、葉しょうの長さは中、葉しょうの幅は中、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の表面の主な色は淡緑、葉身の表面の二次色の有無は無、葉身の裏面の主な色は淡緑、葉身の裏面のアントシアニン着色の有無は有、葉身の裏面のアントシアニン着色の分布は縞斑内、花序の型はザーニー型、花序の位置は上位、花序の長さは中、花序の着花部の長さはかなり短、花序の着花部の直径は中、花序のほうの数少、花序の1ほう内の小花の数は複数、花序の1ほう内の小花の総数（1ほう内の小花の数が複数の品種に限る。）は多、ほうの長さは中、ほうの幅は極広、ほうの先端の幅は中、ほうの表面の色は53A、ほうの裏面の色は53A、前出葉の色は53Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Meteor」は、対照品種「スイッチ」と比較して、花序の着花部の長さがかなり短であること、ほうの表面の色が53Aであること等で区別性が認められる。対照品種「バクコンビ」と比較して、ほうの表面の色が53Aであること等で区別性が認められる。対照品種「Claret」と比較して、花序の長さが中であること、前出葉の色が53Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Corn. Bak B.V.

Dorpsstraat 11 B, 1566AA Assendelft, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Elly Bak N.D.M. Steur

7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第19885号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Guzmania Ruiz et Pav. Baktechno

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、株の幅はやや狭、葉の数は中、葉しょうの長さは中、葉しょうの幅はやや狭、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の表面の主な色は淡緑、葉身の表面の二次色の有無は無、葉身の裏面の主な色は淡緑、葉身の裏面のアントシアニン着色の有無は無、花序の型はザーニー型、花序の位置は上位、花序の長さは中、花序の着花部の長さはやや短、花序の着花部の直径は中、花序のほうの数は少、花序の1ほう内の小花の数は複数、ほうの長さは長、ほうの幅はかなり広、ほうの先端の幅は中、ほうの表面の色は45B、ほうの裏面の色は45Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Baktechno」は、対照品種「Fiesta」と比較して、葉身の裏面のアントシアニン着色の有無が無であること、ほうの表面の色が45Bであること等で区別性が認められる。対照品種「Rock」と比較して、ほうの表面の色が45Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Corn. Bak B. V.

Dorpsstraat 11 B, 1566AA Assendelft, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Elly Bak N. D. M. Steur

7 出願公表の年月日 平成21年8月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第19886号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Guzmania Ruiz et Pav. Rock

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、株の幅はやや狭、葉の数は中、葉しょうの長さはやや短、葉しょうの幅はやや狭、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の表面の主な色は淡緑、葉身の表面の二次色の有無は無、葉身の裏面の主な色は淡緑、葉身の裏面のアントシアニン着色の有無は無、花序の型はザーニー型、花序の位置は上位、花序の長さは中、花序の着花部の長さはやや短、花序の着花部の直径はやや大、花序のほうの数はやや少、花序の1ほう内の小花の数は複数、ほうの長さはやや長、ほうの幅は広、ほうの先端の幅は中、ほうの表面の色は71A、ほうの裏面の色は71Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Rock」は、対照品種「バクコンビ」と比較して、葉身の裏面のアントシアニン着色の有無が無であること、ほうの表面の色が71Aであること等で区別性が認められる。対照品種「Fusion」と比較して、葉身の裏面のアントシアニン着色の有無が無であること、ほうの表面の色が71Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Corn. Bak B.V.

Dorpsstraat 11 B, 1566AA Assendelft, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Elly Bak N.D.M. Steur

7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第19887号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Guzmania Ruiz et Pav. Alto

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、株の幅はやや広、葉の数はやや多、葉しょうの長さはやや短、葉しょうの幅はやや狭、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の表面の主な色は淡緑、葉身の表面の二次色の有無は無、葉身の裏面の主な色は淡緑、葉身の裏面のアントシアニン着色の有無は有、葉身の裏面のアントシアニン着色の分布は縞斑内、花序の型はモノスタキア型、花序の位置は上位、花序の長さは中、花序の着花部の長さは短、花序の着花部の直径はやや小、花序のほうの数は極多、花序の1ほう内の小花の数は1、ほうの長さは短、ほうの幅はやや広、ほうの先端の幅は中、ほうの表面の色は59A、ほうの裏面の色は59A、がくの色は155C、花冠の色は12Aである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Alto」は、対照品種「トーチ」と比較して、葉身の裏面のアントシアニン着色の有無が有であること、ほうの表面の色が59Aであること、ほうの裏面の色が59Aであること等で区別性が認められる。対照品種「Focus」と比較して、ほうの表面の色が59Aであること、ほうの裏面の色が59Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Corn. Bak B.V.

Dorpsstraat 11 B, 1566AA Assendelft, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Elly Bak N.D.M. Steur

7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第19888号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Guzmania Ruiz et Pav. Freya

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、株の幅は中、葉の数はやや多、葉しょうの長さはやや長、葉しょうの幅は中、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の表面の主な色は淡緑、葉身の表面の二次色の有無は無、葉身の裏面の主な色は淡緑、葉身の裏面のアントシアニン着色の有無は有、葉身の裏面のアントシアニン着色の分布は縞斑内、花序の型はザーニー型、花序の位置は上位、花序の長さは長、花序の着花部の長さはやや短、花序の着花部の直径はかなり大、花序のほうの数はやや少、花序の1ほう内の小花の数は複数、花序の1ほう内の小花の総数（1ほう内の小花の数が複数の品種に限る。）は少、ほうの長さは極長、ほうの幅は広、ほうの先端の幅は中、ほうの表面の色は71B、ほうの裏面の色は71B、前出葉の色は4C（主な色）、67C（先端部）、がくの色はNN155C、花冠の色は5Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Freya」は、対照品種「バクコンビ」と比較して、ほうの表面の色が71Bであること、前出葉の幅がやや狭であること等で区別性が認められる。対照品種「ラナ」と比較して、ほうの表面の色が71Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Corn. Bak B.V.

Dorpsstraat 11 B, 1566AA Assendelft, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Elly Bak N.D.M. Steur

7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第19889号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Guzmania Ruiz et Pav. Eclipse

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、株の幅は中、葉の数はやや多、葉しょうの長さはやや短、葉しょうの幅はやや狭、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の表面の主な色は淡緑、葉身の表面の二次色の有無は無、葉身の裏面の主な色は淡緑、葉身の裏面のアントシアニン着色の有無は有、葉身の裏面のアントシアニン着色の分布は縞斑内、花序の型はザーニー型、花序の位置は同位、花序の長さはやや短、花序の着花部の長さはかなり短、花序の着花部の直径は中、花序のほうの数は少、花序の1ほう内の小花の数は複数、花序の1ほう内の小花の総数（1ほう内の小花の数が複数の品種に限る。）は少、ほうの長さは短、ほうの幅は広、ほうの先端の幅は中、ほうの表面の色は59B、ほうの裏面の色は59B、前出葉の色は8B（主な色）、46A（先端部）、がくの色はNN155C、花冠の色は7Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Eclipse」は、対照品種「バクコンビ」と比較して、前出葉の幅が狭であること、前出葉の色が8B（主な色）、46A（先端部）であること等で区別性が認められる。対照品種「Fusion」と比較して、ほうの表面の色が59Bであること、ほうの裏面の色は59Bであること、前出葉の長さがやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Corn. Bak B. V.
Dorpsstraat 11 B, 1566AA Assendelft, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Elly Bak N. D. M. Steur

7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第19890号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gypsophila L. Dangyp3837

3 登録品種の特性の概要

草型は立性、草丈はやや低、最長茎長はやや短、茎の太さは中、茎の色は緑、茎のアントシアニンの有無及び程度は無、分枝の多少はやや多、分枝の長さは短、分枝の角度は中、節間長はやや短、葉形は披針形、葉長はかなり短、葉幅はやや狭、葉の表面の色は緑、葉のアントシアニンの有無は無、花の着生密度は密、花卉の重ねは八重咲き、花の大きさはやや小、花色の単色、複色の別は単色、単色もしくは複色の地色はNN155D、花卉の形はへら形、花卉先端の形は凹形、花卉数はやや多、がくの形は杯状、がくの大きさは中、がくの色は緑、雌雄ずいの長さは中、一花茎当たりの花数はやや少、花の香りは中、早晩性はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Dangyp3837」は、対照品種「ダンギップクリス」と比較して、葉長がかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「ギプソクィーン」と比較して、葉の表面の色が緑であること、雄ずいの数が10以外であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger-Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva 50297 Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gabriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 8 9 1 号 平成 2 2 年 9 月 2 2 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gypsophila L. ESM ALICIA

3 登録品種の特性の概要

草型は立性、草丈はやや低、最長茎長はやや短、茎の太さは中、茎の色は淡緑、茎のアントシアニンの有無及び程度は無、分枝の多少はやや多、分枝の長さはやや短、分枝の角度は中、節間長はやや短、葉形は披針形、葉長はかなり短、葉幅はやや狭、葉の表面の色は緑、葉のアントシアニンの有無は無、花の着生密度は密、花卉の重ねは八重咲き、花の大きさは中、花色の単色、複色の別は単色、単色もしくは複色の地色は NN155D、花卉の形はへら形、花卉先端の形は凹形、花卉数はやや多、がくの形は杯状、がくの大きさは中、がくの色は淡緑、雌雄ずいの長さは中、一花茎当たりの花数は少、花の香りは中、早晩性は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ESM ALICIA」は、対照品種「ESM COLD」と比較して、分枝の多少がやや多であること、頂花直下の節間長がかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「Tosto」と比較して、葉長がかなり短であること、葉幅がやや狭であること、早晩性が晩であること等で区別性が認められる。対照品種「ニューホープ」と比較して、葉長がかなり短であること、葉幅がやや狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Esmeralda Breeding B.V.
Noordpolderweg 17, 1432JH Aalsmeer, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Aloysius A. J. Hooi jman

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 8 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 8 9 2 号 平成 2 2 年 9 月 2 2 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gypsophila L. ESM COLD

3 登録品種の特性の概要

草型は中間、草丈は低、最長茎長は短、茎の太さは中、茎の色は淡緑、茎のアントシアニンの有無及び程度は無、分枝の多少はかなり多、分枝の長さは短、分枝の角度は中、節間長は短、葉形は披針形、葉長はかなり短、葉幅はやや狭、葉の表面の色は緑、葉のアントシアニンの有無は無、花の着生密度はかなり密、花卉の重ねは八重咲き、花の大きさは中、花色の単色、複色の別は単色、単色もしくは複色の地色はNN155D、花卉の形はへら形、花卉先端の形は凹形、花卉数は多、がくの形は杯状、がくの大きさは中、がくの色は淡緑、雌雄ずいの長さは中、一花茎当たりの花数はやや少、花の香りは弱、早晩性は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ESM COLD」は、対照品種「ESM ALICIA」と比較して、分枝の多少がかなり多であること、頂花直下の節間長が極短であること等で区別性が認められる。対照品種「Tosto」と比較して、葉長がかなり短であること、葉幅がやや狭であること、早晩性が晩であること等で区別性が認められる。対照品種「ニューホープ」と比較して、分枝の多少がかなり多であること、葉長がかなり短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Esmeralda Breeding B.V.
Noordpolderweg 17, 1432JH Aalsmeer, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Aloysius A. J. Hooi jman

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 8 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 8 9 3 号 平成 2 2 年 9 月 2 2 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gypsophila L. ESM CIRQUE

3 登録品種の特性の概要

草型は中間、草丈はやや低、最長茎長はやや短、茎の太さは中、茎の色は淡緑、茎のアントシアニンの有無及び程度は無、分枝の多少はやや多、分枝の長さはやや短、分枝の角度は中、節間長は中、葉形は披針形、葉長は短、葉幅は中、葉の表面の色は緑、葉のアントシアニンの有無は無、花の着生密度は密、花卉の重ねは八重咲き、花の大きさはやや小、花色の単色、複色の別は単色、単色もしくは複色の地色はNN155D、花卉の形はへら形、花卉先端の形は凹形、花卉数はやや多、がくの形は杯状、がくの大きさは中、がくの色は緑、雌雄ずいの長さは長、一花茎当たりの花数はやや少、花の香りは中、早晩性はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ESM CIRQUE」は、対照品種「アルタイル」と比較して、葉幅が中であること等で区別性が認められる。対照品種「Dangyp3834」と比較して、花卉数がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種「ESM ALICIA」と比較して、草型が中間であること、がくの色が緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Esmeralda Breeding B.V.
Noordpolderweg 17, 1432JH Aalsmeer, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Aloysius A.J. Hooi jman

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 8 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 8 9 4 号 平成 2 2 年 9 月 2 2 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heliotropium arborescens L. ヘリオ0901

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈は極低、茎の太さはやや太、茎の色は緑、茎の毛の多少は多、分枝性は少、節間長はかなり短、葉の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形、葉の基部の形は鈍形、葉身長は長、葉身幅は中、葉表面の色は緑、葉表面の斑の有無は無、葉裏面のアントシアニンの着色の有無は無、葉表面の毛の多少は中、葉裏面の毛の多少は中、葉柄の長さはかなり短、花序の高さはかなり低、花序の幅は狭、花冠の長さは長、花冠の径は中、花冠裂片の単色・複色の別は複色、花冠裂片の主な色は86B、花冠裂片の複色の色は155C、複色の型は底白、複色模様の変化は無、がくの色は紫褐、花序軸の長さは中、花序軸の色は中、花の香りは中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ヘリオ0901」は、対照品種「ブルーワンダー」と比較して、葉の形が楕円形であること、葉の基部の形が鈍形であること、葉身幅が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ernst Benary 種苗有限会社

ドイツ連邦共和国 ミューンデン D-34346 ハーン ペテルスヴェック 72

6 登録品種の育成をした者の氏名

Roland Dorr

7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 2 月 1 4 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 8 9 5 号 平成 2 2 年 9 月 2 2 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens walleriana Hook. f. BALOLEPEAC

3 登録品種の特性の概要

葉部の高さはやや低、株の幅は中、茎のアントシアニン着色の強弱は弱、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉の裏面の葉脈間の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉の裏面の葉脈の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱はかなり弱、花柄の上面のアントシアニン着色の強弱は弱、花型は八重、花の幅はやや広、花の色数は2、花の主な色は58D、花の二次色（複色の品種に限る。）は69D、花の二次色の分布（複色の品種に限る。）は全花卉に不規則に分布である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALOLEPEAC」は、対照品種「フィエスタ ピンク ラッフル」と比較して、葉の長さが短であること、花の主な色が58Dであること等で区別性が認められる。対照品種「BALFIESTARSA」と比較して、葉の長さが短であること、花の主な色が58Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ティ・エム・ボール研究所
千葉県印旛郡酒々井町墨1538番地6

6 登録品種の育成をした者の氏名

Michael S. Uchneat

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 1 月 1 5 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 8 9 6 号 平成 2 2 年 9 月 2 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Impatiens walleriana Hook. f. BALFIEPRO
- 3 登録品種の特性の概要
葉部の高さはやや低、株の幅はやや狭、茎のアントシアニン着色の強弱はかなり弱、葉の長さは長、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は有、葉の表面の主な色（斑入り品種に限る。）は淡緑、葉の表面の二次色（斑入り品種に限る。）は黄白、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、花柄の上面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、花型は八重、花の幅はやや狭、花の色数は 1、花の主な色は 68D である。（カラーチャートは RHS を使用）
出願品種「BALFIEPRO」は、対照品種「フィエスタ ピンク ラッフル」と比較して、葉の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ティ・エム・ボール研究所
千葉県印旛郡酒々井町墨 1538-6
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Michael S. Uchneat
- 7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 5 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19897号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mandevilla Lindl. カミシンデンピンク5005

3 登録品種の特性の概要

樹姿はつる性、枝の太さは中、枝の色は緑、分枝性は少、節間長はかなり短、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は突形、葉基部の形は円形、葉身長は中、葉身幅は中、葉表面の色は137A、葉裏面の色は143A、斑の有無は無、葉表面の光沢は有、葉表面の毛は無、葉裏面の毛は無、葉柄の長さは中、葉柄の幅は中、葉柄の色は緑、花序の形は総状花序、花の向きは横向き、花形は一重咲、花の大きさは中、花の高さはやや高、花筒部の太さは太、花筒中間部の太さは中、花筒部の長さは中、つぼみの色は54C、花色は65D、花筒部内側の色は14A、花筒部外側の色は65C、花冠裂片全体の形は卵形、花冠裂片先端の形は突形、花冠裂片の開き方は平開、花冠裂片の重なりは重なる、花冠裂片の波打ちは弱、花冠裂片の長さは長、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片数は5枚、雄ずいの色は黄白、小花柄の太さは中、小花柄の長さは極長、小花柄の色は緑、花数はかなり多、花の香りは無、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミシンデンピンク5005」は、対照品種「リップギャルピンキーフラッシュ2」と比較して、葉基部の形が円形であること、花色が65Dであること、花数がかなり多であること等で区別性が認められる。対照品種「サンマンデトミ」と比較して、枝の色が緑であること、花色が65Dであること、花冠裂片全体の形が卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

園田憲雄

鹿児島県姶良郡湧水町鶴丸20-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

園田憲雄

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第19898号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Mandevilla Lindl. サワラノウレッド5134

3 登録品種の特性の概要

樹姿はつる性、枝の太さは中、枝の色は黄緑、分枝性は中、節間長は短、葉全体の形は倒卵形、葉先端の形は突形、葉基部の形は円形、葉身長はやや短、葉身幅は中、葉表面の色は137A、葉裏面の色は138B、斑の有無は無、葉表面の光沢は有、葉表面の毛は無、葉裏面の毛は無、葉柄の長さはやや長、葉柄の幅は中、葉柄の色は黄緑、花序の形は総状花序、花の向きは横向き、花形は一重咲、花の大きさは中、花の高さは中、花筒部の太さはやや太、花筒中間部の太さは太、花筒部の長さは中、つぼみの色は53A、花色は59A、花筒部内側の色は169C、花筒部外側の色は53B、花冠裂片全体の形は倒卵形、花冠裂片先端の形は突形、花冠裂片の開き方は平開、花冠裂片の重なりは重なる、花冠裂片の波打ちは弱、花冠裂片の長さはやや長、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片数は5枚、雄ずいの色は黄白、小花柄の太さは中、小花柄の長さは長、小花柄の色は緑、花数は多、花の香りは無、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「サワラノウレッド5134」は、対照品種「サンマンデレミ」と比較して、葉全体の形が倒卵形であること、花色が59Aであること等で区別性が認められる。対照品種「モモチャコレッド5」と比較して、葉全体の形が倒卵形であること、花色が59Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

園田憲雄
鹿児島県姶良郡湧水町鶴丸20-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

園田憲雄

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第19899号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mandevilla Lindl. ケドアカ5152

3 登録品種の特性の概要

樹姿はつる性、枝の太さは中、枝の色は黄緑、分枝性は少、節間長はかなり短、葉全体の形は倒卵形、葉先端の形は突形、葉基部の形は円形、葉身長はやや短、葉身幅は中、葉表面の色は137A、葉裏面の色は138B、斑の有無は無、葉表面の光沢は有、葉表面の毛は無、葉裏面の毛は無、葉柄の長さは中、葉柄の幅は中、葉柄の色は黄緑、花序の形は総状花序、花の向きは横向き、花形は一重咲、花の大きさはやや大、花の高さは中、花筒部の太さはやや太、花筒中間部の太さはかなり太、花筒部の長さはやや長、つぼみの色は53A、花色はN57A、花筒部内側の色は169C、花筒部外側の色はN57A、花冠裂片全体の形は倒卵形、花冠裂片先端の形は鋭形、花冠裂片の開き方は平開、花冠裂片の重なりは重なる、花冠裂片の波打ちは中、花冠裂片の長さは長、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片数は5枚、雄ずいの色は黄白、小花柄の太さは太、小花柄の長さは極長、小花柄の色は緑、花数は多、花の香りは無、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ケドアカ5152」は、対照品種「サンマンデレミ」と比較して、葉全体の形が倒卵形であること、花色がN57Aであること等で区別性が認められる。対照品種「モモチャコレッド5」と比較して、葉全体の形が倒卵形であること、花色がN57Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

園田憲雄

鹿児島県姶良郡湧水町鶴丸20-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

園田憲雄

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第19900号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mandevilla Lindl. ツルマルノウアカ5155

3 登録品種の特性の概要

樹姿はつる性、枝の太さは中、枝の色は黄緑、分枝性は少、節間長は短、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は突形、葉基部の形は円形、葉身長は短、葉身幅は中、葉表面の色はN137A、葉裏面の色は138B、斑の有無は無、葉表面の光沢は有、葉表面の毛は無、葉裏面の毛は無、葉柄の長さはやや長、葉柄の幅は狭、葉柄の色は黄緑、花序の形は総状花序、花の向きは横向き、花形は一重咲、花の大きさは中、花の高さは中、花筒部の太さはやや太、花筒中間部の太さは太、花筒部の長さは中、つぼみの色は53A、花色は53A、花筒部内側の色は169C、花筒部外側の色は53B、花冠裂片全体の形は倒卵形、花冠裂片先端の形は突形、花冠裂片の開き方は平開、花冠裂片の重なりは重なる、花冠裂片の波打ちは中、花冠裂片の長さは長、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片数は5枚、雄ずいの色は黄白、小花柄の太さは中、小花柄の長さは長、小花柄の色は緑、花数は多、花の香りは無、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ツルマルノウアカ5155」は、対照品種「サンマンデレミ」と比較して、葉全体の形が楕円形であること、花冠裂片の波打ちが中であること等で区別性が認められる。対照品種「モモチャコレッド5」と比較して、枝の色が黄緑であること、花冠裂片の波打ちが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

園田憲雄

鹿児島県姶良郡湧水町鶴丸20-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

園田憲雄

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第19901号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mandevilla Lindl. ツキアカリピンク6030

3 登録品種の特性の概要

樹姿はつる性、枝の太さは中、枝の色は緑、分枝性はやや少、節間長はやや短、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は突形、葉基部の形は円形、葉身長はやや短、葉身幅はやや広、葉表面の色は137A、葉裏面の色は143A、斑の有無は無、葉表面の光沢は有、葉表面の毛は無、葉裏面の毛は無、葉柄の長さはやや短、葉柄の幅は中、葉柄の色は黄緑、花序の形は総状花序、花の向きは横向き、花形は一重咲、花の大きさは大、花の高さは高、花筒部の太さはやや太、花筒中間部の太さは太、花筒部の長さはやや長、つぼみの色は53C、花色はN66A、花筒部内側の色は14A、花筒部外側の色は68A、花冠裂片全体の形は倒卵形、花冠裂片先端の形は突形、花冠裂片の開き方は平開、花冠裂片の重なりは重なる、花冠裂片の波打ちは弱、花冠裂片の長さは長、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片数は5枚、雄ずいの色は黄白、小花柄の太さは中、小花柄の長さは長、小花柄の色は緑、花数は極多、花の香りは無、開花期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ツキアカリピンク6030」は、対照品種「リップギャルピンキーフラッシュ2」と比較して、葉基部の形が円形であること、花色がN66Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ヘブンリィピンク8」と比較して、花の高さが高であること、花色がN66Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

園田憲雄

鹿児島県姶良郡湧水町鶴丸20-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

園田憲雄

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第19902号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mandevilla Lindl. ハンニャジセンレッド6106

3 登録品種の特性の概要

樹姿はつる性、枝の太さは中、枝の色は黄緑、分枝性はやや少、節間長は短、葉全体の形は倒卵形、葉先端の形は突形、葉基部の形は円形、葉身長はやや短、葉身幅は中、葉表面の色は137A、葉裏面の色は138B、斑の有無は無、葉表面の光沢は有、葉表面の毛は無、葉裏面の毛は無、葉柄の長さはやや長、葉柄の幅は中、葉柄の色は黄緑、花序の形は総状花序、花の向きは横向き、花形は一重咲、花の大きさは中、花の高さは中、花筒部の太さはやや太、花筒中間部の太さは太、花筒部の長さは中、つぼみの色はN57B、花色はN57A、花筒部内側の色は169C、花筒部外側の色はN57B、花冠裂片全体の形は倒卵形、花冠裂片先端の形は鋭形、花冠裂片の開き方は平開、花冠裂片の重なりは重なる、花冠裂片の波打ちは弱、花冠裂片の長さは長、花冠裂片の幅は中、花冠裂片数は5枚、雄ずいの色は黄白、小花柄の太さは中、小花柄の長さは長、小花柄の色は緑、花数は多、花の香りは無、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ハンニャジセンレッド6106」は、対照品種「サンマンデレミ」と比較して、葉全体の形が倒卵形であること、花色がN57Aであること等で区別性が認められる。対照品種「モモチャコレッド5」と比較して、葉全体の形が倒卵形であること、花色がN57Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

園田憲雄

鹿児島県姶良郡湧水町鶴丸20-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

園田憲雄

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第19903号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mandevilla Lindl. ツルハンピンキー1

3 登録品種の特性の概要

樹姿はつる性、枝の太さは中、枝の色は緑、分枝性はやや少、節間長は極短、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は突形、葉基部の形は円形、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、葉表面の色は137A、葉裏面の色は143A、斑の有無は無、葉表面の光沢は有、葉表面の毛は無、葉裏面の毛は無、葉柄の長さは中、葉柄の幅は狭、葉柄の色は緑、花序の形は総状花序、花の向きは横向き、花形は一重咲、花の大きさは中、花の高さは中、花筒部の太さはやや太、花筒中間部の太さは太、花筒部の長さは中、つぼみの色は54B、花色は68B、花筒部内側の色は14A、花筒部外側の色は63C、花冠裂片全体の形は卵形、花冠裂片先端の形は突形、花冠裂片の開き方は平開、花冠裂片の重なりは重なる、花冠裂片の波打ちは無、花冠裂片の長さは長、花冠裂片の幅は広、花冠裂片数は5枚、雄ずいの色は黄白、小花柄の太さは太、小花柄の長さはかなり長、小花柄の色は緑、花数は極多、花の香りは無、開花期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ツルハンピンキー1」は、対照品種「リップギアルピンキーフラッシュ2」と比較して、花冠裂片の波打ちが無であること、花数が極多であること等で区別性が認められる。対照品種「サンマンデトミ」と比較して、枝の色が緑であること、花筒中間部の太さがかなり太であること、花冠裂片全体の形が卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

園田憲雄

鹿児島県姶良郡湧水町鶴丸20-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

園田憲雄

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19904号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mandevilla Lindl. ヘブンリィピンク8

3 登録品種の特性の概要

樹姿はつる性、枝の太さは中、枝の色は緑、分枝性は中、節間長は短、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は鋭形、葉基部の形は円形、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、葉表面の色は137B、葉裏面の色は143A、斑の有無は無、葉表面の光沢は有、葉表面の毛は無、葉裏面の毛は無、葉柄の長さはやや短、葉柄の幅はやや広、葉柄の色は緑、花序の形は総状花序、花の向きは横向き、花形は一重咲、花の大きさは中、花の高さは中、花筒部の太さは中、花筒中間部の太さは太、花筒部の長さは中、つぼみの色は53C、花色はN67C、花筒部内側の色は14A、花筒部外側の色は63C、花冠裂片全体の形は卵形、花冠裂片先端の形は突形、花冠裂片の開き方は平開、花冠裂片の重なりは重ならない、花冠裂片の波打ちはかなり弱、花冠裂片の長さは長、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片数は5枚、雄ずいの色は黄白、小花柄の太さは中、小花柄の長さは極長、小花柄の色は緑、花数は極多、花の香りは無、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ヘブンリィピンク8」は、対照品種「リップギャルピンキーフラッシュ2」と比較して、葉先端の形が鋭形であること、花色がN67Cであること、花数が極多であること等で区別性が認められる。対照品種「ツキアカリピンク6030」と比較して、葉身幅がやや狭であること、花色がN67Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

園田憲雄

鹿児島県姶良郡湧水町鶴丸20-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

園田憲雄

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第19905号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Oryza sativa L. モミロマン

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、出穂期（50%出穂）はやや晩、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）はやや短、主軸の長さは長、穂数は少、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期はかなり晩、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾1000粒重は大、穎のフェノール反応は無、玄米の長さはかなり長、玄米の幅はやや広、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は濃緑、稈の太さは太、芒は無、穂の抽出度は概ね抽出（穂軸の一部も）、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は5型、障害型耐冷性の中、穂発芽性の中、耐倒伏性は極強、脱粒性は難、白葉枯病ほ場抵抗性は弱、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型（+）、蛋白質含量はやや低である。

出願品種「モミロマン」は、対照品種「タカナリ」と比較して、出穂期（50%出穂）はやや晩であること、胚乳のアミロース含量が5型であること、穂発芽性の中であること等で区別性が認められる。対照品種「日本晴」と比較して、穂数が少であること、障害型耐冷性の中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

平林秀介 根本博 安東郁男 加藤浩 太田久稔 佐藤宏之 竹内善信 石井卓朗
前田英郎 井邊時雄 出田収 平山正賢 岡本正弘 西村実 八木忠之 梶亮太

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第19906号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Group TM フォルテシモ

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは斜上、葉の表面の色は黄緑、花序の型は複総状、花序の花数は中、花型は部分抱・平咲、花の縦径はやや長、花の横径はやや広、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様は網斑、ドーサルセパルの地色はN80C、ドーサルセパルの模様の色はN80B、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様は網斑、ラテラルセパルの地色はN80C、ラテラルセパルの模様の色はN80B、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様は網斑、ペタルの地色はN80C、ペタルの模様の色はN80B、リップの中央裂片の正面の形は菱形、リップの中央裂片の模様はぼかし、点斑、リップの中央裂片の地色はN80C、リップの中央裂片の模様の色は163D（ぼかし）、178B（ぼかし）、N80A（点斑）、リップの側裂片の模様はぼかし、縞斑、リップの側裂片の地色はN155A、リップの側裂片の模様の色はN80A（ぼかし）、163B（ぼかし）、187D（縞斑）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TM フォルテシモ」は、対照品種「スーパーマーメイド スプリングスター」と比較して、ドーサルセパルの地色がN80Cであること、ずい柱の色がNN155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ハッピーバレンタイン ラズベリーラブ」と比較して、ドーサルセパルの地色がN80Cであること、ずい柱の色がNN155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

武田和明
埼玉県入間郡三芳町上富740番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

武田和明

7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 9 0 7 号 平成 2 2 年 9 月 2 2 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Group The Pride Of Taiwan

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは斜上、葉の表面の色は緑、花序の型は複総状、花序の花数はやや少、花型は部分抱・平咲、花の縦径は中、花の横径は中、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は卵形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様は単色、ドーサルセパルの地色は149D、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様は単色、ラテラルセパルの地色は149D、ペタルの正面の形は菱形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様は脈斑、ペタルの地色は157C、ペタルの模様の色は84C、リップの中央裂片の正面の形は卵形、リップの中央裂片の模様はぼかし、リップの中央裂片の地色はN81B、リップの中央裂片の模様の色は187C, 76C、リップの側裂片の模様はぼかし、点斑、リップの側裂片の地色はNN155B、リップの側裂片の模様の色は187C(ぼかし), 165B(点斑)である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「The Pride Of Taiwan」は、対照品種「Fuller's Sunset K51」と比較して、花の横径が中であること、ドーサルセパルの地色が149Dであること等で区別性が認められる。対照品種「Mapple Bridge」と比較して、ドーサルセパルの地色が149Dであること、ペタルの正面の形が菱形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

LIU TING JUNG

No.5, Fusing 8th St., Ji-an Township, Hualien Country 97364, Taiwan

6 登録品種の育成をした者の氏名

HO TING FAN

7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 4 月 2 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19908号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Group ジョイン 288-4

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは大、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは斜上、葉の表面の色は緑、花序の型は総状、花序の花数は少、花型は平咲、花の縦径はかなり長、花の横径はかなり広、ペタルの配列は接する、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様は単色、ドーサルセパルの地色はNN155C、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様は単色、ラテラルセパルの地色はNN155C、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様は単色、ペタルの地色はNN155C、リップの中央裂片の正面の形は菱形、リップの中央裂片の模様はぼかし、リップの中央裂片の地色はNN155C、リップの中央裂片の模様の色は12B, 181B、リップの側裂片の模様はぼかし、縞斑、リップの側裂片の地色はNN155C、リップの側裂片の模様の色は12B(ぼかし), 181B(縞斑)である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ジョイン 288-4」は、対照品種「ジョインエンジェル クラレオ」と比較して、リップの側裂片の模様の色が12B(ぼかし), 181B(縞斑)であること等で区別性が認められる。対照品種「エモーショナルムーン キンリユウ」と比較して、リップの中央裂片の模様の色が12B, 181Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

LEE TIN HSIUNG

No.1157 Zhongying, Zhongying Village, Siaying Township, Tainan County, Taiwan

6 登録品種の育成をした者の氏名

LEE TIN HSIUNG

7 出願公表の年月日 平成21年9月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第19909号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Group タイダキングスキャロライン リトルゼブラ

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは斜上、葉の表面の色は暗緑、花序の型は複総状、花序の花数は少、花型は部分抱・平咲、花の縦径はやや短、花の横径はやや狭、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様は脈斑、ドーサルセパルの地色は155C、ドーサルセパルの模様の色はN79B、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様は脈斑、ラテラルセパルの地色は155C、ラテラルセパルの模様の色はN79B、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様は脈斑、ペタルの地色は155C、ペタルの模様の色はN79B、リップの中央裂片の正面の形は卵形、リップの中央裂片の模様はぼかし、脈斑、リップの中央裂片の地色はN78B、リップの中央裂片の模様の色はN79A、リップの側裂片の模様はぼかし、リップの側裂片の地色は155C、リップの側裂片の模様の色はN79A, 6C, 187Aである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「タイダキングスキャロライン リトルゼブラ」は、対照品種「シーナズベリー4360」と比較して、ドーサルセパルの地色が155Cであること、ペタルの模様の色がN79Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

LAI PEN CHIH

No.137, Sec.3, Chung Shan Rd., Da Tsun, Chang Hwa, 51506 Taiwan

6 登録品種の育成をした者の氏名

LAI PEN CHIH

7 出願公表の年月日 平成21年7月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第19910号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Group キヌのそよ風 (キヌノヨカゼ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは水平、葉の表面の色は緑、花序の型は総状、花序の花数は中、花型は平咲、花の縦径はやや長、花の横径はやや広、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様はぼかし、ドーサルセパルの地色は8C、ドーサルセパルの模様の色は1C、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様は単色、ラテラルセパルの地色は3C、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様は単色、ペタルの地色は8C、リップの中央裂片の正面の形は三角形、リップの中央裂片の模様はぼかし、リップの中央裂片の地色はNN155C、リップの中央裂片の模様の色は14A、リップの側裂片の模様はぼかし、点斑、リップの側裂片の地色はNN155C、リップの側裂片の模様の色は14A(ぼかし), 172B(点斑)である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「キヌのそよ風」は、対照品種「メイプルブリッジ」と比較して、ラテラルセパルの模様が単色であること、リップの中央裂片の地色がNN155Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社キヌナーセリー
栃木県宇都宮市桑島町362-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

齋藤英夫

7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 9 1 1 号 平成 2 2 年 9 月 2 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pleurotus eryngii (Dcex Fr.) Quel. エバーリング 1号 (エバーリング 1コリ)
- 3 登録品種の特性の概要
菌糸密度はやや密、菌糸生長最適温度は低、菌さんの形は凹形、菌さんの紋様はその他(無)、菌さんの表面の突起は無、菌さんの大きさはかなり大、菌さんの中心部の色はその他(灰茶)、菌さんの周縁部の色はその他(淡橙黄)、菌さんの厚さは厚、菌さんの肉質は硬、子実層たぐの並び方は直線上、子実層たぐの菌柄への付き方は軽、子実層たぐの幅はやや狭、子実層たぐの色は淡灰黄色、菌柄の形は太短、菌柄の菌さんへの付き方は中心生、菌柄の長さはかなり長、菌さんの直径と菌柄の長さの比率は中、菌柄の太さは極太、菌柄の色は黄白色、菌柄の肉質は中、子実体の発生型は株状、子実体の有効茎数はかなり少、発生最盛期までの期間是中、発生最適温度は中、生育最適温度は低、子実体の収量性は多である。
出願品種「エバーリング 1号」は、対照品種「しなの美人」と比較して、子実層たぐの幅がやや狭であること、菌柄の形が太短であること、菌柄の太さが極太であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
旭松食品株式会社
長野県飯田市駄科1008番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
川合源四郎
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 8 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19912号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pleurotus eryngii (Dcex Fr.) Quel. PLE-3号 (PLE-3コウ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は中、菌さんの形は凹形、菌さんの紋様は筋状、菌さんの表面の突起は無、菌さんの大きさはやや大、菌さんの中心部の色はその他（淡灰褐色）、菌さんの周縁部の色はその他（淡灰褐色）、菌さんの厚さは中、菌さんの肉質は硬、子実層たくの並び方は直線上、子実層たくの菌柄への付き方は中、子実層たくの幅はやや狭、子実層たくの色は淡灰黄色、菌柄の形は中太、菌柄の菌さんへの付き方は中心生、菌柄の長さは長、菌さんの直径と菌柄の長さの比率はやや小、菌柄の太さはやや太、菌柄の色は黄白色、菌柄の肉質は硬、子実体の発生型は単生、子実体の有効茎数は少、発生最盛期までの期間はやや長、発生最適温度は中、生育最適温度はやや低、子実体の収量性はやや多である。

出願品種「PLE-3号」は、対照品種「ホクトPLE-2号」と比較して、菌さんの形が凹形であること、菌柄の形が中太であること等で区別性が認められる。対照品種「PLE-5号」と比較して、菌さんの形が凹形であること、菌さんの中心部の色がその他（淡灰褐色）であること、菌柄の形が中太であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ホクト株式会社
長野県長野市南堀138番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

倉島江里子 稲富聡

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第19913号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pleurotus eryngii (Dcex Fr.) Quel. PLE-5号 (PLE-5コウ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度はやや高、菌さんの形は平形、菌さんの紋様は筋状、菌さんの表面の突起は無、菌さんの大きさはやや大、菌さんの中心部の色はその他（淡灰橙色）、菌さんの周縁部の色はその他（淡灰橙色）、菌さんの厚さはやや厚、菌さんの肉質は硬、子実層たくの並び方は直線上、子実層たくの菌柄への付き方は軽、子実層たくの幅はやや狭、子実層たくの色は淡灰黄色、菌柄の形は太長、菌柄の菌さんへの付き方は中心生、菌柄の長さはかなり長、菌さんの直径と菌柄の長さの比率はやや小、菌柄の太さは太、菌柄の色は黄白色、菌柄の肉質は硬、子実体の発生型は単生、子実体の有効茎数はかなり少、発生最盛期までの期間は長、発生最適温度は中、生育最適温度はやや低、子実体の収量性はやや多である。

出願品種「PLE-5号」は、対照品種「ホクトPLE-2号」と比較して、菌柄の形が太長であること等で区別性が認められる。対照品種「PLE-3号」と比較して、菌さんの形が平形であること、菌さんの中心部の色がその他（淡灰橙色）であること、菌柄の形が太長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ホクト株式会社
長野県長野市南堀138番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

倉島江里子 稲富聡

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第19914号 平成22年9月22日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Silene L. ハッピーモモコ

3 登録品種の特性の概要

草型は直立、草丈は高、分枝性は中、茎の太さはやや細、茎の色は灰緑、葉の形は披針形、葉身長は長、葉身幅はやや広、葉の表面の色は144B、葉のアントシアンの着色の有無は無、裏面の色は淡緑、斑の有無は無、花序の形は集散花序、花序の大きさはやや小、花型は一重、花容は内曲、花の向きは下向き、花径はやや小、花弁の形は倒心形、花弁先端の切れ込みは2裂、花弁先端の切れ込みの深さは深、花弁のフリルは弱、花弁基部突起(scale)の有無は無、花弁の長さはやや短、花弁の幅はやや狭、花色パターンは2色、花弁表面の色は75C、花弁表面の脈の着色は無、花弁表面の複色はNN155A、花弁裏面の色は75D、花弁裏面の脈の着色は有、花弁裏面の脈の色はその他、花色の変化の有無は無、萼の形は円錐形、萼の膨らみは有、萼の大きさは大、萼の色は145C、萼のアントシアンの着色は有、萼のアントシアンの着色の程度は少、萼の脈の明・不明は明瞭、萼の脈の色は緑、萼の脈の形は網目状、雌蕊の長さは長、雄蕊の長さは中、雌蕊の色は白、雄蕊の色は紅紫、1花序当りの花数は少である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ハッピーモモコ」は、対照品種「モモコヒメ」と比較して、花弁表面の色が75Cであること等で区別性が認められる。対照品種「シラユキヒメ」と比較して、花弁表面の色が75Cであること、雄蕊の色が紅紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

奥隆善
三重県伊賀市千戸706番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

奥隆善

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日