

1 品種登録の番号及び年月日 第21947号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calendula L. ファッションイエローアイ (ファッションイエローアイ)

3 登録品種の特性の概要

草型は斜状、株の高さはやや低、花茎長は短、茎の太さはやや太、葉序は互生、葉の着生角度は斜上、葉形は砲弾形、葉先端の形は微突形、葉基部の形は心形脚、葉の欠刻は少、葉長はやや長、葉幅は中、葉数はやや少、葉色は緑、花数は多、花形は二重咲、花容は斜上、花の大きさは中、舌状花の重ねの程度は低、舌状花数はかなり少、管状花部の大きさはやや小、花卉全体の形は線形、花卉先端の形は波状形、花卉の長さはやや長、花卉の幅は中、花卉の複色の有無は無、花卉表側の色は12A、花卉裏側の色は12B、花の中心部の色は茶、総ほうの直径は小、花柄の長さはやや短である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ファッションイエローアイ」は、対照品種「エロア」と比較して、葉形が砲弾形であること、花卉裏側の色が12Bであること等で区別性が認められる。対照品種「デージー レモン」と比較して、花形が二重咲であること、花卉裏側の色が12Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

トキタ種苗株式会社
埼玉県さいたま市見沼区中川1069
有限会社東京花壇
東京都西多摩郡日の出町平井374-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

時田勉 高橋黄穂美 佐藤陽 佐藤陽一

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 9 4 8 号 平成 2 4 年 9 月 2 5 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Centaurea L. アメジストドリーム (アメジストドリーム)

3 登録品種の特性の概要

草型は球状、草丈はやや低、茎の太さは中、茎のアントシアニンの発色は弱、茎の溝の深さは深、茎の毛の多少は多、分枝性は少、節間長は中、普通葉の形は披針形、普通葉の葉縁の形は全縁、普通葉の欠刻の深さは極浅、ロゼット葉の形は披針形、ロゼット葉の葉縁の形は全縁、ロゼット葉の欠刻の深さは極浅、葉長は中、葉幅は中、葉色はやや濃、葉の表面の毛じの有無並びに程度は中、葉の裏面の毛じの有無並びに程度は中、花房の形は一輪咲き、花形はやぐるまぎく形、花の重ねは一重、花径はやや大、外部小花数は少、管状花の長さは長、管状花数は中、花弁の形は漏斗形、花弁先端部の切れ込みの数は中、花弁の長さは長、花弁の色は77A、花色のパターンは単色、総ほうの形は卵形、総ほうの大きさはやや大、総ほう片先端部の切れ込みの数は多、花首の太さは中、花首の長さは短、花の香りは弱、冬咲き性、春咲き性の別及び開花期の早晩は春咲き中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「アメジストドリーム」は、対照品種「ゴールドブリオン」と比較して、葉色がやや濃であること、花弁の色が77Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Takii Europe B.V.
Hoofdweg 19 1424PC De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Elisabeth Sahin Georgiadou

7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 8 月 2 5 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第21949号 平成24年9月25日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum fruticulosum (Ledeb.) Ohashi et Yonekura x C. x morifolium Ramat.
アロママ3号 (アロママ3ゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはかなり短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは極長、葉の一次欠刻の深さは極深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く) は無又は極弱、葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く) は弱、葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く) は147B、花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る) は中、頭花の型は一重、花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く) はデイジー、頭花の直径 (摘らいしていないもの) は極小、頭花の舌状花数 (一重及び半八重品種に限る) は極少、頭花の舌状花の形の数 は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き (一重及び半八重品種に限る) は水平、舌状花の花筒の長さはやや長、舌状花の最大幅部の横断面の形 (管状でない舌状花) はやや凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は極狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性 (ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む) は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ (一重及び半八重品種に限る) は極大、花盤の開やく前の色の区分 (デイジー型の品種に限る) は淡黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無 (デイジー型の品種に限る) は無、日長感応グループ (正確な日長制御での栽培) は9週間、開花習性は10月～11月咲き (秋) である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「アロママ3号」は、対照品種「アロママ1号」と比較して、たく葉の大きさが中であること、花盤の頭花に対する直径の大きさ (一重及び半八重品種に限る) が極大であること等で区別性が認められる。対照品種「XXS Yellow」と比較して、草丈がやや低であること、花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く) がデイジーであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立大学法人広島大学
広島県東広島市鏡山一丁目3番2号
中部電力株式会社
愛知県名古屋市東区東新町1番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
近藤勝彦 津田その子
- 7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第21950号 平成24年9月25日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum fruticulosum (Ledeb.) Ohashi et Yonekura x C. x morifolium Ramat.
アロママ4号 (アロママゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はかなり低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはかなり短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはかなり長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く) は無又は極弱、葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く) は弱、葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く) は147B、花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る) は中、頭花の型は一重、花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く) はデージー、頭花の直径 (摘らいしていないもの) は極小、頭花の舌状花数 (一重及び半八重品種に限る) はかなり少、頭花の舌状花の形の数 は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き (一重及び半八重品種に限る) はやや斜上、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形 (管状でない舌状花) はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は極狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性 (ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む) は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ (一重及び半八重品種に限る) は極大、花盤の開やく前の色の区分 (デージー型の品種に限る) は黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無 (デージー型の品種に限る) は無、日長感応グループ (正確な日長制御での栽培) は9週間、開花習性は10月～11月咲き (秋) である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「アロママ4号」は、対照品種「アロママ3号」と比較して、草丈がかなり低であること、葉の周縁の二次欠刻の数が少であること等で区別性が認められる。対照品種「XXS Yellow」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さがかなり長であること、花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く) がデージーであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立大学法人広島大学
広島県東広島市鏡山一丁目3番2号
中部電力株式会社
愛知県名古屋市東区東新町1番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
近藤勝彦 津田その子
- 7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第21951号 平成24年9月25日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum fruticulosum (Ledeb.) Ohashi et Yonekura x C. x morifolium Ramat.
アロママ5号 (アロマ5ゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはかなり短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは極長、葉の一次欠刻の深さは極深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く) は無又は極弱、葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く) は弱、葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く) は147B、花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る) は中、頭花の型は半八重、花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く) はダイジー、頭花の直径 (摘らいしていないもの) は極小、頭花の舌状花数 (一重及び半八重品種に限る) はかなり少、頭花の舌状花の形の数 は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き (一重及び半八重品種に限る) は水平、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形 (管状でない舌状花) は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は2A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性 (ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む) は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ (一重及び半八重品種に限る) は極大、花盤の開やく前の色の区分 (ダイジー型の品種に限る) は黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無 (ダイジー型の品種に限る) は無、日長感応グループ (正確な日長制御での栽培) は8週間、開花習性は10月～11月咲き (秋) である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「アロママ5号」は、対照品種「アロママ4号」と比較して、葉柄の葉長に対する長さがやや長であること、日長感応グループ (正確な日長制御での栽培) が8週間であること等で区別性が認められる。対照品種「セイチェルシー」と比較して、葉の長さ／幅がやや低であること、葉の周縁の二次欠刻の深さが極深であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立大学法人広島大学
広島県東広島市鏡山一丁目3番2号
中部電力株式会社
愛知県名古屋市東区東新町1番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
近藤勝彦 津田その子
- 7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第21952号 平成24年9月25日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum fruticulosum (Ledeb.) Ohashi et Yonekura x C. x morifolium Ramat.
アロママ6号 (アロママ6ゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はかなり低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは極短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅は低、葉の先端裂片の相対的な長さは極長、葉の一次欠刻の深さは極深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く) は無又は極弱、葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く) は弱、葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く) は147B、花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る) は中、頭花の型は一重、花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く) はデイジー、頭花の直径 (摘らいしていないもの) は極小、頭花の舌状花数 (一重及び半八重品種に限る) は極少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き (一重及び半八重品種に限る) はやや斜上、舌状花の花筒の長さは中、舌状花の最大幅部の横断面の形 (管状でない舌状花) はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は極狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性 (ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む) は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ (一重及び半八重品種に限る) は極大、花盤の開やく前の色の区分 (デイジー型の品種に限る) は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無 (デイジー型の品種に限る) は無、日長感応グループ (正確な日長制御での栽培) は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き (秋) である。(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「アロママ6号」は、対照品種「アロママ5号」と比較して、葉柄の葉長に対する長さがかなり長であること、一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る) が中であること等で区別性が認められる。対照品種「セイチェルシー」と比較して、葉柄の葉長に対する長さがかなり長であること、葉の長さ／幅が低であること等で区別性が認められる。対照品種「アロママ4号」と比較して、一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る) が中であること、舌状花の先端の形が歯状であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立大学法人広島大学
広島県東広島市鏡山一丁目3番2号
中部電力株式会社
愛知県名古屋市中区東新町1番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
近藤勝彦 津田その子
- 7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第21953号 平成24年9月25日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum fruticulosum (Ledeb.) Ohashi et Yonekura x C. x morifolium Ramat.
アロママ8号 (アロママ8ゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はかなり低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは極短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く) は無又は極弱、葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く) は弱、葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く) は147B、花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る) は中、頭花の型は一重、花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く) はデージー、頭花の直径 (摘らいしていないもの) は極小、頭花の舌状花数 (一重及び半八重品種に限る) は極少、頭花の舌状花の形の数 は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き (一重及び半八重品種に限る) は水平、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形 (管状でない舌状花) はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は極狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は2A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性 (ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む) は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ (一重及び半八重品種に限る) は極大、花盤の開やく前の色の区分 (デージー型の品種に限る) は黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無 (デージー型の品種に限る) は無、日長感応グループ (正確な日長制御での栽培) は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き (秋) である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「アロママ8号」は、対照品種「アロママ3号」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数が少であること、舌状花の花筒の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「アロママ4号」と比較して、葉柄の葉長に対する長さがやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「セイチェルシー」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さが長であること、葉の周縁の二次欠刻の数が少であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立大学法人広島大学
広島県東広島市鏡山一丁目3番2号
中部電力株式会社
愛知県名古屋市中区東新町1番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
近藤勝彦 津田その子
- 7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第21954号 平成24年9月25日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum fruticulosum (Ledeb.) Ohashi et Yonekura x C. x morifolium Ramat.
アロママ9号 (アロママ9ゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは極短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅は低、葉の先端裂片の相対的な長さは極長、葉の一次欠刻の深さは極深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の周縁淡色部の顕著さ(Chrysanthemum × morifolium品種を除く)は無又は極弱、葉の裏面の毛の粗密(Chrysanthemum × morifolium品種を除く)は弱、葉の裏面の色(Chrysanthemum × morifolium品種を除く)は147B、花序の一次分枝の着生角度(叢生でない品種に限る)は大、頭花の型は一重、花盤の型(八重及び露心する八重品種を除く)はデイジー、頭花の直径(摘らいしていないもの)は極小、頭花の舌状花数(一重及び半八重品種に限る)はかなり少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き(一重及び半八重品種に限る)は水平、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形(管状でない舌状花)はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は極狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性(ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む)は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ(一重及び半八重品種に限る)は極大、花盤の開やく前の色の区分(デイジー型の品種に限る)は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無(デイジー型の品種に限る)は無、日長感応グループ(正確な日長制御での栽培)は8週間、開花習性は10月～11月咲き(秋)である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「アロママ9号」は、対照品種「アロママ5号」と比較して、一茎当たりの頭花の総数(叢生でない品種に限る)が多であること等で区別性が認められる。対照品種「アロママ6号」と比較して、葉柄の葉長に対する長さがやや長であること、一茎当たりの頭花の総数(叢生でない品種に限る)が多であること等で区別性が認められる。対照品種「セイチェルシー」と比較して、葉の長さ／幅が低であること、葉の先端裂片の相対的な長さが極長であること、葉の周縁の二次欠刻の深さが極深であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立大学法人広島大学
広島県東広島市鏡山一丁目3番2号
中部電力株式会社
愛知県名古屋市中区東新町1番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
近藤勝彦 津田その子
- 7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第21955号 平成24年9月25日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum fruticulosum (Ledeb.) Ohashi et Yonekura x C. x morifolium Ramat.
アロママ10号 (アロママ10ゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは極短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く) は無又は極弱、葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く) は弱、葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く) は147B、花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る) は大、頭花の型は一重、花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く) はデイジー、頭花の直径 (摘らいしていないもの) は極小、頭花の舌状花数 (一重及び半八重品種に限る) は極少、頭花の舌状花の形の数 は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き (一重及び半八重品種に限る) はやや斜上、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形 (管状でない舌状花) は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は極狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性 (ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む) は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ (一重及び半八重品種に限る) は極大、花盤の開やく前の色の区分 (デイジー型の品種に限る) は淡黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無 (デイジー型の品種に限る) は無、日長感応グループ (正確な日長制御での栽培) は9週間、開花習性は10月～11月咲き (秋) である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「アロママ10号」は、対照品種「アロママ9号」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、葉の長さ／幅が中であること等で区別性が認められる。対照品種「セイチェルシー」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、葉の先端裂片の相対的な長さが長であること、葉の周縁の二次欠刻の数が少であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立大学法人広島大学
広島県東広島市鏡山一丁目3番2号
中部電力株式会社
愛知県名古屋市東区東新町1番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
近藤勝彦 津田その子
- 7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第21956号 平成24年9月25日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum fruticulosum (Ledeb.) Ohashi et Yonekura x C. x morifolium Ramat.
アロママ11号 (アロママ11ゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはかなり短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは長、葉の一次欠刻の深さは極深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く) は無又は極弱、葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く) は弱、葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く) は147B、花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る) は中、頭花の型は一重、花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く) はデージー、頭花の直径 (摘らいしていないもの) は極小、頭花の舌状花数 (一重及び半八重品種に限る) はかなり少、頭花の舌状花の形の数 は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き (一重及び半八重品種に限る) は斜上、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形 (管状でない舌状花) は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性 (ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む) は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ (一重及び半八重品種に限る) は極大、花盤の開やく前の色の区分 (デージー型の品種に限る) は淡黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無 (デージー型の品種に限る) は無、日長感応グループ (正確な日長制御での栽培) は9週間、開花習性は10月～11月咲き (秋) である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「アロママ11号」は、対照品種「アロママ10号」と比較して、舌状花の先端の形が尖ること等で区別性が認められる。対照品種「アロママ3号」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、葉の先端裂片の相対的な長さが長であること等で区別性が認められる。対照品種「FICOUPI」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、葉の一次欠刻の深さが極深であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立大学法人広島大学
広島県東広島市鏡山一丁目3番2号
中部電力株式会社
愛知県名古屋市東区東新町1番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
近藤勝彦 津田その子
- 7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第21957号 平成24年9月25日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum lavandulifolium (Fisch. & ex Trautv.) Makino x C. x morifolium R
amat. アロママ1号 (アロママ1ゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さはかなり短、
葉の幅は狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは長、葉の一次欠刻の深
さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の周縁淡色
部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く) は無又は極弱、葉の裏面の毛
の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く) は弱、葉の裏面の色
(Chrysanthemum × morifolium品種を除く) は147B、花序の一次分枝の着生角度 (叢生
でない品種に限る) は中、頭花の型は半八重、花盤の型 (八重及び露心する八重品種を
除く) はデイジー、頭花の直径 (摘らいしていないもの) はかなり小、頭花の舌状花数
(一重及び半八重品種に限る) は少、頭花の舌状花の形の数 は1、頭花の舌状花の主要
な形は舌状、舌状花の基部の向き (一重及び半八重品種に限る) は水平、舌状花の花筒
の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形 (管状でない舌状花) は平、舌状花
の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の
比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3A、舌状花の表面と比較し
た裏面の色の類似性 (ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む) は類似する、
花盤の頭花に対する直径の大きさ (一重及び半八重品種に限る) は大、花盤の開やく前
の色の区分 (デイジー型の品種に限る) は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの
有無 (デイジー型の品種に限る) は無、日長感応グループ (正確な日長制御での栽培)
は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き (秋) である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「アロママ1号」は、対照品種「FICOUPY」と比較して、たく葉の大きさが無
又は極小であること等で区別性が認められる。対照品種「フィプリティ」と比較し
て、たく葉の大きさが無又は極小であること、舌状花の先端の形が突起状であること等
で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立大学法人広島大学
広島県東広島市鏡山一丁目3番2号
中部電力株式会社
愛知県名古屋市中区東新町1番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
近藤勝彦 津田その子
- 7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第21958号 平成24年9月25日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum lavandulifolium (Fisch. & ex Trautv.) Makino x C. x morifolium R
amat. アロママ2号 (アロママ2ゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはかなり短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く) は無又は極弱、葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く) は弱、葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く) は147B、花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る) は中、頭花の型は半八重、花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く) はデイジー、頭花の直径 (摘らいしていないもの) はかなり小、頭花の舌状花数 (一重及び半八重品種に限る) は少、頭花の舌状花の形の数 は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き (一重及び半八重品種に限る) は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形 (管状でない舌状花) は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性 (ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む) は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ (一重及び半八重品種に限る) は大、花盤の開やく前の色の区分 (デイジー型の品種に限る) は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無 (デイジー型の品種に限る) は無、日長感応グループ (正確な日長制御での栽培) は8週間、開花習性は10月～11月咲き (秋) である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「アロママ2号」は、対照品種「アロママ1号」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「フィプリティー」と比較して、草丈が低であること、たく葉の大きさがかなり小であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立大学法人広島大学
広島県東広島市鏡山一丁目3番2号
中部電力株式会社
愛知県名古屋市中区東新町1番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
近藤勝彦 津田その子
- 7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第21959号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイノクターン

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らしていないもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は69C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイノクターン」は、対照品種「プラノ」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数少であること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）が斜下であること等で区別性が認められる。対照品種「FIIBIS PEARL」と比較して、草丈がやや低であること、頭花の花柄の長さが短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第21960号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. コメットマリー (コメットマリー)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は一重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2は11週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「コメットマリー」は、対照品種「ビアリッツ」と比較して、舌状花の花筒の長さがかなり長であること、舌状花の先端の形が深い切込みであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

牛田豊文
愛知県愛西市金棒町東101

6 登録品種の育成をした者の氏名

牛田豊文

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第21961号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. エルカペラ (エルカペラ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は4A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エルカペラ」は、対照品種「レミダス」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、花序の形（叢生でない品種に限る）が散房花序型であること等で区別性が認められる。対照品種「レジャンボ」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、花序の形（叢生でない品種に限る）が散房花序型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

牛田豊文
愛知県愛西市金棒町東101

6 登録品種の育成をした者の氏名

牛田豊文

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第21962号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ティーレッド (ティーレッド)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは大、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は170B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ティーレッド」は、対照品種「フィグランド オレンジ」と比較して、たく葉の大きさが大であること、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮城県
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐々木厚 鈴木誠一

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第21963号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. モゼソワレ (モゼソワレ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN74D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「モゼソワレ」は、対照品種「フィグランド ピンク」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、花序の形（叢生でない品種に限る）が深いドーム形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鹿児島県

鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉水竜次 永吉実孝 田中見佳 今給黎征郎

7 出願公表の年月日 平成21年8月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21964号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. Orange up

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は多、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は3A、舌状花の表面の二次色は162A、舌状花の表面の二次色の分布は先端部1/2、舌状花の表面の二次色の型はぼかし、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Orange up」は、対照品種「レルビン」と比較して、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）が多であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が10週間であること等で区別性が認められる。対照品種「ジャジー」と比較して、頭花の花柄の長さがやや長であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）が平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Rural Development Administration

suin-ro, 126th Gwonseon-gu, Suwon, Gyeonggi-do, 441-707, Republic of Korea

6 登録品種の育成をした者の氏名

Lim, Jin-Hee Park, Sang Kun Cho, Hae Ryong Rhee, Hye-Kyung Kim, Mi Seon Kim, Young Jin Shin, Hak ki

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第21965号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 寄の歩 (キアユミ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数に2、頭花の舌状花の主要な形は舌状、頭花の舌状花の二次的な形は管状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は無又は極少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「寄の歩」は、対照品種「笑の杜」と比較して、葉の基部の形が円形であること、頭花の高さ（摘らいたもの）がやや高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

寄能節雄

広島県福山市新市町常1598番地2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

寄能節雄

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第21966号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. GATEC

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN163B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は15D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「GATEC」は、対照品種「フィグランド オレンジ」と比較して、花序の形（叢生でない品種に限る）が深いドーム形であること、舌状花の表面の主な色がN163Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ジャパンアグリバイオ株式会社
東京都中央区入船一丁目5番11号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rob Noodelijck

7 出願公表の年月日 平成22年3月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21967号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. SANTEC

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は2、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形は管状、舌状花の花筒の長さは長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は極狭、舌状花の長さ／幅の比は極高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は157A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜上である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SANTEC」は、対照品種「アナスタシアライム」と比較して、草丈がかなり高であること、舌状花の先端の形が尖るであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ジャパンアグリバイオ株式会社
東京都中央区入船一丁目5番11号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rob Noodelijck

7 出願公表の年月日 平成22年3月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21968号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. PUTEC

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PUTEC」は、対照品種「FICAMPUS」と比較して、草丈がかなり高であること等で区別性が認められる。対照品種「セイエルザ」と比較して、草丈がかなり高であること、舌状花の先端の形が歯状であること等で区別性が認められる。対照品種「フィファルコン」と比較して、草丈がかなり高であること、たく葉の大きさが小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ジャパンアグリバイオ株式会社
東京都中央区入船一丁目5番11号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rob Noodelijk

7 出願公表の年月日 平成22年3月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21969号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DELIAMADEA

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN74D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELIAMADEA」は、対照品種「レファミリー」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや浅であること等で区別性が認められる。対照品種「フィグランド ピンク」と比較して、花序の形（叢生でない品種に限る）が深いドーム形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS, Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成22年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 9 7 0 号 平成 2 4 年 9 月 2 5 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DELITORRENT

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はアネモネ、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや多、頭花の舌状花の形の数 は 1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比は中、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は NN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は極大、花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）は 144B、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）は 157C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は 9 週間、開花習性は 10 月～11 月咲き（秋）である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「DELITORRENT」は、対照品種「フィスワン」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること、葉の基部の形が鈍形であること等で区別性が認められる。対照品種「デックモナ」と比較して、草丈がやや高であること、頭花の花柄の長さが短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS, Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 4 月 2 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21971号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DELIVILLENA

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや大、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや広、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は69C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELIVILLENA」は、対照品種「DELIAMADEA」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや深であること、舌状花の表面の主な色が69Cであること等で区別性が認められる。対照品種「レファミリー」と比較して、たく葉の大きさが小であること、舌状花の表面の主な色が69Cであること等で区別性が認められる。対照品種「FIDESMAIKO」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS, Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成22年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第21972号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DELIEDESSA

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや大、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELIEDESSA」は、対照品種「フィグランδροゼ」と比較して、花序の形（叢生でない品種に限る）が深いドーム形であること、頭花の花柄の長さが長であること等で区別性が認められる。対照品種「DELIVILLENA」と比較して、たく葉の大きさが中であること、葉の裂片縁部の重なりが平行であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS, Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成22年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第21973号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 上大野 (かみお)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は管状、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは中、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比は高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜上である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「白路」は、対照品種「アナスタシア」と比較して、葉の一次欠刻の深さが深であること、頭花の直径（摘らいしていないもの）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「セイクリスタ」と比較して、草丈が中であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が10週間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

本多義昭

滋賀県大津市日吉台2丁目14-1

中村隆典

兵庫県姫路市飾磨区高町1丁目119-14

6 登録品種の育成をした者の氏名

本多義昭 中村隆典

7 出願公表の年月日 平成22年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第21974号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. Ardouarep

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は大、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は71A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Ardouarep」は、対照品種「舞扇」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや浅であること、舌状花の表面の主な色が71Aであること等で区別性が認められる。対照品種「PINK YOIRVINE」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、舌状花の表面の主な色が71Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Mark Boeder

7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第21975号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. Arhorinma

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は大、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は46A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Arhorinma」は、対照品種「レッドセイローザ」と比較して、草丈が低であること、舌状花の表面の主な色が46Aであること等で区別性が認められる。対照品種「Ardouarep」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、舌状花の表面の主な色が46Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Mark Boeder

7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第21976号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. Armacodor

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはかなり短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色はN66D、舌状花の表面の二次色はNN155D、舌状花の表面の二次色の分布2は縁部、舌状花の表面の二次色の型は一様又はほぼ一様、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はかなり大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は淡黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Armacodor」は、対照品種「シリウス」と比較して、草丈がかなり低であること、舌状花の表面の主な色がN66Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Mark Boeder

7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第21977号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. Armacolui

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Armacolui」は、対照品種「DEKSHEPODY」と比較して、花序の形（叢生でない品種に限る）が散房花序型であること、舌状花の縦断面の形状が平であること等で区別性が認められる。対照品種「YELLOW YOIRVINE」と比較して、たく葉の大きさが小であること、舌状花の縦断面の形状が平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Mark Boeder

7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第21978号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. Armadanyel

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり大、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は4A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Armadanyel」は、対照品種「Armacolui」と比較して、たく葉の大きさがかなり大であること、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）が水平であること等で区別性が認められる。対照品種「YELLOW YOIRVINE」と比較して、葉の長さがやや長であること、花盤の開やく時の色（デージー型の品種に限る）が黄橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Mark Boeder

7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第21979号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. Arbinho

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは大、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は大、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は3以上、舌状花の表面の主な色は61A、舌状花の表面の二次色は157D、舌状花の表面の二次色の分布2は縁部、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は155C, 64B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Arbinho」は、対照品種「セアーティストピンク」と比較して、葉の一次欠刻の深さが中であること、舌状花の表面の二次色の型が一樣又はほぼ一樣であること等で区別性が認められる。対照品種「シリウス」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数はやや少であること、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Mark Boeder

7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第21980号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. Armawhidan

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり大、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや大、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Armawhidan」は、対照品種「ヨマンカット」と比較して、たく葉の大きさがかなり大であること、頭花の直径（摘らいしていないもの）がやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Mark Boeder

7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第21981号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. Carlos

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は大、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は169C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は164B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Carlos」は、対照品種「セイヘンリー」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、舌状花の裏面の色が164Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Mark Boeder

7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第21982号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. Dunga

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度

(叢生でない品種に限る)は中、頭花の型は半八重、花盤の型(八重及び露心する八重品種を除く)はデージー、頭花の直径(摘らいしていないもの)はやや小、頭花の舌状花数(一重及び半八重品種に限る)は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き(一重及び半八重品種に限る)は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形(管状でない舌状花)はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性(ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む)は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ(一重及び半八重品種に限る)はやや大、花盤の開やく前の色の区分(デージー型の品種に限る)は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無(デージー型の品種に限る)は無、日長感応グループ(正確な日長制御での栽培)は9週間、開花習性は10月～11月咲き(秋)である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Dunga」は、対照品種「PINK YOIRVINE」と比較して、舌状花の表面の主な色が75Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ゴールドストックダークリネカー」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さがやや長であること、花序の形(叢生でない品種に限る)が散房花序型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Mark Boeder

7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第21983号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. Naldo

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は一重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはやや長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比はやや高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は60A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Naldo」は、対照品種「シャトー風車」と比較して、花序の形（叢生でない品種に限る）が散房花序型であること、舌状花の表面の主な色が60Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Mark Boeder

7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第21984号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. Arberto

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり大、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は一重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比はやや高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は45A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Arberto」は、対照品種「エナジータイム」と比較して、舌状花の花筒の長さがかなり長であること等で区別性が認められる。対照品種「東かざぐるま」と比較して、たく葉の大きさがかなり大であること、舌状花の花筒の長さがかなり長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Mark Boeder

7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第21985号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. エルサンチェ (エルンチェ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや多、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エルサンチェ」は、対照品種「エルサンガ」と比較して、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）がやや多であること、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）が水平であること等で区別性が認められる。対照品種「レジャンボ」と比較して、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）がやや多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

牛田豊文
愛知県愛西市金棒町東101

6 登録品種の育成をした者の氏名

牛田豊文

7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第21986号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. シュードルチェ (シュートルチェ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは大、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比はかなり低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN163A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は163C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シュードルチェ」は、対照品種「セイヘンリー」と比較して、舌状花の裏面の色が163Cであること等で区別性が認められる。対照品種「フィグランド オレンジ」と比較して、舌状花の表面の主な色がN163Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地
山手俊子
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一 山手正則

7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第21987号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DELIIMAZA

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELIIMAZA」は、対照品種「エルジョイス」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さがやや長であること、舌状花の先端の形が深い切込みであること等で区別性が認められる。対照品種「FIIBIS PEARL」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、舌状花の先端の形が深い切込みであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS, Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第21988号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DELICELESTINE

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは大、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや広、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は69D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELICELESTINE」は、対照品種「セイルフラン」と比較して、葉の基部の形が鈍形であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い内巻きであること等で区別性が認められる。対照品種「パールセイローザ」と比較して、たく葉の大きさが大であること、頭花の花柄の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS, Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第21989号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DELIDIANTHA

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は69D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELIDIANTHA」は、対照品種「カーネレミー」と比較して、葉の長さ／幅が高であること、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）がやや密であること等で区別性が認められる。対照品種「ユーロピンク」と比較して、たく葉の大きさが小であること、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）がやや密であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS, Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第21990号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DELIFORTUNE

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2は11週間、開花習性は10月～11月咲き

（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELIFORTUNE」は、対照品種「ユーロ」と比較して、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）が中であること、舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「CHAMPAGNE」と比較して、たく葉の大きさが小であること、葉の基部の形が鈍形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS, Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第21991号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DELILIMONADA

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELILIMONADA」は、対照品種「モゼキキ」と比較して、花盤の開やく時の色（デージー型の品種に限る）が淡黄であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が8.5週間であること等で区別性が認められる。対照品種「レミダス」と比較して、舌状花の先端の形が突起状であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が8.5週間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS, Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第21992号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DELIPANTHEON

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は46A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はやや多、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELIPANTHEON」は、対照品種「デリシエンナ」と比較して、頭花の高さ（摘らいたもの）が高であること、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）がやや密であること等で区別性が認められる。対照品種「フィロリポップレッド」と比較して、葉の基部の形が平形であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が外巻きであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS, Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第21993号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DELIPRALINE

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは大、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は露心する八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN74C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELIPRALINE」は、対照品種「フィロリポップ」と比較して、葉の基部の形が平形であること、舌状花の表面の主な色がN74Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS, Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第21994号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ロイヤル黄馬 (ロイヤルウマ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）はやや大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはかなり長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は155A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はかなり多、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ロイヤル黄馬」は、対照品種「南風の明星」と比較して、葉の基部の形が鈍形であること、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）がかなり多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鈴木幹雄

愛知県幡豆郡一色町大字大塚字竹荒井57

6 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木幹雄

7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第21995号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. モゼビューティ (モゼビューティ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比はかなり低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は73D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「モゼビューティ」は、対照品種「FIDESMAIKO」と比較して、たく葉の大きさが中であること、葉の裂片縁部の重なりが接するのであること等で区別性が認められる。対照品種「DELIVILLENA」と比較して、たく葉の大きさが中であること、舌状花の縦断面の形状が平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鹿児島県

鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

林亜紀 永吉実孝 田中見佳 吉水竜次

7 出願公表の年月日 平成22年9月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第21996号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. きゅらキララ (キュラキラ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや多、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「きゅらキララ」は、対照品種「エルサンチェ」と比較して、草丈が高であること、葉の周縁の二次欠刻の深さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「モゼキキ」と比較して、葉の一次欠刻の深さが中であること、舌状花の先端の形が歯状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鹿児島県
鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

渡辺剛史 後藤英嗣 橋口健一郎

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第21997号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DEKCATALINA

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は大、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DEKCATALINA」は、対照品種「DELICELESTINE」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、舌状花の表面の主な色が75Cであること等で区別性が認められる。対照品種「フィグランδροゼ」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数が少であること、花序の形（叢生でない品種に限る）が深いドーム形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ジャパンアグリバイオ株式会社
東京都中央区入船一丁目5番11号

6 登録品種の育成をした者の氏名

C. W. Dekker

7 出願公表の年月日 平成22年9月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第21998号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. Feeling Green Dark

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN144C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Feeling Green Dark」は、対照品種「フィーリング グリーン」と比較して、舌状花の表面の主な色がN144Cであること等で区別性が認められる。対照品種「フロッキー」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さが浅であること、舌状花の表面の主な色がN144Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Fides B. V.

Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jos Kester

7 出願公表の年月日 平成22年9月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第21999号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. FISCOUNTRY

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は144B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FISCOUNTRY」は、対照品種「Feeling Green Dark」と比較して、葉の長さがやや短であること、葉の基部の形が平形であること等で区別性が認められる。対照品種「フロッキー」と比較して、葉の基部の形が平形であること、舌状花の表面の主な色が144Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Fides B. V.

Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jos Kester

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22000号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. TSH17-2-05-10

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は69C、舌状花の表面の二次色はNN155D、舌状花の表面の二次色の分布は基部1/4、舌状花の表面の二次色の型は一様又はほぼ一様、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TSH17-2-05-10」は、対照品種「福野ミレニウムピンク」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、葉の一次欠刻の深さが深であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大畑庄司 久保田篤

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22001号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 太陽のみわ (タイヨノミワ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや大、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形は舌状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「太陽のみわ」は、対照品種「レイエス」と比較して、草丈が中であること、葉の一次欠刻の深さが深であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大畑庄司 久保田篤

7 出願公表の年月日 平成22年11月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第22002号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 太陽の麗炎 (タイヨウリエン)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや多、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形は管状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはやや長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比はやや高、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は4C、舌状花の表面の二次色は181C、舌状花の表面の二次色の分布は基部3/4、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「太陽の麗炎」は、対照品種「コイアルファ」と比較して、頭花の舌状花の主要な形がさじ状であること、舌状花の花筒の長さがやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「色かざぐるま」と比較して、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）がやや多であること、舌状花の表面の主な色が4Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

竹島一夫

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22003号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 太陽の橙炎 (タイヨウホウエン)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度

(叢生でない品種に限る)は中、頭花の型は半八重、花盤の型(八重及び露心する八重品種を除く)はデージー、頭花の直径(摘らいしていないもの)はやや小、頭花の舌状花数(一重及び半八重品種に限る)はやや多、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、舌状花の基部の向き(一重及び半八重品種に限る)は斜上、舌状花の花筒の長さは中、舌状花の最大幅部の横断面の形(管状でない舌状花)はやや凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは中、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は167B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性(ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む)は著しく異なる、舌状花の裏面の色は10B、花盤の頭花に対する直径の大きさ(一重及び半八重品種に限る)は中、花盤の開やく前の色の区分(デージー型の品種に限る)は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無(デージー型の品種に限る)は無、日長感応グループ(正確な日長制御での栽培)は10週間、開花習性は10月～11月咲き(秋)である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「太陽の橙炎」は、対照品種「ゴールドエンビュー」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数が多いこと、頭花の舌状花数(一重及び半八重品種に限る)がやや多いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大畑庄司 久保田篤

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22004号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 太陽の花麗 (タイヨウハナウラ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは長、葉の幅は中、葉の長さ／幅は高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は73A、舌状花の表面の二次色はNN155C、舌状花の表面の二次色の分布は先端部1/4、舌状花の表面の二次色の型はぼかし、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「太陽の花麗」は、対照品種「フィグランド ピンク」と比較して、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）が斜上であること、舌状花の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大畑庄司 久保田篤

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22005号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. TCH14-31-6

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは大、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は7B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロータ形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TCH14-31-6」は、対照品種「太陽の金華」と比較して、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）が中であること、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ジャジー」と比較して、葉の一次欠刻の深さが深であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）が平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

久保田篤 宮里友和

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22006号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DEKMAKI

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は多、頭花の舌状花の形の数3以上、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり長、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は極狭、舌状花の長さ／幅の比はやや高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DEKMAKI」は、対照品種「精やわら」と比較して、草丈が高であること、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ジャパンアグリバイオ株式会社
東京都中央区入船一丁目5番11号

6 登録品種の育成をした者の氏名

C. W. Dekker

7 出願公表の年月日 平成23年1月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第22007号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DEKAYGO

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはかなり短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は極多、頭花の舌状花の形の数値は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は167D、舌状花の表面の二次色は9C、舌状花の表面の二次色の分布は基部1/4、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DEKAYGO」は、対照品種「デックジュニーオレンジ」と比較して、頭花の型が半八重であること、舌状花の先端の形が深い切込みであること等で区別性が認められる。対照品種「イワセオレンジ」と比較して、頭花の型が半八重であること、舌状花の先端の形が深い切込みであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ジャパンアグリバイオ株式会社
東京都中央区入船一丁目5番11号

6 登録品種の育成をした者の氏名

C. W. Dekker

7 出願公表の年月日 平成23年1月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第22008号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 正陽 黄 (セイヨウキ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2は11週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は多、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「正陽 黄」は、対照品種「秀芳の歩」と比較して、草丈がやや高であること、たく葉の大きさがかなり小であること等で区別性が認められる。対照品種「寄の歩」と比較して、草丈がやや高であること、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）がかなり密であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社美里花き流通グループ
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通8-9-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

KHOR CHIN CHARK

7 出願公表の年月日 平成23年1月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第22009号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 正陽 白 (セイヨウ シロ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比はやや高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はやや多、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「正陽 白」は、対照品種「精の酒」と比較して、頭花の高さ（摘らいしたもの）がかなり高であること、舌状花の幅がやや狭であること等で区別性が認められる。対照品種「新神」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）がかなり密であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社美里花き流通グループ
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通8-9-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

KHOR CHIN CHARK

7 出願公表の年月日 平成23年1月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第22010号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DELIAMOROSSA

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数 は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELIAMOROSSA」は、対照品種「DELICELESTINE」と比較して、舌状花の表面の主な色が75Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ゴールドストックダークリネカー」と比較して、葉の基部の形が鈍形であること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）がやや円錐状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS, Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22011号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DELICINZIA

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは大、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は大、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELICINZIA」は、対照品種「モゼキキ」と比較して、たく葉の大きさが大であること、葉の一次欠刻の深さがやや浅であること等で区別性が認められる。対照品種「レジャンボ」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS, Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22012号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DELIBALTICA YELLOW

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2は12週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELIBALTICA YELLOW」は、対照品種「TUVALUSUNNY」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、葉の基部の形が鈍形であること等で区別性が認められる。対照品種「ユーロベル イエロー」と比較して、頭花の直径（摘らいしていないもの）が大であること、舌状花の先端の形が丸であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS, Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22013号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DELICIVETTA

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は144D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELICIVETTA」は、対照品種「フロッキー」と比較して、葉の基部の形が平形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS, Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22014号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 寄の星 (キノシ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形は舌状、頭花の舌状花の二次的な形は船底状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「寄の星」は、対照品種「精興の昇」と比較して、頭花の高さ（摘らいしたもの）が高であること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）が斜下であること等で区別性が認められる。対照品種「秀芳の秋」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

寄能節雄

広島県福山市新市町常1598番地2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

寄能節雄

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第22015号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 寄の月 (キノヅキ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はやや少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「寄の月」は、対照品種「寄の星」と比較して、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が平（巻かない）であること、舌状花の縦断面の形状が内曲であること等で区別性が認められる。対照品種「精興の昇」と比較して、頭花の高さ（摘らいしたもの）がやや高であること、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）がやや少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

寄能節雄

広島県福山市新市町常1598番地2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

寄能節雄

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第22016号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. 青雫 (アオシズク)

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は無、伸育型は有限、分枝の数は少、草姿は直立～斜上、茎の毛じの色は白、茎の長さは極短、茎の節数は少、側小葉の形は鋭先卵形、花の色は白、最下着きょう節位の高さは極低、裂きょうの難易は中、熟さやの色の濃淡は濃、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）はやや小、子実の形は球、種皮の単色複色の別は単色、種皮の地色は緑、子実のへその色は淡褐、子実の子葉の色は緑、開花始期はかなり早、成熟期は早である

出願品種「青雫」は、対照品種「サヤコマチ」と比較して、種皮の地色が緑であること、子実の子葉の色が緑であること等で区別性が認められる。対照品種「福鈴」と比較して、種皮の地色が緑であること、子実の子葉の色が緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条5丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大橋真信 本多範久

7 出願公表の年月日 平成22年3月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第22017号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. フクミノリ (フミノリ)

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は有、伸育型は有限、分枝の数は中、茎の毛じの色は白、茎の長さはやや短、茎の節数は中、側小葉の形は卵形、花の色は紫、最下着きょう節位の高さは中、裂きょうの難易は中、熟さやの色の濃淡は淡、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）はやや大、子実の形は偏球、種皮の色数は1色、種皮の地色は黄白、子実のへその色は淡褐、子実の子葉の色は黄、開花始期は晩、成熟期は晩、生態型は秋大豆型、粗タンパク含有率は高である。

出願品種「フクミノリ」は、対照品種「フクユタカ」と比較して、ハスモンヨトウ抵抗性（抗生性）が中であること、ハスモンヨトウ抵抗性（非選好性）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋幹 中澤芳則 松永亮一 高橋将一 大木信彦 小松邦彦

7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第22018号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. すずかれん (スズカレン)

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は有、伸育型は有限、分枝の数はやや多、茎の毛じの色は褐、茎の長さはやや短、茎の節数は中、側小葉の形は卵形、花の色は紫、裂きよりの難易は難、熟さやの色の濃淡は淡、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）はかなり小、子実の形は球、種皮の色数は1色、種皮の地色は黄白、子実のへその色は黄、子実の子葉の色は黄、開花始期は晩、成熟期はやや晩、生態型は秋大豆型、粗タンパク含有率は高である。

出願品種「すずかれん」は、対照品種「すずおとめ」と比較して、ハスモンヨトウ抵抗性（非選好性）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「フクユタカ」と比較して、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）がかなり小であること、子実のへその色が黄であること、ハスモンヨトウ抵抗性（抗生性）がやや強であること、ハスモンヨトウ抵抗性（非選好性）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋幹 中澤芳則 松永亮一 高橋将一 大木信彦 小松邦彦 羽鹿牧太

7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第22019号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. ゲチョク1 (ゲチョク1)

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は有、伸育型は有限、分枝の数はやや少、草姿は直立～斜上、茎の毛じの色は褐、茎の長さはかなり短、茎の節数はやや少、側小葉の形は鋭先卵形、花の色は紫、最下着きょう節位の高さはかなり低、裂きょうの難易は難、熟さやの色の濃淡はやや淡、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）は小、子実の形は偏楕円体、種皮の単色複色の別は単色、種皮の地色は黒、子実のへその色は黒、子実の子葉の色は緑、開花始期はやや早、成熟期は中である。

出願品種「ゲチョク1」は、対照品種「柳川黒小粒」と比較して、子実の子葉の色が緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Industry-Academic Cooperation Foundation Gyeongsang National University
900 Gaza-dong, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jongil Chung

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22020号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. ゲチョク2 (ゲチョク2)

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は有、伸育型は有限、分枝の数はやや少、草姿は直立～斜上、茎の毛じの色は褐、茎の長さはやや短、茎の節数は中、側小葉の形は鋭先卵形、花の色は紫、最下着きょう節位の高さは極低、裂きょうの難易は難、熟さやの色の濃淡は中、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）は極小、子実の形は偏球、種皮の単色複色の別は単色、種皮の地色は黄白、子実のへその色は淡黒、子実の子葉の色は黄、開花始期はかなり早、成熟期は中である。

出願品種「ゲチョク2」は、対照品種「フクユタカ」と比較して、茎の毛じの色が褐であること、子実のへその色が淡黒であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Industry-Academic Cooperation Foundation Gyeongsang National University
900 Gaza-dong, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jongil Chung

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22021号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. 雪美咲 (ユキミサキ)

3 登録品種の特性の概要

草型は1本立ち、草丈は中、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は中、葉形は中間、下葉のきょ歯は少、下葉の欠刻は浅、上部葉の長さは中、上部葉の幅は中、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数はやや多、葉色は緑、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは中、花首部の太さはやや細、花首の長さは中、花穂長は中、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は中、花間長はやや短、花の直径はやや大、花色はNN155D、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長は中、一重花の花弁長は中、八重花の花弁幅は中、一重花の花弁幅は中、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状のしわの程度は中、花弁の数はやや多、小花柄長はやや短、小花柄の着生角度は斜上、花数は中、開花期は早、八重率は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「雪美咲」は、対照品種「ホワイ ト アイアン」と比較して、はい軸の色が淡緑であること、葉面の凹凸が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

西郷昌太郎
千葉県館山市小沼16番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

西郷昌太郎

7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第22022号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. ステッキチェリー (ステッキェリー)

3 登録品種の特性の概要

草型は1本立ち、草丈は低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、葉形は中間、下葉のきょ歯は少、下葉の欠刻は浅、上部葉の長さは短、上部葉の幅は中、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数はやや多、葉色はやや濃緑、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは易、花首部の太さは太、花首の長さは短、花穂長は中、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は晩、花間長は短、花の直径は中、花色は69D、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長はやや短、一重花の花弁長はやや短、八重花の花弁幅はやや狭、一重花の花弁幅は中、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状のしわの程度は中、花弁の数はやや多、小花柄長はやや短、小花柄の着生角度は斜上、花数は中、開花期は早、八重率はやや低である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ステッキチェリー」は、対照品種「朝波」と比較して、葉面の凹凸が中であること、葉数がやや多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ムラカミシード
茨城県笠間市大田町341番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

木下博文

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22023号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oncidium Group TY1111

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、草姿は斜上、ぎ球茎の正面の形は卵形、ぎ球茎の平面の形は楕円形、ぎ球茎の溝（稜）の有無は有、ぎ球茎の高さは76～100mm、ぎ球茎の長径は31～45mm、葉の正面の形は広線形、葉の横断面の形はⅢ型、葉の向きは斜上、葉の下垂性は強、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉表面の色は緑、全葉数は4枚、花序の型は複総状、花序の分枝回数は1回、無限花序の性質の強さは弱、花序の長さはやや長、花序の幅はやや広、花序の花数は多、花茎の抽出方向は斜上、花茎の強さは中、花型は部分抱え平、距の有無は無、花の横径は小、花の縦径は小、ドーサルセパルの正面の形は長楕円状披針形、ドーサルセパルの先端の形は鋭形、ドーサルセパルのねじれの程度は無、ドーサルセパルの長さは短、ドーサルセパルの幅は狭、ドーサルセパルの模様は虎斑、ドーサルセパルの地色は6A、ドーサルセパルの模様の色は12A、ラテラルセパルの正面の形は披針形、ラテラルセパルの先端の形は不等鈍形、ラテラルセパルのねじれの程度は無、ラテラルセパルの長さは短、ラテラルセパルの幅は狭、ラテラルセパルの模様は虎斑、ラテラルセパルの地色は6A、ラテラルセパルの模様の色は12A、ペタルの正面の形は広卵形、ペタルの先端の形は凹形、ペタルのねじれの有無は無、ペタルの周縁の波打ちは有、ペタルの模様はぼた斑、ペタルの地色は6A、ペタルの模様の色は12A、リップの正面の形はⅦ型、リップの先端の形は銀杏形、リップの側裂片の大きさはかなり小、リップの長さはやや短、リップの幅は中、リップの模様は単色、リップの地色は6A、花の香りは無、開花期は秋である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TY1111」は、対照品種「メイフェアトリニティ」と比較して、ペタルの幅が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ハニードロップ」と比較して、ペタルの正面の形が広卵形であること、ペタルの幅が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

吉村利巳
福岡県糸島市志摩稻留417番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉村利巳

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第22024号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. たちすずか (タスヅカ)

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、出穂期（50%出穂）は晩、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）はかなり長、主軸の長さは短、穂数はやや少、芒の分布は先端のみ、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は傾く、穂型は紡錘状、成熟期はやや晩、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、穎のフェノール反応は無、玄米の長さはやや短、玄米の幅はやや広、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、柱頭の色は白、稈の太さはやや太、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さは極短、穂の抽出度は一部抽出、胚乳の型は粳、穂発芽性は難、耐倒伏性は極強、脱粒性は難、白葉枯病ほ場抵抗性は極強、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型（+）である。

出願品種「たちすずか」は、対照品種「クサノホシ」と比較して、主軸の長さが短であること、しま葉枯病抵抗性品種群別が日本水稻型（+）であること等で区別性が認められる。対照品種「リーフスター」と比較して、主軸の長さが短であること、玄米の長さがやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

独立行政法人国際農林水産業研究センター

茨城県つくば市大わし1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

飯田修一 出田収 松下景 春原嘉弘 前田英郎 田村泰章

7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第22025号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 壽限無 (シユゲム)

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は水平、出穂期（50%出穂）はやや晩、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）は中、主軸の長さはやや短、穂数はやや少、外穎の毛茸の多少（小穂）は少、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期はやや晩、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、粳1000粒重は大、穎のフェノール反応は無、玄米の長さはやや長、玄米の幅はやや広、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度はやや濃緑、柱頭の色は白、稈の太さは中、芒は無、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、耐倒伏性は強、脱粒性は難、穂いもちほ場抵抗性は中、葉いもちほ場抵抗性は中、玄米の心白の発現（酒米）は40%以上である。

出願品種「壽限無」は、対照品種「山田錦」と比較して、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「レイホウ」と比較して、粳1000粒重が大であること、玄米の心白の発現（酒米）が40%以上であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

川村範光

福岡県三潆郡大木町上木佐木717-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

川村範光

7 出願公表の年月日 平成22年7月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第22026号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 夢吟香 (ユメギンカ)

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、出穂期（50%出穂）は極晩、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）はやや長、主軸の長さはやや長、穂数はやや少、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期は極晩、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、粳1000粒重は大、穎のフェノール反応は無、玄米の長さはやや長、玄米の幅はやや広、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、柱頭の色は白、稈の太さはやや太、芒は無、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、穂発芽性は中、耐倒伏性は中、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPii、葉いもち病抵抗性は弱、白葉枯病ほ場抵抗性は中、しま葉枯病抵抗性品種群別は外国稲型（St2i）、玄米の心白の発現（酒米）は40%以上である。

出願品種「夢吟香」は、対照品種「山田錦」と比較して、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）がやや長であること、しま葉枯病抵抗性品種群別が外国稲型（St2i）であること等で区別性が認められる。対照品種「若水」と比較して、出穂期（50%出穂）が極晩であること、芒が無であること、しま葉枯病抵抗性品種群別が外国稲型（St2i）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

愛知県

愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

工藤悟 加藤満 杉浦直樹 辻孝子 中村充 城田雅毅 加藤恭宏 船生岳人 加藤博美 澤田恭彦 鈴木敏夫 釋一郎 井上正勝 山本晃司 伊藤彰敏

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第22027号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Trifolium pratense L. リョクユウ (リョクユウ)

3 登録品種の特性の概要

倍数性は二倍体、は種当年の草高はやや高、春の草高は中、生育型は2型、茎の太さはやや細、茎の節数はやや多、茎の毛の密度は中、小葉の形は卵形、小葉の長さはやや長、小葉の幅は中、は種当年の葉の色は緑、葉の緑色の濃淡はやや淡、葉斑の白さの強弱は中、開花期は早、菌核病抵抗性は強である。

出願品種「リョクユウ」は、対照品種「ナツユウ」と比較して、葉斑の白さの強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ホクセキ」と比較して、生育型が2型であること、葉斑の白さの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

地方独立行政法人北海道立総合研究機構

北海道札幌市北区北十九条西11丁目1番地9

6 登録品種の育成をした者の氏名

奥村健治 磯部祥子 我有満 廣井清貞 山口秀和 内山和宏 澤井晃 高田寛之

松村哲夫 澤田嘉昭 山川政明 藤井弘毅 佐藤尚親 林拓 牧野司 出口健三郎

7 出願公表の年月日 平成23年1月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第22028号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vanda Jones SPCDW0901

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、草姿は縦長、葉の正面の形は線、葉の幅は21～25mm、葉の長さは20.1～30cm、葉の表面の色は暗黄緑、花序の型は総状、花序の幅は10.1～20cm、花序の長さは10.1～15cm、花序の花数は6～10、花茎の長さは30.1～40cm、花茎の抽出方向は斜上、花型は平、距の有無は有、花の横径は10.1～12.5cm、花の縦径は10.1～12.5cm、花色は赤紫、ドーサルセパルの正面の形は卵形、ドーサルセパルの先端の形は凹形、ドーサルセパルの幅は41～50mm、ドーサルセパルの長さは51～60mm、ドーサルセパルの模様は網斑、ドーサルセパルの地色は84D、ドーサルセパルの模様の色はN80A、ラテラルセパルの正面の形は円形、ラテラルセパルの幅は56～65mm、ラテラルセパルの長さは61～70mm、ラテラルセパルの模様は網斑、ラテラルセパルの地色は84D、ラテラルセパルの模様の色はN80A、ペタルの正面の形は円形、ペタルの幅は46～55mm、ペタルの長さは51～60mm、ペタルの模様は網斑、ペタルの地色は84D、ペタルの模様の色はN80A、リップの中央裂片の正面の形は花瓶形、リップの突起又は稜は有、リップの中央裂片の幅は11～15mm、リップの中央裂片の長さは16～20mm、リップの中央裂片の模様は無、リップの中央裂片の地色はN79C、リップの側裂片の地色は84C、リップの距の程度は1/2以下、開花期は夏である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SPCDW0901」は、対照品種「Blue Magic」と比較して、ドーサルセパルの模様の色がN80Aであること、リップの中央裂片の地色がN79Cであること等で区別性が認められる。対照品種「SPCDW0902」と比較して、ドーサルセパルの地色が84Dであること、リップの中央裂片の地色がN79Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Heike Suphachadiwong

29/5 Noo 11, Thanon Robb Ang, Bangphra, Chonburi 20210, Thailand

6 登録品種の育成をした者の氏名

Thumrong Suphachadiwong

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第22029号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Viola L. カミホン CFT (カミホン CFT)

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、株の高さは低、株の広がりの中、分枝性は多、葉の全形は卵形、葉先の形は鈍形、葉の基部の形は鋭形、葉縁の形は浅裂、葉の長さは短、葉の幅は狭、斑の有無は無、葉柄長は短、たく葉の長さは短、花柄の長さは短、花柄の太さは細、花型は縦長方形、花の向きは横、花の縦径は極小、花の横径は極小、花卉数は一重、花色は複色、上弁の形は倒卵形、上弁の大きさは非常に小、上弁の単・複色は単色、上弁の地色は86D、上弁のブロッチの大きさは無、側弁の形は倒卵形、側弁の大きさは非常に小、側弁の単・複色は複色（2色）、側弁の地色は90D、側弁のブロッチの大きさは無、側弁の条線の色はN92B、唇弁の形はその他（逆三角形）、唇弁の大きさは非常に小、唇弁の単・複色は複色（2色）、唇弁の地色は90D、唇弁のブロッチの色はN92D、唇弁のブロッチの大きさは小、唇弁の条線の色はN92D、目の色は13A、目の大きさは小、弁の厚さは薄、開花数は多、香りの強さは無、開花の早晩は極早生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミホン CFT」は、対照品種「バレンティナー レモン2ブルー」と比較して、唇弁の地色が90Dであること、唇弁のブロッチの大きさが小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1
ハクサンインターナショナル株式会社
愛知県長久手市山越606番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第22030号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Viola L. カミホン LMP (カミホン LMP)

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、株の高さは低、株の広がりの中、分枝性は多、葉の全形は卵形、葉先の形は鈍形、葉の基部の形は鈍形、葉縁の形は浅裂、葉の長さは短、葉の幅は狭、斑の有無は無、葉柄長は中、たく葉の長さは短、花柄の長さは短、花柄の太さは細、花型は逆三角形、花の向きは横、花の縦径は極小、花の横径は極小、花弁数は一重、花色は複色、上弁の形は倒卵形、上弁の大きさは非常に小、上弁の単・複色は複色（2色）、上弁の地色は91B、上弁のブロッチの色は83B、上弁のブロッチの大きさは小、側弁の形は倒卵形、側弁の大きさは非常に小、側弁の単・複色は複色（3色以上）、側弁の地色は91B、側弁のブロッチの大きさは無、側弁の条線の色はN92C、唇弁の形はその他（逆三角形）、唇弁の大きさは非常に小、唇弁の単・複色は複色（3色以上）、唇弁の地色は91B、唇弁のブロッチの大きさは無、唇弁の条線の色はN92D、目の色は13A、目の大きさは中、弁の厚さは薄、開花数はやや多、香りの強さは無、開花の早晩は極早生である。
（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミホン LMP」は、対照品種「カミホン CFT」と比較して、上弁のブロッチの大きさが小であること、唇弁のブロッチの大きさが無であること等で区別性が認められる。対照品種「バレンティナー レモン2ブルー」と比較して、上弁のブロッチの大きさが小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1
ハクサンインターナショナル株式会社
愛知県長久手市山越606番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第22031号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Viola L. カミホン MFU (カミホン MFU)

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、株の高さは低、株の広がり狭、分枝性多、葉の全形は卵形、葉先の形は鈍形、葉の基部の形は切形、葉縁の形は浅裂、葉の長さは短、葉の幅は狭、斑の有無は無、葉柄長は中、たく葉の長さは短、花柄の長さは短、花柄の太さは細、花型は逆三角形、花の向きは横、花の縦径は極小、花の横径は極小、花弁数は一重、花色は複色、上弁の形は倒卵形、上弁の大きさは非常に小、上弁の単・複色は複色（2色）、上弁の地色は3C、上弁のブロッチの色はN82A、上弁のブロッチの大きさは大、側弁の形は倒卵形、側弁の大きさは非常に小、側弁の単・複色は複色（2色）、側弁の地色は6B、側弁のブロッチの大きさは無、側弁の条線の色はN186A、唇弁の形はその他（逆三角形）、唇弁の大きさは非常に小、唇弁の単・複色は複色（2色）、唇弁の地色は12A、唇弁のブロッチの大きさは無、唇弁の条線の色はN186A、目の色は15A、目の大きさは極小、弁の厚さは中、開花数はやや多、香りの強さは強、開花の早晩は極早生である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミホン MFU」は、対照品種「バレンティナー レモン2ライラック シェード」と比較して、上弁の地色が3Cであること、唇弁のブロッチの大きさが無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1
ハクサンインターナショナル株式会社
愛知県長久手市山越606番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第22032号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Viola L. カミホン MTB (カミホン MTB)

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、株の高さは低、株の広がりの中、分枝性は多、葉の全形は卵形、葉先の形は鈍形、葉の基部の形は切形、葉縁の形は浅裂、葉の長さは短、葉の幅は狭、斑の有無は無、葉柄長は中、たく葉の長さは短、花柄の長さは短、花柄の太さは細、花型は逆三角形、花の向きは斜下、花の縦径は極小、花の横径は極小、花弁数は一重、花色は複色、上弁の形は倒卵形、上弁の大きさは非常に小、上弁の単・複色は複色（3色以上）、上弁の地色は156A、上弁のブロッチの大きさは無、上弁の覆輪の色はN81A、側弁の形は倒卵形、側弁の大きさは非常に小、側弁の単・複色は複色（2色）、側弁の地色は6A、側弁のブロッチの大きさは無、側弁の条線の色はN92A、唇弁の形はその他（逆三角形）、唇弁の大きさは非常に小、唇弁の単・複色は複色（2色）、唇弁の地色は9A、唇弁のブロッチの大きさは無、唇弁の条線の色はN92A、目の色は17A、目の大きさは小、弁の厚さは中、開花数は多、香りの強さは無、開花の早晩は極早生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミホン MTB」は、対照品種「カミホン MFU」と比較して、上弁の地色が156Aであること、上弁のブロッチの大きさが無であること等で区別性が認められる。対照品種「バレンティーナ レモン2ライラックシェード」と比較して、上弁の地色が156Aであること、唇弁のブロッチの大きさが無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1
ハクサンインターナショナル株式会社
愛知県長久手市山越606番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第22033号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Viola L. カミホン CTT (カミホン CTT)

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、株の高さは低、株の広がりの中、分枝性は多、葉の全形は卵形、葉先の形は鈍形、葉の基部の形は鋭形、葉縁の形は浅裂、葉の長さは短、葉の幅は狭、斑の有無は無、葉柄長は短、たく葉の長さは短、花柄の長さは短、花柄の太さは細、花型は逆三角形、花の向きは横、花の縦径は極小、花の横径は極小、花弁数は一重、花色は複色、上弁の形は倒卵形、上弁の大きさは非常に小、上弁の単・複色は複色（2色）、上弁の地色はN79B、上弁のブロッチの大きさは無、上弁の覆輪の色は85C、側弁の形は倒卵形、側弁の大きさは非常に小、側弁の単・複色は複色（2色）、側弁の地色はN79A、側弁のブロッチの大きさは無、側弁の条線の色はN92A、唇弁の形はその他（ハート形）、唇弁の大きさは非常に小、唇弁の単・複色は複色（2色）、唇弁の地色はN79A、唇弁のブロッチの色はN92A、唇弁のブロッチの大きさは小、唇弁の条線の色はN92A、目の色は15A、目の大きさは小、弁の厚さは中、開花数は多、香りの強さは無、開花の早晩は極早生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミホン CTT」は、対照品種「エンジェル ローズピコティ」と比較して、葉の全形が卵形であること、葉の基部の形が鋭形であること、花型が逆三角形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1
ハクサンインターナショナル株式会社
愛知県長久手市山越606番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 平成23年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第22034号 平成24年9月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Viola L. カミホン TRMS (カミホン TRMS)

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、株の高さは低、株の広がりの中、分枝性は多、葉の全形は卵形、葉先の形は鈍形、葉の基部の形は鈍形、葉縁の形は浅裂、葉の長さは短、葉の幅は狭、斑の有無は無、葉柄長は中、たく葉の長さは短、花柄の長さは短、花柄の太さは細、花型は逆三角形、花の向きは横、花の縦径は極小、花の横径は極小、花卉数は一重、花色は複色、上弁の形は倒卵形、上弁の大きさは非常に小、上弁の単・複色は複色（2色）、上弁の地色は90B、上弁のブロッチの色は86A、上弁のブロッチの大きさは小、側弁の形は倒卵形、側弁の大きさは非常に小、側弁の単・複色は複色（3色以上）、側弁の地色は90B、側弁のブロッチの大きさは無、側弁の条線の色は200A、唇弁の形はその他（逆三角形）、唇弁の大きさは非常に小、唇弁の単・複色は複色（3色以上）、唇弁の地色は6A、唇弁のブロッチの色は187A、唇弁のブロッチの大きさは小、唇弁の覆輪の色は86A、唇弁の条線の色は200A、目の色は13A、目の大きさは小、弁の厚さは中、開花数は極多、香りの強さは無、開花の早晩は極早生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミホン TRMS」は、対照品種「カミホン MTB」と比較して、葉の基部の形が鈍形であること、上弁の地色が90Bであること等で区別性が認められる。対照品種「バレンティナー レモン2ライラックシェード」と比較して、側弁の地色が90Bであること、唇弁の覆輪の色が86Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1
ハクサンインターナショナル株式会社
愛知県長久手市山越606番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 平成23年4月13日