

1 品種登録の番号及び年月日 第22746号 平成25年11月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum fruticosum (Ledeb.) Ohashi et Yonekura x *C. x morifolium*
Ramat. アロママ13号 (アロマ13ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはかなり短、葉の幅は狭、葉の長さ/幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の周縁淡色部の顕著さ(*Chrysanthemum* × *morifolium*品種を除く)は無又は極弱、葉の裏面の毛の粗密(*Chrysanthemum* × *morifolium*品種を除く)は弱、葉の裏面の色(*Chrysanthemum* × *morifolium*品種を除く)は137C、花序の一次分枝の着生角度(叢生でない品種に限る)は中、頭花の型は半八重、花盤の型(八重及び露心する八重品種を除く)はデイジー、頭花の直径(摘らいしていないもの)は極小、頭花の舌状花数(一重及び半八重品種に限る)はかなり少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き(一重及び半八重品種に限る)は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形(管状でない舌状花)は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ/幅は低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面の二次色は151C、舌状花の表面の二次色の分布は基部、舌状花の表面の二次色の型は一様又はほぼ一様、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性(ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む)は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C;151C、花盤の頭花に対する直径の大きさ(一重及び半八重品種に限る)はやや大、花盤の開やく前の色の区分(デイジー型の品種に限る)は黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無(デイジー型の品種に限る)は無、日長感応グループ(正確な日長制御での栽培)は8週間、開花習性は10月~11月咲き(秋)である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「アロママ13号」は、対照品種「アロママ14号」と比較して、頭花の型が半八重であること、舌状花の基部の向き(一重及び半八重品種に限る)が斜上であること等で区別性が認められる。対照品種「アロママ5号」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さが長であること、舌状花の表面の主な色がNN155Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人広島大学
広島県東広島市鏡山一丁目3番2号
中部電力株式会社
愛知県名古屋市東区東新町1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

近藤勝彦 津田その子

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第22747号 平成25年11月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum fruticosum (Ledeb.) Ohashi et Yonekura x *C. x morifolium*
Ramat. アロママ14号 (アロマ14コウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはかなり短、葉の幅は狭、葉の長さ/幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはかなり長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (*Chrysanthemum x morifolium* 品種を除く) は無又は極弱、葉の裏面の毛の粗密 (*Chrysanthemum x morifolium* 品種を除く) は弱、葉の裏面の色 (*Chrysanthemum x morifolium* 品種を除く) は147B、花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る) は中、頭花の型は一重、花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く) はデージー、頭花の直径 (摘らいしていないもの) はかなり小、頭花の舌状花数 (一重及び半八重品種に限る) は極少、頭花の舌状花の形の数 は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き (一重及び半八重品種に限る) は水平、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形 (管状でない舌状花) は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ/幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性 (ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む) は類似する、舌状花の裏面の色はNN155B、花盤の頭花に対する直径の大きさ (一重及び半八重品種に限る) はやや大、花盤の開やく前の色の区分 (デージー型の品種に限る) は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無 (デージー型の品種に限る) は無、日長感応グループ (正確な日長制御での栽培) は8.5週間、開花習性は10月~11月咲き (秋) である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「アロママ14号」は、対照品種「エレベビースマイル」と比較して、葉の一次欠刻の深さがかなり深いこと、頭花の型が一重であること、頭花の舌状花数 (一重及び半八重品種に限る) が極少であること等で区別性が認められる。対照品種「アロママ13号」と比較して、頭花の型が一重であること、舌状花の基部の向き (一重及び半八重品種に限る) が水平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人広島大学
広島県東広島市鏡山一丁目3番2号
中部電力株式会社
愛知県名古屋市東区東新町1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

近藤勝彦 津田その子

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第22748号 平成25年11月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum fruticosum (Ledeb.) Ohashi et Yonekura x *C. x morifolium*
Ramat. アロママ15号 (アロマ15ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはかなり短、葉の幅は狭、葉の長さ/幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (*Chrysanthemum* × *morifolium* 品種を除く) は無又は極弱、葉の裏面の毛の粗密 (*Chrysanthemum* × *morifolium* 品種を除く) は弱、葉の裏面の色 (*Chrysanthemum* × *morifolium* 品種を除く) は147B、花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る) は中、頭花の型は一重、花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く) はデイジー、頭花の直径 (摘らいしていないもの) は極小、頭花の舌状花数 (一重及び半八重品種に限る) は極少、頭花の舌状花の形の数 は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き (一重及び半八重品種に限る) はやや斜上、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形 (管状でない舌状花) はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ/幅はかなり低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は173B、舌状花の表面の二次色は4B、舌状花の表面の二次色の分布は基部1/4、舌状花の表面の二次色の型は一様又はほぼ一様、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性 (ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む) は類似する、舌状花の裏面の色は181A;4B、花盤の頭花に対する直径の大きさ (一重及び半八重品種に限る) は極大、花盤の開やく前の色の区分 (デイジー型の品種に限る) は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無 (デイジー型の品種に限る) は無、日長感応グループ (正確な日長制御での栽培) は8週間、開花習性は10月~11月咲き (秋) である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「アロママ15号」は、対照品種「アロママ9号」と比較して、舌状花の先端の形が丸であること、舌状花の表面の色数が2であること、舌状花の表面の主な色が173Bであること等で区別性が認められる。対照品種「アロママ5号」と比較して、舌状花の表面の色数が2であること、舌状花の表面の主な色が173Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人広島大学
広島県東広島市鏡山一丁目3番2号
中部電力株式会社
愛知県名古屋市中区東新町1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

近藤勝彦 津田その子

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第22749号 平成25年11月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum fruticosum (Ledeb.) Ohashi et Yonekura x *C. x morifolium*
Ramat. アロママ16号 (アロマ16コウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは極短、葉の幅は狭、葉の長さ/幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (*Chrysanthemum x morifolium* 品種を除く) は無又は極弱、葉の裏面の毛の粗密 (*Chrysanthemum x morifolium* 品種を除く) はかなり弱、葉の裏面の色

(*Chrysanthemum x morifolium* 品種を除く) は137C、花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る) は中、頭花の型は半八重、花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く) はデイジー、頭花の直径 (摘らいしていないもの) は極小、頭花の舌状花数 (一重及び半八重品種に限る) は極少、頭花の舌状花の形の数 は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き (一重及び半八重品種に限る) は斜上、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形 (管状でない舌状花) は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ/幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性 (ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む) は著しく異なる、舌状花の裏面の色は4B;178A、花盤の頭花に対する直径の大きさ (一重及び半八重品種に限る) はやや大、花盤の開やく前の色の区分 (デイジー型の品種に限る) は淡黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無 (デイジー型の品種に限る) は無、日長感応グループ (正確な日長制御での栽培) は7.5週間、開花習性は10月~11月咲き (秋) である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「アロママ16号」は、対照品種「アロママ2号」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、舌状花の先端の形が丸であること、舌状花の裏面の色が4B;178Aであること等で区別性が認められる。対照品種「アロママ1号」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、舌状花の先端の形が丸であること、舌状花の裏面の色が4B;178Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人広島大学
広島県東広島市鏡山一丁目3番2号
中部電力株式会社
愛知県名古屋市中区東新町1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

近藤勝彦 津田その子

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 7 5 0 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. Yes Day

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ / 幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数 は 1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ / 幅はやや低、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は145D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は145B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Yes Day」は、対照品種「セキウイグリーン」と比較して、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）が平であること、舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が145C;144Bであること等で区別性が認められる。対照品種「セスキューバグリーン」と比較して、草丈が高であること、舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が145C;144Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Chungcheongnam-do

21, Chungnam-daero, Hongbuk-myeon, Hongseong-gun, 350-831, Republic of Korea

6 登録品種の育成をした者の氏名

Pak, Ha-Seung Won, Mi-Kyoung Kim, Hak-Hun Choi, Won-Chun Lee, Young-Hye Kim, Dong-Chan An, Jong-Beom Choi, Taeg-Yong

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 3 月 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 7 5 1 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. Yes Life

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はアネモネ、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数 は 1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は NN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は NN155D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はかなり大、花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）は 144A、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）は 157D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は 10 週間、開花習性は 10 月～11 月咲き（秋）である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「Yes Life」は、対照品種「ショパン」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）が 157D であること等で区別性が認められる。対照品種「デックモナ」と比較して、葉の一次欠刻の深さが浅であること、頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）が極少であること等で区別性が認められる。対照品種「フィスワン」と比較して、頭花の花柄の長さが中であること、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）がかなり少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Chungcheongnam-do

21, Chungnam-daero, Hongbuk-myeon, Hongseong-gun, 350-831, Republic of Korea

6 登録品種の育成をした者の氏名

Pak, Ha-Seung Won, Mi-Kyoung Lee, Cheol-Hwi In, Min-Sik Kim, Dong-Chan Lee, Young-Hye An, Jong-Beom Choi, Won-Chun

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 3 月 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 7 5 2 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. Yes Nuri

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はアネモネ、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数 は 1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は NN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は NN155D; 75C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は極大、花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）は 59B、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）は 69D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は 8.5 週間、開花習性は 10 月～11 月咲き（秋）である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「Yes Nuri」は、対照品種「サモス」と比較して、頭花の直径（摘らいしていないもの）がかなり小であること、花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）が 59B であること等で区別性が認められる。対照品種「レポルカ」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さがやや短であること、舌状花の表面の主な色が NN155D であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Chungcheongnam-do

21, Chungnam-daero, Hongbuk-myeon, Hongseong-gun, 350-831, Republic of Korea

6 登録品種の育成をした者の氏名

Pak, Ha-Seung Won, Mi-Kyoung Lee, Cheol-Hwi In, Min-Sik Kim, Dong-Chan Lee, Young-Hye An, Jong-Beom Choi, Won-Chun

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 3 月 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 7 5 3 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. Yes Telling

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数 は 1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は NN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は NN155D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は 9 週間、開花習性は 10 月～11 月咲き（秋）である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「Yes Telling」は、対照品種「TMみるく」と比較して、草丈がやや高であること、頭花の花柄の長さが中であること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）が強い円錐状であること等で区別性が認められる。対照品種「イジュン」と比較して、頭花の花柄の長さが中であること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）が強い円錐状であること等で区別性が認められる。対照品種「精やわら」と比較して、頭花の舌状花の形の数 が 1 であること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）が強い円錐状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Chungcheongnam-do

21, Chungnam-daero, Hongbuk-myeon, Hongseong-gun, 350-831, Republic of Korea

6 登録品種の育成をした者の氏名

Pak, Ha-Seung Won, Mi-Kyoung Lee, Cheol-Hwi In, Min-Sik Kim, Dong-Chan Lee, Young-Hye An, Jong-Beom Choi, Won-Chun

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 4 月 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 7 5 4 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ホコマムコメホイ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは浅、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数 は 1、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は NN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は NN155D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は 9 週間、開花習性は 10 月～11 月咲き（秋）である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「ホコマムコメホイ」は、対照品種「セイオラクル」と比較して、頭花の型が半八重であること、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）がデージーであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

牛田豊文
愛知県愛西市金棒町東101

6 登録品種の育成をした者の氏名

牛田豊文

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 3 月 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第22755号 平成25年11月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ホコマムコメセミダベイ

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは浅、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数値は1、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は72C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は75A、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ホコマムコメセミダベイ」は、対照品種「鞠かざぐるま」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること、舌状花の裏面の色が75Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ピアリッツ」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、舌状花の表面の主な色が72Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

牛田豊文
愛知県愛西市金棒町東101

6 登録品種の育成をした者の氏名

牛田豊文

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第22756号 平成25年11月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ホコマムコメモイ

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は70B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感應グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ホコマムコメモイ」は、対照品種「ピアリッツ」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さが中であること、舌状花の花筒の長さがかなり長であること等で区別性が認められる。対照品種「ホコマムコメセミダベイ」と比較して、葉の一次欠刻の深さが中であること、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）が少であること、舌状花の表面の主な色が75Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

牛田豊文
愛知県愛西市金棒町東101

6 登録品種の育成をした者の氏名

牛田豊文

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第22757号 平成25年11月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. エルサージュ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ/幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ/幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は5C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エルサージュ」は、対照品種「レジャンボ」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、頭花の花柄の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「DEKSHEPODY」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、葉の長さがやや長であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が10週間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

牛田豊文
愛知県愛西市金棒町東101

6 登録品種の育成をした者の氏名

牛田豊文

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第22758号 平成25年11月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. エルロイス

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は164D;35C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エルロイス」は、対照品種「フィロリポップ イエロー」と比較して、葉の一次欠刻の深さがかなり深であること、頭花の花柄の長さが短であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

牛田豊文
愛知県愛西市金棒町東101

6 登録品種の育成をした者の氏名

牛田豊文

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第22759号 平成25年11月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ホウノピナデ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN74D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は75D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ホウノピナデ」は、対照品種「FICHARMING」と比較して、葉柄の葉長に対する長さが長であること、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「愛知5号」と比較して、葉柄の葉長に対する長さが長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

牛田豊文
愛知県愛西市金棒町東101

6 登録品種の育成をした者の氏名

牛田豊文

7 出願公表の年月日 平成23年4月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 7 6 0 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. エルセシル

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は露心する八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は粗、頭花の舌状花の形の数 は 1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は 69B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は 69D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は 9 週間、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「エルセシル」は、対照品種「プラノ」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、頭花の型が露心する八重であること等で区別性が認められる。対照品種「セイノクターン」と比較して、草丈がやや高であること、頭花の型が露心する八重であること等で区別性が認められる。対照品種「カーネレミー」と比較して、頭花の舌状花の形の数 が 1 であること、舌状花の先端の形が丸であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
牛田豊文
愛知県愛西市金棒町東101

6 登録品種の育成をした者の氏名
牛田豊文

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 3 月 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 7 6 1 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ホウノモデコ

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は大、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数 は 1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は76D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN74C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ホウノモデコ」は、対照品種「フィロリポップ」と比較して、草丈が中であること、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

牛田豊文
愛知県愛西市金棒町東101

6 登録品種の育成をした者の氏名

牛田豊文

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 4 月 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第22762号 平成25年11月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 三河 アトリア (ミカ アトリア)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ/幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度(叢生でない品種に限る)は中、頭花の型は八重、頭花の直径(摘らいしていないもの)はかなり小、頭花の舌状花の粗密(露心する八重及び八重品種に限る)は密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、舌状花の花筒の長さは中、舌状花の最大幅部の横断面の形(管状でない舌状花)はやや凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ/幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性(ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む)は類似する、舌状花の裏面の色は4A、日長感応グループ(正確な日長制御での栽培)2は12週間、舌状花の基部の向き(露心する八重及び八重品種に限る)は水平である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「三河 アトリア」は、対照品種「三河 シリウス」と比較して、舌状花の花筒の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「セイリラード」と比較して、葉の長さがやや長であること、頭花の高さ(摘らいしていないもの)がかなり低であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

農事組合法人三河温室園芸組合
愛知県蒲郡市三谷町諏訪東19番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

今泉聖一

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 7 6 3 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 琉の彩姫 (リュウアヤヒメ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は極少、頭花の舌状花の形の数 は 1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は N74B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は 75C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は 9 週間である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「琉の彩姫」は、対照品種「沖の乙女」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）が極少であること等で区別性が認められる。対照品種「FICHARMING」と比較して、頭花の花柄の長さが短であること、舌状花の表面の主な色が N74B であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県農業協同組合
沖縄県那覇市楚辺 2-33-18

6 登録品種の育成をした者の氏名

寄能節雄

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 4 月 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 7 6 4 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. CANYTEC

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数 は 1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は 8B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は 8C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は 7.5 週間、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「CANYTEC」は、対照品種「三河 シリウス」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さが深であること、頭花の舌状花の主要な形が舌状であること等で区別性が認められる。対照品種「セイリロード」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さが深であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が 7.5 週間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ジャパンアグリバイオ株式会社
静岡県浜松市中区板屋町 110 番地の 5

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rob Noodelijck

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 7 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 7 6 5 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DAPITEC

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数 は 1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は 75B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は 73D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は 8 週間、開花習性は 10 月～11 月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「DAPITEC」は、対照品種「JEANNY DARK PINK」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さが深であること、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種「セイベベ」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さが深であること、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）が密であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ジャパンアグリバイオ株式会社
静岡県浜松市中区板屋町 110 番地の 5

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rob Noodelijk

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 7 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 7 6 6 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. PICATEC

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数 は 1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は 69D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は 69D; 75B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は 8 週間、開花習性は 10 月～11 月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「PICATEC」は、対照品種「セイコーミラ」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さが深であること、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種「DAPITEC」と比較して、舌状花の表面の主な色が 69D であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ジャパンアグリバイオ株式会社
静岡県浜松市中区板屋町 110 番地の 5

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rob Noodelijk

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 7 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 7 6 7 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. SNOCATEC

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数 は 1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色はNN155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SNOCATEC」は、対照品種「サンダー」と比較して、葉の長さが短であること、葉の周縁の二次欠刻の深さが深であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ジャパンアグリバイオ株式会社
静岡県浜松市中区板屋町110番地の5

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rob Noodelijk

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 7 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 7 6 8 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DELIRADOST

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はアネモネ、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや多、頭花の舌状花の形の数 は 2、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は NN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は NN155D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はかなり大、花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）は N144D、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）は 155C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は 9 週間、開花習性は 10 月～11 月咲き（秋）である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「DELIRADOST」は、対照品種「デックモナ」と比較して、草丈がやや高であること等で区別性が認められる。対照品種「フィスワン」と比較して、葉の長さ／幅がやや高であること、葉の基部の形が鈍形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 7 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 7 6 9 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DELIEDESSA WHITE

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや大、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数 は 1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は NN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は NN155C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は 10 週間、開花習性は 10 月～11 月咲き（秋）である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「DELIEDESSA WHITE」は、対照品種「フィヴァチカン」と比較して、草丈がかなり高であること、頭花の直径（摘らいしていないもの）がやや大であること等で区別性が認められる。対照品種「セイアルプス」と比較して、草丈がかなり高であること、葉の基部の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 7 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 7 7 0 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DELINEVA

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数 は 1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はかなり低、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は NN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は NN155D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は 9 週間、開花習性は 10 月～11 月咲き（秋）である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「DELINEVA」は、対照品種「ノア」と比較して、花序の形（叢生でない品種に限る）が深いドーム形であること、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「セイエルザ」と比較して、花序の側枝の頭花の向き（叢生でない品種に限る）が上であること、舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 7 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 7 7 1 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DELIRADOST CREAM

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは浅、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はアネモネ、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は多、頭花の舌状花の形の数 は 2、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は 2D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は 2D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はかなり大、花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）は 144C、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）は 4B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は 9 週間、開花習性は 10 月～11 月咲き（秋）である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「DELIRADOST CREAM」は、対照品種「DELIRADOST」と比較して、舌状花の表面の主な色が 2D であること、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）が 4B であること、管状花の色（アネモネ型の品種に限る）が 2D であること等で区別性が認められる。対照品種「フィスワン」と比較して、舌状花の表面の主な色が 2D であること、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）が 4B であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 7 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第22772号 平成25年11月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 太陽のかほ(タイヨノホ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ/幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度(叢生でない品種に限る)は中、頭花の型は半八重、花盤の型(八重及び露心する八重品種を除く)はアネモネ、頭花の直径(摘らいしていないもの)は中、頭花の舌状花数(一重及び半八重品種に限る)はやや少、頭花の舌状花の形の数(2)、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形は舌状、舌状花の基部の向き(一重及び半八重品種に限る)はやや斜上、舌状花の花筒の長さは中、舌状花の最大幅部の横断面の形(管状でない舌状花)はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ/幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性(ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む)は類似する、舌状花の裏面の色はNN155D、花盤の頭花に対する直径の大きさ(一重及び半八重品種に限る)は大、花盤の開やく前の色(アネモネ型の品種に限る)は144A、花盤の開やく時の色(アネモネ型の品種に限る)は154D、日長感応グループ(正確な日長制御での栽培)は10週間、開花習性は10月~11月咲き(秋)である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「太陽のかほ」は、対照品種「デックモナ」と比較して、草丈がやや高であること、葉の裂片縁部の重なりが接するのであること、頭花の舌状花の形の数(2)であること等で区別性が認められる。対照品種「フィスワン」と比較して、葉柄の葉長に対する長さが長であること、頭花の舌状花の形の数(2)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村晃三

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 7 7 3 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 太陽の華菜 (タイウノカ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ / 幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る) は中、頭花の型は八重、頭花の直径 (摘らいしていないもの) はやや小、頭花の舌状花の粗密 (露心する八重及び八重品種に限る) は中、頭花の舌状花の形は 1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形 (管状でない舌状花) は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ / 幅はやや低、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は 75B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性 (ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む) は類似する、舌状花の裏面の色は 75B、日長感応グループ (正確な日長制御での栽培) は 9 週間、開花習性は 10 月 ~ 11 月咲き (秋)、舌状花の基部の向き (露心する八重及び八重品種に限る) は水平である。 (カラーチャートは RHS を使用)

出願品種「太陽の華菜」は、対照品種「ハウノモデコ」と比較して、舌状花の花筒の長さが短であること、舌状花の裏面の色が 75B であること等で区別性が認められる。対照品種「セイノクターン」と比較して、葉の長さがやや長であること、舌状花の表面の主な色が 75B であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目 10 番 1 号

6 登録品種の育成をした者の氏名

久保田篤 宮里友和

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 7 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第22774号 平成25年11月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 太陽の琉歌(タイヨウリュウカ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ/幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度(叢生でない品種に限る)は中、頭花の型は露心する八重、頭花の直径(摘らいしていないもの)はやや小、頭花の舌状花の粗密(露心する八重及び八重品種に限る)は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形(管状でない舌状花)は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ/幅は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は172C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性(ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む)は類似する、舌状花の裏面の色は163D;168D、日長感応グループ(正確な日長制御での栽培)は9週間、開花習性は10月~11月咲き(秋)、舌状花の基部の向き(露心する八重及び八重品種に限る)は水平である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「太陽の琉歌」は、対照品種「フィロリポップ イエロー」と比較して、たく葉の大きさが小であること、舌状花の表面の主な色が172Cであること等で区別性が認められる。対照品種「エルロイス」と比較して、たく葉の大きさが小であること、葉の一次欠刻の深さが中であること、舌状花の表面の主な色が172Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

久保田篤 宮里友和

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第22775号 平成25年11月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 太陽の紫音(タイヨウノムネ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ/幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度(叢生でない品種に限る)は中、頭花の型は半八重、花盤の型(八重及び露心する八重品種を除く)はデージー、頭花の直径(摘らいしていないもの)は中、頭花の舌状花数(一重及び半八重品種に限る)はやや多、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き(一重及び半八重品種に限る)は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形(管状でない舌状花)はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ/幅はやや低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色はNN155B、舌状花の表面の二次色は71D、舌状花の表面の二次色の分布は基部1/2、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性(ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む)は類似する、舌状花の裏面の色は75B;NN155B、花盤の頭花に対する直径の大きさ(一重及び半八重品種に限る)はやや小、花盤の開やく前の色の区分(デージー型の品種に限る)は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無(デージー型の品種に限る)は無、日長感応グループ(正確な日長制御での栽培)は10週間、開花習性は10月~11月咲き(秋)である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「太陽の紫音」は、対照品種「セイリゲル」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さが浅であること、頭花の舌状花数(一重及び半八重品種に限る)がやや多であること、舌状花の基部の向き(一重及び半八重品種に限る)が水平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

久保田篤 宮里友和

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第22776号 平成25年11月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 太陽の真帆(タイヨノマホ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ/幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度(叢生でない品種に限る)は中、頭花の型は半八重、花盤の型(八重及び露心する八重品種を除く)はデージー、頭花の直径(摘らいしていないもの)は大、頭花の舌状花数(一重及び半八重品種に限る)は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き(一重及び半八重品種に限る)はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形(管状でない舌状花)はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ/幅はやや高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性(ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む)は類似する、舌状花の裏面の色はNN155B;145D、花盤の頭花に対する直径の大きさ(一重及び半八重品種に限る)は小、花盤の開やく前の色の区分(デージー型の品種に限る)は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無(デージー型の品種に限る)は無、日長感応グループ(正確な日長制御での栽培)は9週間、開花習性は10月~11月咲き(秋)である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「太陽の真帆」は、対照品種「マーガレットマム」と比較して、たく葉の大きさが小であること、一茎当たりの頭花の総数(叢生でない品種に限る)が少であること、頭花の直径(摘らいしていないもの)が大であること等で区別性が認められる。対照品種「セイフラン」と比較して、草丈が中であること、舌状花の基部の向き(一重及び半八重品種に限る)がやや斜上であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大畑庄司 久保田篤

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第22777号 平成25年11月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. TSH18 1-06-25

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はアネモネ、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は69D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN155B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はかなり大、花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）は143C、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）は11D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TSH18 1-06-25」は、対照品種「トゥアーマリン」と比較して、草丈が高であること、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）がかなり大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村晃三

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 7 7 8 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ARMAPED

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはかなり短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅は高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数値は 1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は 2、舌状花の表面の主な色は 179A、舌状花の表面の二次色は 6A、舌状花の表面の二次色の分布は基部 1/4、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は 183C;8B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はかなり大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は 9 週間、開花習性は 10 月～11 月咲き（秋）である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「ARMAPED」は、対照品種「Armacodor」と比較して、舌状花の表面の主な色が 179A であること、舌状花の表面の二次色が 6A であること、舌状花の表面の二次色の分布が基部 1/4 であること等で区別性が認められる。対照品種「ARBINHO RED」と比較して、葉の長さがかなり短であること、頭花の直径（摘らいしていないもの）がかなり小であること、舌状花の表面の二次色の分布が基部 1/4 であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子 607 番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Mark Boeder

7 出願公表の年月日 平成 2 4 年 2 月 2 0 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 7 7 9 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ARBINHO RED

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は53A、舌状花の表面の二次色は3A、舌状花の表面の二次色の分布2は縁部、舌状花の表面の二次色の型は一様又はほぼ一様、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は3D;60A、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ARBINHO RED」は、対照品種「Arbinho」と比較して、舌状花の表面の主な色が53Aであること、舌状花の表面の二次色が3Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Mark Boeder

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 7 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 7 8 0 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ARGENDOR

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数 は 1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は 12A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は 9C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は 7.5 週間、開花習性は 10 月～11 月咲き（秋）である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「ARGENDOR」は、対照品種「Armacolui」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや浅であること、舌状花の表面の主な色が 12A であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が 7.5 週間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子 607 番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Mark Boeder

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 7 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 7 8 1 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ARKOLLUX

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は露心する八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり粗、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ARKOLLUX」は、対照品種「Armawhidan」と比較して、頭花の型が露心する八重であること、頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）が中であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が7.5週間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Mark Boeder

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 7 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 7 8 2 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ARMADOLIS

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数 は 1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は 2、舌状花の表面の主な色は 71A、舌状花の表面の二次色は NN155C、舌状花の表面の二次色の分布は基部 1/4、舌状花の表面の二次色の型は一様又はほぼ一様、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は 75B;69C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はかなり大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は有、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は 8 週間、開花習性は 10 月～11 月咲き（秋）である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「ARMADOLIS」は、対照品種「Arbinho」と比較して、頭花の直径（摘らいしていないもの）がかなり小であること、舌状花の表面の二次色の分布が基部 1/4 であること、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）がかなり大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子 607 番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Mark Boeder

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 7 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第22783号 平成25年11月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ARPOLTOR

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数 は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は69D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ARPOLTOR」は、対照品種「セイマリア」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が8.5週間であること等で区別性が認められる。対照品種「セイペティー」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、花序の形（叢生でない品種に限る）が平らな散房花序型であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が8.5週間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Mark Boeder

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 7 8 4 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ARSTEAM

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は大、頭花の型は露心する八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり粗、頭花の舌状花の形の数 は 1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は150D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は150D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ARSTEAM」は、対照品種「Armadanyel」と比較して、たく葉の大きさが小であること、頭花の型が露心する八重であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が外巻きであること、舌状花の表面の主な色が150Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Mark Boeder

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 7 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 7 8 5 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DELISCAPA

3 登録品種の特性の概要

丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数 は 1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は 69C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は N155B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は 8.5 週間である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「DELISCAPA」は、対照品種「セイピュア」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、舌状花の表面の主な色が 69C であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が 8.5 週間であること等で区別性が認められる。対照品種「セイペティール」と比較して、頭花の高さ（摘らいしていないもの）がかなり低であること、舌状花の縦断面の形状が外反であること、舌状花の表面の主な色が 69C であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 8 月 1 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第22786号 平成25年11月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. シュールーク

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ/幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ/幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は4C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感應グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シュールーク」は、対照品種「レサイバーイエロー」と比較して、たく葉の大きさが小であること、葉の基部の形が鈍形であること、花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）が淡黄であること等で区別性が認められる。対照品種「レミダス」と比較して、葉の基部の形が鈍形であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が外巻きであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第22787号 平成25年11月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. シュースカッシュ

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはかなり浅、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シュースカッシュ」は、対照品種「ホワイトリネカーOW-1」と比較して、葉の長さ／幅がやや低であること、葉の一次欠刻の深さがかなり浅であること、舌状花の縦断面の形状が外反であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が8週間であること等で区別性が認められる。対照品種「セイプリンス」と比較して、葉の長さがやや短であること、葉の一次欠刻の深さがかなり浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第22788号 平成25年11月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. シューシグナル

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シューシグナル」は、対照品種「ホワイトリネカーOW-1」と比較して、葉の長さが長であること、花盤の開やく時の色（デージー型の品種に限る）が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「PUTEC」と比較して、たく葉の大きさが中であること、頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）が極少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第22789号 平成25年11月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. シューオセロ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はかなり低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は168D、舌状花の表面の二次色は181D、舌状花の表面の二次色の分布2は縁部、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は155B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シューオセロ」は、対照品種「レサイバーサーモン」と比較して、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が外巻きであること、舌状花の表面の主な色が168Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一

広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第22790号 平成25年11月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. しゅうおうごん

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さは浅、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は9A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は6A、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感應グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「しゅうおうごん」は、対照品種「しゅうやよい」と比較して、葉の長さがやや短であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がわずかに凸であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が外巻きであること等で区別性が認められる。対照品種「セイキャスト」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）がややドーム状であること、花盤の開やく時の色（デージー型の品種に限る）が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 7 9 1 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀まなみ (シウマミ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数 は 1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は 72C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は 75B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2 は 12 週間、開花習性は 10 月～11 月咲き（秋）である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「秀まなみ」は、対照品種「沖の乙女」と比較して、草丈がかなり高であること、舌状花の表面の主な色が 72C であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2 が 12 週間であること等で区別性が認められる。対照品種「インチ」と比較して、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）が無であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2 が 12 週間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤 淳一
広島県福山市新市町大字金丸 673 番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤 淳一

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 1 1 月 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第22792号 平成25年11月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. モゼオゴジョ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はかなり低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN155B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「モゼオゴジョ」は、対照品種「セイピノ」と比較して、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること、舌状花の表面の主な色が75Dであること等で区別性が認められる。対照品種「セイピュア」と比較して、葉の基部の形が円形であること、舌状花の表面の主な色が75Dであること等で区別性が認められる。対照品種「DELISCAPA」と比較して、葉の長さが中であること、葉の裂片縁部の重なりが接するであること、舌状花の先端の形が丸であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鹿児島県

鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉水竜次 永吉実孝 河合亜紀 田中見佳

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第22793号 平成25年11月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. モゼウインク

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は69C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN155B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「モゼウインク」は、対照品種「セイピュア」と比較して、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が内巻きであること、舌状花の縦断面の形状が平であること、舌状花の表面の主な色が69Cであること等で区別性が認められる。対照品種「モゼオゴジョ」と比較して、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が内巻きであること、舌状花の縦断面の形状が平であること等で区別性が認められる。対照品種「DELISCAPA」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数が多いこと、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が内巻きであること、舌状花の縦断面の形状が平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鹿児島県

鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉水竜次 永吉実孝 河合亜紀 田中見佳

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第22794号 平成25年11月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. モゼエッグ

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は3C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「モゼエッグ」は、対照品種「レサイバーイエロー」と比較して、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）がやや少であること、花盤の開やく時の色（デージー型の品種に限る）が淡黄であること等で区別性が認められる。対照品種「レミダス」と比較して、舌状花の先端の形が丸であること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）がややドーム状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鹿児島県

鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉水竜次 永吉実孝 河合亜紀 田中見佳

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 7 9 5 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DELIAMIRA

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは長、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数 は 2、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形は管状、舌状花の花筒の長さは長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は縁が接する強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは中、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや高、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は NN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は NN155D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は 10 週間、開花習性は 10 月～11 月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「DELIAMIRA」は、対照品種「CHAMPAGNE」と比較して、葉の長さ／幅が高であること、頭花の舌状花の主要な形がさじ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 1 0 月 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 7 9 6 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DELIETNAD

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数 は 1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は N155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は 75C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は 9 週間、開花習性は 10 月～11 月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「DELIETNAD」は、対照品種「プラノ」と比較して、葉の長さが長であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い内巻きであること、舌状花の先端の形が尖るであること等で区別性が認められる。対照品種「エルセシル」と比較して、頭花の型が八重であること、舌状花の表面の主な色が N155B であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 1 0 月 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 7 9 7 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DELIETNAD PURPLE

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は71D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN74D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELIETNAD PURPLE」は、対照品種「セイコーミラルージュ」と比較して、頭花の直径（摘らいしていないもの）がやや大であること、頭花の花柄の長さが中であること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）が水平であること等で区別性が認められる。対照品種「DELIDANTE」と比較して、舌状花の表面の主な色が71Dであること、舌状花の裏面の色がN74Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 1 0 月 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 7 9 8 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DELIETNAD YELLOW

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数 は 1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は 5D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は 13D; 20D、日長感应グループ（正確な日長制御での栽培）は 9 週間、開花習性は 10 月～11 月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「DELIETNAD YELLOW」は、対照品種「フィロリポップ イエロー」と比較して、たく葉の大きさが小であること、舌状花の表面の主な色が 5D であること等で区別性が認められる。対照品種「エルロイス」と比較して、葉の一次欠刻の深さが中であること、花序の側枝の頭花の向き（叢生でない品種に限る）が上であること、舌状花の表面の主な色が 5D であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 1 0 月 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 7 9 9 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DELIPA0LO

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数 は 1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は 2、舌状花の表面の主な色は 9B、舌状花の表面の二次色は 163B、舌状花の表面の二次色の分布は基部 1/2、舌状花の表面の二次色の型は一様又はほぼ一様、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は 8B;163D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は 8 週間、開花習性は 10 月～11 月咲き（秋）である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「DELIPA0LO」は、対照品種「精みやま」と比較して、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）がやや少であること、舌状花の表面の色数が 2 であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が 8 週間であること等で区別性が認められる。対照品種「セイキャスト」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや深であること、舌状花の表面の色数が 2 であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が 8 週間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 1 0 月 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 8 0 0 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DELIPINKYROCK

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはかなり短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は露心する八重、頭花の直径（摘らいいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は69D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は69D;72D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELIPINKYROCK」は、対照品種「セイコーミラ」と比較して、葉の長さがかなり短であること、頭花の型が露心する八重であること、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）がやや粗であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Chrysanten B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 1 0 月 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 8 0 1 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. NOA SUNNY

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数 は 1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はかなり低、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は 5A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は 7D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は 10 週間、開花習性は 10 月～11 月咲き（秋）である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「NOA SUNNY」は、対照品種「NOA YELLOW」と比較して、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）が強い円錐状であること、花盤の開やく時の色（デージー型の品種に限る）が黄緑であること等で区別性が認められる。対照品種「DELILIMONADA」と比較して、葉の基部の形が平形であること、舌状花の縦断面の形状が外反であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Chrysanten B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 1 0 月 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第22802号 平成25年11月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 太陽のマライカ (タイヨウマライカ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ/幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ/幅はかなり低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「太陽のマライカ」は、対照品種「セイプリンス」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さがやや長であること、花盤の直径（デージー型の一重及び半八重品種に限る）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「せいしろふさ」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数が多いこと、花序の形（叢生でない品種に限る）が深いドーム形であること、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）がやや少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

久保田篤 宮里友和

7 出願公表の年月日 平成23年11月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第22803号 平成25年11月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 太陽のポロス (タイワポロス)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは大、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の長さ/幅は高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度(叢生でない品種に限る)は中、頭花の型は半八重、花盤の型(八重及び露心する八重品種を除く)はデージー、頭花の直径(摘らいしていないもの)は中、頭花の舌状花数(一重及び半八重品種に限る)は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き(一重及び半八重品種に限る)は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形(管状でない舌状花)はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ/幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性(ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む)は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、花盤の頭花に対する直径の大きさ(一重及び半八重品種に限る)は中、花盤の開やく前の色の区分(デージー型の品種に限る)は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無(デージー型の品種に限る)は無、日長感應グループ(正確な日長制御での栽培)は10週間、開花習性は10月~11月咲き(秋)である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「太陽のポロス」は、対照品種「PUTEC」と比較して、たく葉の大きさが大であること、葉の基部の形が鈍形であること、花盤の断面の形(デージー型の品種に限る)がややドーム状であること等で区別性が認められる。対照品種「セイエルザ」と比較して、たく葉の大きさが大であること、舌状花の最大幅部の横断面の形(管状でない舌状花)がわずかに凸であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

久保田篤 宮里友和

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第22804号 平成25年11月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 太陽のレティシア (タイヨルティシア)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の長さ/幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度(叢生でない品種に限る)は中、頭花の型は半八重、花盤の型(八重及び露心する八重品種を除く)はデージー、頭花の直径(摘らいしていないもの)はやや小、頭花の舌状花数(一重及び半八重品種に限る)は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き(一重及び半八重品種に限る)は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形(管状でない舌状花)はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ/幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は69C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性(ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む)は類似する、舌状花の裏面の色は69C、花盤の頭花に対する直径の大きさ(一重及び半八重品種に限る)は中、花盤の開やく前の色の区分(デージー型の品種に限る)は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無(デージー型の品種に限る)は無、日長感応グループ(正確な日長制御での栽培)は9週間、開花習性は10月~11月咲き(秋)である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「太陽のレティシア」は、対照品種「セイペティー」と比較して、草丈が高であること、葉の長さが長であること、舌状花の縦断面の形状が外反であること等で区別性が認められる。対照品種「モゼウインク」と比較して、葉の長さが長であること、葉の一次欠刻の深さが深であること、舌状花の最大幅部の横断面の形(管状でない舌状花)がわずかに凸であること等で区別性が認められる。対照品種「DELISCAPA」と比較して、葉の長さが長であること、葉の周縁の二次欠刻の数かなり多であること、舌状花の幅が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

久保田篤 宮里友和

7 出願公表の年月日 平成23年11月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第22805号 平成25年11月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 太陽のシェルティ (タイヨウシェルティ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ/幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度(叢生でない品種に限る)は中、頭花の型は半八重、花盤の型(八重及び露心する八重品種を除く)はデイジー、頭花の直径(摘らいしていないもの)はやや小、頭花の舌状花数(一重及び半八重品種に限る)はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き(一重及び半八重品種に限る)は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形(管状でない舌状花)は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ/幅はかなり低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は69D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性(ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む)は類似する、舌状花の裏面の色はN155B、花盤の頭花に対する直径の大きさ(一重及び半八重品種に限る)は中、花盤の開やく前の色の区分(デイジー型の品種に限る)は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無(デイジー型の品種に限る)は無、日長感応グループ(正確な日長制御での栽培)は10週間、開花習性は10月~11月咲き(秋)である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「太陽のシェルティ」は、対照品種「FIDESMAIKO」と比較して、たく葉の大きさが中であること、舌状花の表面の主な色が69Dであること、花盤の断面の形(デイジー型の品種に限る)がややドーム状であること等で区別性が認められる。対照品種「太陽のレティシア」と比較して、葉の長さが中であること、葉の一次欠刻の深さが中であること、頭花の花柄の長さがやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「DELISCAPA」と比較して、葉の長さが中であること、頭花の花柄の長さがやや長であること、舌状花の幅が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村晃三 久保田篤

7 出願公表の年月日 平成23年11月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第22806号 平成25年11月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 太陽のキャバリア (タイヨウキャバリア)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の長さ/幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度(叢生でない品種に限る)は中、頭花の型は半八重、花盤の型(八重及び露心する八重品種を除く)はデージー、頭花の直径(摘らいしていないもの)は中、頭花の舌状花数(一重及び半八重品種に限る)は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き(一重及び半八重品種に限る)は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形(管状でない舌状花)はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ/幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性(ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む)は類似する、舌状花の裏面の色は69C、花盤の頭花に対する直径の大きさ(一重及び半八重品種に限る)はやや小、花盤の開やく前の色の区分(デージー型の品種に限る)は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無(デージー型の品種に限る)は無、日長感応グループ(正確な日長制御での栽培)は10週間、開花習性は10月~11月咲き(秋)である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「太陽のキャバリア」は、対照品種「セイローザ」と比較して、葉の長さが短であること、頭花の花柄の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「FIDESMAIKO」と比較して、葉の長さが短であること、頭花の花柄の長さがやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村晃三 久保田篤

7 出願公表の年月日 平成23年11月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 8 0 7 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. Dream Water

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はかなり低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Dream Water」は、対照品種「セイエルザ」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さがやや長であること、花序の形（叢生でない品種に限る）が散房花序型であること、花盤の開やく時の色（デージー型の品種に限る）が黄緑であること等で区別性が認められる。対照品種「DELINEVA」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さがやや長であること、花序の形（叢生でない品種に限る）が散房花序型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

GyeongGi-Do

1, Maesanno 3-ga, Paldal-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 442-781 Republic of Korea

6 登録品種の育成をした者の氏名

JUNG Yun Kyung LIM Jae Wook KIM Soon Jae LEE Sang Dug LEE Young Soon
KIM Young Ho YU Ye Young

7 出願公表の年月日 平成 2 4 年 2 月 2 0 日

1 品種登録の番号及び年月日 第22808号 平成25年11月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DEKBASILIO

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は一重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はアネモネ、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形は管状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは中、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅は極高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロータ状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は157D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は極大、花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）は144C、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）は150C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DEKBASILIO」は、対照品種「セイロケット」と比較して、頭花の高さ（摘らいしていないもの）が低であること、管状花の色（アネモネ型の品種に限る）が150D;150Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ベスビオGR」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること、管状花の色（アネモネ型の品種に限る）が150D;150Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ジャパンアグリバイオ株式会社
静岡県浜松市中区板屋町110番地の5

6 登録品種の育成をした者の氏名

C.W. Dekker

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 8 0 9 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DEKFRANCOFONE

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は大、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数 は 1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は169C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は167D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DEKFRANCOFONE」は、対照品種「パンサー」と比較して、舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）が強であること、舌状花の裏面の色が167Dであること等で区別性が認められる。対照品種「GATEC」と比較して、舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）が強であること、舌状花の裏面の色が167Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ジャパンアグリバイオ株式会社
静岡県浜松市中区板屋町110番地の5

6 登録品種の育成をした者の氏名

C.W. Dekker

7 出願公表の年月日 平成 2 4 年 2 月 2 0 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 8 1 0 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DEKMAJOR

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数値は 1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は NN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は NN155C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は 8 週間、開花習性は 10 月～11 月咲き（秋）である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「DEKMAJOR」は、対照品種「セイアルプス」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が 8 週間であること等で区別性が認められる。対照品種「PUTEC」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さがやや長であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が 8 週間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ジャパンアグリバイオ株式会社
静岡県浜松市中区板屋町 110 番地の 5

6 登録品種の育成をした者の氏名

C.W. Dekker

7 出願公表の年月日 平成 2 4 年 2 月 2 0 日

1 品種登録の番号及び年月日 第22811号 平成25年11月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ゆみの白さぎ（ミソサザ）

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感應グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ゆみの白さぎ」は、対照品種「TMみるく」と比較して、舌状花の表面の状態がうね状であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）が平であること等で区別性が認められる。対照品種「精まいづる」と比較して、草丈がやや低であること、葉の周縁の二次欠刻の深さが浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

弓戸正道
広島県福山市新市町常2-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

弓戸正道

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 8 1 2 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. FISPLAMEA

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さは浅、葉の基部の形は鋭形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はアネモネ、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は多、頭花の舌状花の形の数 は 2、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形は管状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅はやや高、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は NN155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は 157D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はかなり大、花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）は 144B、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）は 154B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は 9 週間、開花習性は 10 月～11 月咲き（秋）である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「FISPLAMEA」は、対照品種「セイフォーセット」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さがかなり浅であること、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）がかなり大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子 607 番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Wain

7 出願公表の年月日 平成 2 4 年 2 月 2 0 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 8 1 3 号 平成 2 5 年 1 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. バーネット

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはかなり短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は大、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、舌状花の花筒の長さはやや長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅はやや高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は145D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は145C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「バーネット」は、対照品種「グリーンサタン」と比較して、草丈が中であること、頭花の舌状花の主要な形がさじ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

牛田豊文
愛知県愛西市金棒町東101

6 登録品種の育成をした者の氏名

牛田豊文

7 出願公表の年月日 平成 2 4 年 3 月 1 6 日