1 品種登録の番号及び年月日 第24140号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイパイオン

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数に1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は76C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は69D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイパイオン」は、対照品種「セイソリア」と比較して、葉の長さがやや長であること、葉の先端裂片の相対的な長さが中であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が平（巻かない）であること等で区別性が認められる。対照品種「セイピサ」と比較して、花らいの外側の色が75Dであること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が平（巻かない）であること、舌状花の表面の主な色が76Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第24141号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精京わらべ (セキョウワラベ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数に1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は72A、舌状花の表面の二次色はNN155C、舌状花の表面の二次色の分布は基部、舌状花の表面の二次色の型は一様又はほぼ一様、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は70A:NN155C(基部)、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精京わらべ」は、対照品種「精ちはる」と比較して、舌状花の表面の色数が2であること、舌状花の表面の主な色が72Aであること等で区別性が認められる。対照品種「あさくら」と比較して、葉の一次欠刻の深さが深であること、舌状花の表面の色数が2であること、舌状花の表面の主な色が72Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成25年5月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第24142号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精あいぼし (セイボシ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は7D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は4月～6月咲き（夏）、各開花習性における早晚性はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精あいぼし」は、対照品種「釣船」と比較して、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）が少であること、舌状花の表面の主な色が6Bであること等で区別性が認められる。対照品種「精かなた」と比較して、たく葉の大きさが中であること、葉の基部の形が円形であること、舌状花の表面の主な色が6Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成25年5月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第24143号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ワカミレイユ

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN155C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ワカミレイユ」は、対照品種「セイソリア」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、舌状花の表面の主な色がNN155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

和歌山県農業協同組合連合会
和歌山県和歌山市美園町五丁目1番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

谷畑翔

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24144号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀英 (シュウエイ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、よじれ、舌状花の長さは長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は4A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は6C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は極早、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は極多、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜上である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀英」は、対照品種「秀門」と比較して、頭花の舌状花の形の数が1であること、舌状花の表面の主な色が4Aであること等で区別性が認められる。対照品種「山手喜楽」と比較して、たく葉の大きさが小であること、頭花の舌状花の形の数が1であること、舌状花の表面の主な色が4Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成25年7月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第24145号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀まひろ (シュウマヒロ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数は2、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はかなり低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は72B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は76B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀まひろ」は、対照品種「えみり」と比較して、舌状花の表面の色数が1であること、舌状花の表面の主な色が72Bであること等で区別性が認められる。対照品種「はいね」と比較して、葉の基部の形が円形であること、舌状花の表面の主な色が72Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成25年7月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第24146号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀つきね (シユツキネ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はかなり小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は6B、舌状花の表面の二次色は7D、舌状花の表面の二次色の分布2は縁部、舌状花の表面の二次色の型はぼかし、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は5D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀つきね」は、対照品種「秀なごみ」と比較して、花序の形（叢生でない品種に限る）が平らな散房花序型であること、舌状花の縦断面の形状が平であること、舌状花の表面の主な色が6Bであること等で区別性が認められる。対照品種「秀やくし」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、葉の周縁の二次欠刻の深さが中であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成25年7月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第24147号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀みかげ (シュウミカゲ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は71A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は70B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は極晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀みかげ」は、対照品種「ますみ」と比較して、舌状花の表面の主な色が71Aであること、舌状花の裏面の色が70Bであること等で区別性が認められる。対照品種「かれん」と比較して、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）がかなり少であること、舌状花の表面の主な色が71Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成25年7月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第24148号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 常陸サニーバニラ (ヒタチサニーバニラ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155A、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「常陸サニーバニラ」は、対照品種「秀わたらせ」と比較して、舌状花の先端の形が丸であること等で区別性が認められる。対照品種「常陸サニーホワイト」と比較して、頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）が極少であること、舌状花の先端の形が丸であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

茨城県
茨城県水戸市笠原町978番6

6 登録品種の育成をした者の氏名

高津康正 鈴木一典 小松拓真 田附博 霞正一 常見高士

7 出願公表の年月日 平成25年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24149号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 常陸サマールージュ (ヒタチサマールージュ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数に1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は72B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は77C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「常陸サマールージュ」は、対照品種「常陸サマールビー」と比較して、花らしいの外表面の色がN79Cであること、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「やよい」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

茨城県
茨城県水戸市笠原町978番6

6 登録品種の育成をした者の氏名

高津康正 鈴木一典 霞正一

7 出願公表の年月日 平成25年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24150号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 常陸サマーシルキー (ヒタチサマーシルキー)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数に1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「常陸サマーシルキー」は、対照品種「白精ひなの」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、舌状花の先端の形が丸であること等で区別性が認められる。対照品種「常陸サマースノウ」と比較して、茎の色が紫又は褐を帯びた緑であること、たく葉の大きさがかなり小であること、花序の形（叢生でない品種に限る）が散房花序型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

茨城県
茨城県水戸市笠原町978番6

6 登録品種の育成をした者の氏名

高津康正 鈴木一典 霞正一 常見高士

7 出願公表の年月日 平成25年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24151号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイカゼルタ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はかなり低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は71A、舌状花の表面の二次色は76D、舌状花の表面の二次色の分布は先端部1/4、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は70B:76D(先端部)、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイカゼルタ」は、対照品種「セイロゼア」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、舌状花の表面の主な色が71Aであること、舌状花の表面の二次色が76Dであること等で区別性が認められる。対照品種「バラード」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、花らいの外面の色が71Aであること、舌状花の表面の主な色が71Aであること、舌状花の表面の二次色が76Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鶉飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成25年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24152号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイエンナ

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は72B、舌状花の表面の二次色はNN155C、舌状花の表面の二次色の分布は先端部1/4、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は70B:NN155C（縁部）、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイエンナ」は、対照品種「セイカゼルタ」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが接近すること、葉の基部の形が鈍形であること、頭花の直径（摘らいしていないもの）が中であること、舌状花の表面の主な色が72Bであること等で区別性が認められる。対照品種「キノキャンドル」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが接近すること、花らいの外面の色が71Aであること、舌状花の先端の形が歯状であること、舌状花の表面の主な色が72Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鶴飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成25年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24153号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイセウタ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや大、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数に1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は69D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイセウタ」は、対照品種「セイリポル」と比較して、たく葉の大きさが中であること、葉の基部の形が凹形であること等で区別性が認められる。対照品種「セイアイシス」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、舌状花の先端の形が突起状であること、舌状花の表面の主な色が75Dであること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が8週間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成25年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24154号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精あさしお (セイサシオ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはかなり短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数に1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN155C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は4月～6月咲き（夏）、各開花習性における早晚性は極晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精あさしお」は、対照品種「いそべ」と比較して、葉の長さがかなり短であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が平であること、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「精春しずか」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成25年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24155号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ミレーナ

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数には1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はかなり斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は75C、舌状花の表面の二次色はN74C、舌状花の表面の二次色の分布は基部1/4、舌状花の表面の二次色の型はぼかし、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は75D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミレーナ」は、対照品種「アリエス」と比較して、舌状花の表面の主な色が75Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ルグラン」と比較して、舌状花の表面の状態がキールであること、舌状花の表面の主な色が75Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

全国農業協同組合連合会
東京都千代田区大手町一丁目3番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

椎名宏太 荻野智洋

7 出願公表の年月日 平成25年8月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第24156号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイビトリア

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は155A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155A、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイビトリア」は、対照品種「セイダロカ」と比較して、花らいの外面の色が11Cであること、舌状花の表面の主な色が155Aであること等で区別性が認められる。対照品種「セイイレルダ」と比較して、たく葉の大きさが中であること、花らいの外面の色が11Cであること、舌状花の表面の主な色が155Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成25年8月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第24157号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精ことほ (セイコトホ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はかなり斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は12A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は9B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精ことほ」は、対照品種「精春やまと」と比較して、花らいの外面の色が13Aであること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がわずかに凹であること、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「精こまき」と比較して、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がわずかに凹であること、舌状花の先端の形が歯状であること、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成25年8月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第24158号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ゆみ奴 (ユミッコ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数に1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はかなり斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は70B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は77C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は4月～6月咲き（夏）、各開花習性における早晚性は極晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ゆみ奴」は、対照品種「精ゆめの」と比較して、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い内巻きであること、舌状花の表面の主な色が70Bであること等で区別性が認められる。対照品種「精さきえ」と比較して、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）がやや少であること、舌状花の表面の主な色が70Bであること等で区別性が認められる。対照品種「紅織」と比較して、舌状花の表面の主な色が70Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

弓戸正道
広島県福山市新市町常2-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

弓戸正道

7 出願公表の年月日 平成25年8月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第24159号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精あやおり (セイヤ刈)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は84C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は4月～6月咲き（夏）、各開花習性における早晚性はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精あやおり」は、対照品種「紅織」と比較して、舌状花の表面の主な色が75Aであること等で区別性が認められる。対照品種「精ことひら」と比較して、舌状花の表面の主な色が75Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成25年10月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第24160号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 笑の空 (シヨウノソラ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたしたもの）はやや大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は3以上、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形は管状、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはかなり長、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はかなり高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は極晩、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はかなり少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「笑の空」は、対照品種「笑の伯」と比較して、頭花の舌状花の形の数が3以上であること、舌状花の長さ／幅がかなり高であること等で区別性が認められる。対照品種「笑の聖」と比較して、葉の基部の形が鈍形であること、頭花の舌状花の形の数が3以上であること、舌状花の先端の形が歯状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小井戸輝雄
長野県松本市元町一丁目1番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名

小井戸輝雄

7 出願公表の年月日 平成25年11月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第24161号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 紅ひかりK1号 (ベニヒカリk1コリ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はかなり小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN74D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は77D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は4月～6月咲き（夏）、各開花習性における早晚性はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「紅ひかりK1号」は、対照品種「精さきえ」と比較して、舌状花の表面の主な色がN74Dであること等で区別性が認められる。対照品種「よいまち」と比較して、舌状花の表面の主な色がN74Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

古西好昭
兵庫県丹波市山南町和田304番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名

古西好昭

7 出願公表の年月日 平成25年11月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第24162号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精いつみ (セイツミ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN78B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は77D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精いつみ」は、対照品種「精ひかた」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが接近するであること、舌状花の表面の主な色がN78Bであること等で区別性が認められる。対照品種「精ひなの」と比較して、葉の基部の形が円形であること、舌状花の表面の主な色がN78Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成25年11月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第24163号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精朝づくよ (セイサヅクヨ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはかなり短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは極深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はかなり斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は7D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は4月～6月咲き（夏）、各開花習性における早晩性は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精朝づくよ」は、対照品種「精あいぼし」と比較して、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）が中であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がわずかに凸であること、舌状花の先端の形が突起状であること等で区別性が認められる。対照品種「釣船」と比較して、葉の長さがかなり短であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がわずかに凸であること、舌状花の表面の主な色が5Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成25年11月22日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第24164号 平成27年3月25日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. スプレーアイチ夏1号 (スプレーイチツツイコ[®]リ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はかなり小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は5D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「スプレーアイチ夏1号」は、対照品種「オルカ」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さが中であること、舌状花の表面の主な色が5Cであること等で区別性が認められる。対照品種「イエロークラリス」と比較して、舌状花の先端の形が突起状であること、舌状花の表面の主な色が5Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
全国農業協同組合連合会
東京都千代田区大手町一丁目3番1号
愛知県
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
椎名宏太 荻野智洋 長谷川徹 野村浩二 鬼頭温文 青木猷 渡邊孝政 竹内良彦 山本雅春 石川高史 伊藤健二 二村幹雄 大石一史
- 7 出願公表の年月日 平成26年1月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第24165号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精なからい (セイカライ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはかなり短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は9A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は6C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は4月～6月咲き（夏）、各開花習性における早晚性はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精なからい」は、対照品種「精こまき」と比較して、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）が斜上であること、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）が黄緑であること、各開花習性における早晚性がかなり晩であること等で区別性が認められる。対照品種「釣船」と比較して、葉の長さがかなり短であること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成26年2月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第24166号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ゆみ盤溪 (ユミバンケイ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数に1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はかなり斜上、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は12B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は12C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ゆみ盤溪」は、対照品種「黄奴」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、舌状花の表面の主な色が12Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ゆみ黄の実」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、葉の裂片縁部の重なりが平行であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

弓戸正道
広島県福山市新市町常2-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

弓戸正道

7 出願公表の年月日 平成26年2月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第24167号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ゆみ北光 (ユミホッコウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはかなり短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は5C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は極晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ゆみ北光」は、対照品種「ゆみ黄金」と比較して、草丈がかなり高であること、頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）が極少であること、舌状花の先端の形が歯状であること等で区別性が認められる。対照品種「精玉かずら」と比較して、舌状花の先端の形が歯状であること、舌状花の表面の主な色が3Aであること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が平であること、花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）が淡黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

弓戸正道
広島県福山市新市町常2-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

弓戸正道

7 出願公表の年月日 平成26年2月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第24168号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ゆみ竹丸 (ユミタケマル)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はかなり小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数に1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は8C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ゆみ竹丸」は、対照品種「精さとみ」と比較して、花序の形（叢生でない品種に限る）が散房花序型であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）が平であること、舌状花の表面の主な色が6Aであること等で区別性が認められる。対照品種「なつき」と比較して、葉の一次欠刻の深さが深であること、舌状花の先端の形が丸であること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

弓戸正道
広島県福山市新市町常2-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

弓戸正道

7 出願公表の年月日 平成26年2月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第24169号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ゆみさや

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はかなり斜上、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は71A、舌状花の表面の二次色は70B、舌状花の表面の二次色の分布2は縁部、舌状花の表面の二次色の型はぼかし、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は77C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晩性はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ゆみさや」は、対照品種「ゆみのこい」と比較して、花序の形（叢生でない品種に限る）が深いドーム形であること、頭花の舌状花の主要な形がさじ状であること、舌状花の表面の主な色が71Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ゆみの花子」と比較して、葉の基部の形が円形であること、頭花の舌状花の主要な形がさじ状であること、舌状花の表面の色数が2であること、舌状花の表面の主な色が71Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ゆみ202」と比較して、葉の基部の形が円形であること、頭花の舌状花の主要な形がさじ状であること、舌状花の表面の主な色が71Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

弓戸正道
広島県福山市新市町常2-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

弓戸正道

7 出願公表の年月日 平成26年2月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第24170号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ゆみ志 (ユミコサシ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはかなり短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数に1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晩性は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ゆみ志」は、対照品種「白帆」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数がやや少であること、舌状花の表面の主な色がNN155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「精あきさめ」と比較して、草丈が中であること、葉の周縁の二次欠刻の数がやや少であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）が平であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

弓戸正道
広島県福山市新市町常2-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

弓戸正道

7 出願公表の年月日 平成26年2月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第24171号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ゆみASDF

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはかなり短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN81D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN80C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は極晩である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ゆみASDF」は、対照品種「ゆみあかとんぼ」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが重なること、頭花の舌状花の主要な形が舌状であること、舌状花の表面の主な色がN81Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

弓戸正道
広島県福山市新市町常2-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

弓戸正道

7 出願公表の年月日 平成26年4月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第24172号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精灯 (セイトリ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、頭花の型は八重、頭花の直径(摘らいたもの)は中、頭花の舌状花の粗密(露心する八重及び八重品種に限る)はやや粗、頭花の舌状花の形の数は3以上、頭花の舌状花の主要な形は船底状、頭花の舌状花の二次的な形は管状、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは長、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性(ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む)は類似する、舌状花の裏面の色は8B、開花習性は7月～9月咲き(夏秋)、各開花習性における早晚性は極早、側枝の多少(切り花用一輪ギク品種に限る)はやや多、舌状花の基部の向き(露心する八重及び八重品種に限る)はやや斜上である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「精灯」は、対照品種「精の曲」と比較して、花らいの外表面の色が2Cであること、頭花の舌状花の形の数が3以上であること等で区別性が認められる。対照品種「精菱」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、花らいの外表面の色が2Cであること、頭花の舌状花の形の数が3以上であること、舌状花の表面の主な色が6Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成26年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第24173号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精春あられ (セイハアラレ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は9A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は9C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精春あられ」は、対照品種「釣船」と比較して、花序の形（叢生でない品種に限る）が深いドーム形であること、花らいの外面の色が13Bであること等で区別性が認められる。対照品種「精あいぼし」と比較して、たく葉の大きさが小であること、花序の形（叢生でない品種に限る）が深いドーム形であること、花らいの外面の色が13Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成26年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第24174号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DELIRAFFICA PEARL

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は一重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはやや長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色はN74D、舌状花の表面の二次色はNN155C、舌状花の表面の二次色の分布2は縁部、舌状花の表面の二次色の型はぼかし、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は6.5週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELIRAFFICA PEARL」は、対照品種「DELIRAFFICA」と比較して、舌状花の表面の主な色がN74Dであること、舌状花の裏面の色がNN155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ランブラ」と比較して、舌状花の表面の主な色がN74Dであること、舌状花の裏面の色がNN155Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS, Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

中川新一

7 出願公表の年月日 平成26年4月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第24175号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀盃 (シュウハイ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は9A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は8A、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性はかなり早、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は中、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀盃」は、対照品種「金扇立花」と比較して、頭花の舌状花の形の数が1であること、頭花の舌状花の主要な形が船底状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成26年4月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第24176号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 寄の山陽 (キナソウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は2、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形は管状、舌状花の花筒の長さはやや長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはかなり長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は7B、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は極早、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はかなり少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜上である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「寄の山陽」は、対照品種「寄の瞬き」と比較して、頭花の舌状花の形の数が2であること、頭花の舌状花の主要な形がさじ状であること等で区別性が認められる。対照品種「寄の縁」と比較して、頭花の舌状花の主要な形がさじ状であること、頭花の舌状花の二次的な形が管状であること、舌状花の先端の形が丸であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

寄能節雄
広島県福山市新市町常1598番地2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

寄能節雄

7 出願公表の年月日 平成26年4月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第24177号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精秋はやと (セイキハト)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は5B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は淡黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用） 願品種「精秋はやと」は、対照品種「精ひこね」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、葉の基部の形が円形であること、舌状花の表面の主な色が6Bであること等で区別性が認められる。対照品種「精やすらぎ」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、花らいの外面の色が6Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成26年4月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第24178号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精の蜂 (セイハチ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は2、頭花の舌状花の主要な形は船底状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は9A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は9C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2は12週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は多、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精の蜂」は、対照品種「精の新」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや浅であること、頭花の舌状花の形の数が2であること、舌状花の表面の主な色が9Aであること、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）が多であること等で区別性が認められる。対照品種「精の輝」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや浅であること、頭花の舌状花の形の数が2であること、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成26年4月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第24179号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 小夏の星 (コツボシ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数に2、頭花の舌状花の主要な形は舌状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は9A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は9B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「小夏の星」は、対照品種「小夏の月」と比較して、頭花の舌状花の形の数に2であること、舌状花の表面の主な色が9Aであること、各開花習性における早晚性が極早であること等で区別性が認められる。対照品種「小星」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが接するであること、頭花の舌状花の形の数に2であること、舌状花の表面の主な色が9Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

群馬県
群馬県前橋市大手町一丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

村崎衣里 島田景 堀口数子

7 出願公表の年月日 平成26年5月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第24180号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精瑚 (セイゴ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は72A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN80C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2は12週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精瑚」は、対照品種「精妃」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、葉の基部の形が円形であること、舌状花の表面の主な色が72Aであること等で区別性が認められる。対照品種「精染」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、葉の基部の形が円形であること、舌状花の表面の主な色が72Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成26年5月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第24181号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイラティマー

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は76C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイラティマー」は、対照品種「セイマヨール」と比較して、花らいの外面の色が75Bであること、舌状花の先端の形が突起状であること、舌状花の表面の主な色が75Dであること等で区別性が認められる。対照品種「セイアイシス」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、舌状花の先端の形が突起状であること、舌状花の表面の主な色が75Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成26年5月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第24182号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華の欄 (コッカラン)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色はN74C、舌状花の表面の二次色はNN155C、舌状花の表面の二次色の分布は基部1/4、舌状花の表面の二次色の型はぼかし、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は76D、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はかなり低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華の欄」は、対照品種「国華重文」と比較して、葉の基部の形が鈍形であること、舌状花の表面の主な色がN74Cであること等で区別性が認められる。対照品種「国華赤富士」と比較して、葉の基部の形が鈍形であること、舌状花の表面の主な色がN74Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成26年5月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第24183号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華鞍馬 (コッカグラマ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは極長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は2、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155A、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）はさじ状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華鞍馬」は、対照品種「国華水滸伝」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、頭花の舌状花の形の数が2であること、舌状花の表面の主な色がNN155Aであること等で区別性が認められる。対照品種「国華正倉」と比較して、舌状花の花筒の長さがやや短であること、舌状花の表面の主な色がNN155Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成26年5月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第24184号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華賀宴 (コッカ[®]エン)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはかなり長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は3D、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華賀宴」は、対照品種「国華神竜」と比較して、頭花の舌状花の形の数が1であること、舌状花の花筒の長さが極短であること等で区別性が認められる。対照品種「国華寿杯」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、舌状花の裏面の色が3Dであること等で区別性が認められる。対照品種「国華吉兆」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや浅であること、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成26年5月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第24185号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華の湖 (コッカノ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはかなり長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は3以上、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は69C、舌状花の表面の二次色はNN155C、舌状花の表面の二次色の分布は基部1/4、舌状花の表面の二次色の型はぼかし、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は69C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は管状1、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はやや低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華の湖」は、対照品種「国華夫婦」と比較して、頭花の舌状花の形の数が3以上であること、舌状花の裏面の色が69Cであること等で区別性が認められる。対照品種「国華待望」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、舌状花の表面の主な色が69Cであること、舌状花の裏面の色が69Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成26年5月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第24186号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華高飛 (コッカカトビ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは大、葉の長さは極長、葉の幅は極広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華高飛」は、対照品種「国華百代」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、葉の周縁の二次欠刻の深さがかなり浅であること等で区別性が認められる。対照品種「国華理想郷」と比較して、たく葉の大きさが大であること、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、葉の基部の形が凹形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成26年5月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第24187号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華主砲 (コッカシユホ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはかなり長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数は2、舌状花の花筒の長さは中、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色はN74D、舌状花の表面の二次色はNN155C、舌状花の表面の二次色の分布は先端部1/4、舌状花の表面の二次色の型はぼかし、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は75D、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）はさじ状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はやや低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華主砲」は、対照品種「国華太上」と比較して、葉の基部の形が鈍形であること、舌状花の裏面の色が75Dであること等で区別性が認められる。対照品種「国華万福」と比較して、葉の基部の形が鈍形であること、舌状花の裏面の色が75Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成26年5月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第24188号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華寿の祝 (コッカコブキノワイ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは極長、葉の幅は極広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は4C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は4D、開花習性は10月～11月咲き

（秋）、各開花習性における早晚性は中、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華寿の祝」は、対照品種「国華寿杯」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、葉の一次欠刻の深さがやや深であること、葉の基部の形が凹形であること等で区別性が認められる。対照品種「国華吉兆」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成26年5月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第24189号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華松竹梅 (コッカシヨウチクハイ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはかなり長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数3以上、舌状花の花筒の長さは長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は5D、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや晩、頭花の直径（摘らいた觀賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいた觀賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（觀賞ぎくに限る）はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形（觀賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は下、舌状花の長さ（觀賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（觀賞ぎくに限る）は中、舌状花の長さ／幅の比（觀賞ぎくに限る）はやや低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華松竹梅」は、対照品種「国華発祥」と比較して、舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）がかなり強であること、舌状花の表面の主な色が5Cであること、頭花の舌状花の二次的な形（觀賞ぎくに限る）が船底状であること等で区別性が認められる。対照品種「国華神竜」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが接するであること、頭花の舌状花の形の数3以上であること、舌状花の花筒の長さが長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成26年5月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第24190号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華の夢 (コッカノユメ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは大、葉の長さは極長、葉の幅は極広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは浅、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN74C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は77D、開花習性は10月～11月咲き

（秋）、各開花習性における早晩性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや小、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華の夢」は、対照品種「国華万福」と比較して、頭花の舌状花の形の数が1であること、舌状花の裏面の色が77Dであること等で区別性が認められる。対照品種「国華赤富士」と比較して、舌状花の表面の主な色がN74Cであること、舌状花の裏面の色が77Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成26年5月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第24191号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華の印 (コッカシルシ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはかなり長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性は晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）はさじ状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はやや低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華の印」は、対照品種「国華佑弥」と比較して、頭花の舌状花の形の数が1であること、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）がさじ状であること等で区別性が認められる。対照品種「国華の伊」と比較して、舌状花の花筒の長さが長であること、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）がさじ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成26年5月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第24192号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精けいか (セクイカ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はかなり斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は9A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は9C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精けいか」は、対照品種「精はぎの」と比較して、葉の基部の形が円形であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がわずかに凹であること等で区別性が認められる。対照品種「精つくばね」と比較して、葉の基部の形が円形であること、舌状花の先端の形が突起状であること、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）が黄緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第24193号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精はんな (セイハナ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数に1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は71B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN70B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精はんな」は、対照品種「精ちぐさ」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さが長であること、舌状花の表面の主な色が71Bであること等で区別性が認められる。対照品種「舞人」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さが長であること、舌状花の表面の主な色が71Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第24194号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精りゅうこ (セリュウコ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度

(叢生でない品種に限る)は中、頭花の型は半八重、花盤の型(八重及び露心する八重品種を除く)はデイジー、頭花の直径(摘らいしていないもの)は小、頭花の舌状花数

(一重及び半八重品種に限る)はかなり少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き(一重及び半八重品種に限る)は斜上、舌状花

の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形(管状でない舌状花)はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花

の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は9A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性(ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む)は類似する、舌状花の裏面の色は7B、花盤の頭花に対する直径の大きさ(一重及び半八重品種に限る)はやや大、花盤の開やく前の色の区分(デイジー型の品種に限る)は黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無(デイジー型の品種に限る)は無、開花習性は

7月～9月咲き(夏秋)、各開花習性における早晚性はかなり晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「精りゅうこ」は、対照品種「精秋はやと」と比較して、たく葉の大きさが中であること、葉の基部の形が凹形であること、一茎当たりの頭花の総数(叢生でない品種に限る)がやや少であること、舌状花の最大幅部の横断面の形(管状でない舌状花)がわずかに凸であること、花盤の断面の形(デイジー型の品種に限る)が平であること等で区別性が認められる。対照品種「精ひこね」と比較して、舌状花の最大幅部の横断面の形(管状でない舌状花)がわずかに凸であること、花盤の断面の形(デイジー型の品種に限る)が平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鶴飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第24195号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. マイパレード

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは長、葉の幅は広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや大、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は広、舌状花の長さ／幅はかなり低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は84C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は76D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「マイパレード」は、対照品種「セレナ」と比較して、葉の基部の形が鈍形であること、花らいの外面の色が75Cであること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）がややドーム状であること等で区別性が認められる。対照品種「マイナタリー」と比較して、舌状花の表面の主な色が84Cであること、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）が緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

加藤由博
長野県南佐久郡佐久穂町大字海瀬4727番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

加藤由博

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第24196号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精ひづる (セヒヅル)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはかなり短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はかなり小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は9A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は8A、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精ひづる」は、対照品種「精はぎの」と比較して、花らいの外面の色が13Aであること、舌状花の先端の形が歯状であること等で区別性が認められる。対照品種「精けいか」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、花らいの外面の色が13Aであること、舌状花の先端の形が歯状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第24197号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ユンホ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは長、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はかなり小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数に1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は75D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ユンホ」は、対照品種「アリエス」と比較して、舌状花の表面の主な色が75Dであること、舌状花の裏面の色が75Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ルグラン」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数が多いこと、舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が75Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

全国農業協同組合連合会
東京都千代田区大手町一丁目3番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

荻野智洋

7 出願公表の年月日 平成26年8月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第24198号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. リヒター

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はかなり小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「リヒター」は、対照品種「クラリス」と比較して、たく葉の大きさが中であること、葉の周縁の二次欠刻の数が多いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

全国農業協同組合連合会
東京都千代田区大手町一丁目3番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

荻野智洋

7 出願公表の年月日 平成26年8月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第24199号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精きみよ (セキミヨ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数に1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はかなり斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は7A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は6C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精きみよ」は、対照品種「精はぎの」と比較して、花らいの外側の色が6Aであること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）がややドーム状であること、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「精けいか」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）がややドーム状であること、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鶴飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成26年8月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第24200号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精わくみ (セワクミ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数に1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は72A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は75A、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は淡黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精わくみ」は、対照品種「精いまよう」と比較して、舌状花の表面の主な色が72Aであること等で区別性が認められる。対照品種「精はやま」と比較して、舌状花の表面の主な色が72Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成26年8月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第24201号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精みふね (セイフネ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはかなり短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは極深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数に1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN74C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN74D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精みふね」は、対照品種「精桃こまち」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、葉の基部の形が凹形であること、舌状花の表面の主な色がN74Cであること等で区別性が認められる。対照品種「精はちす」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、葉の基部の形が凹形であること、舌状花の表面の色数が1であること、舌状花の表面の主な色がN74Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成26年8月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第24202号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. カサンドラ

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、株幅は広、葉の粗密は密、若葉の葉身の色1は166B、若葉の葉身の色1の分布は全体の葉脈間、若葉の葉身の色1の様子は均一、若葉の葉身の色1の面積はやや大、若葉の葉身の色2はN199C、若葉の葉身の色2の分布は葉脈に沿う、若葉の葉身の色2の様子はぼかし、若葉の葉身の色2の面積は小、若葉の葉身の色3の分布は無、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さはやや長、葉柄の毛の粗密は密、葉柄の主な色は186A、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の長さ／幅は中、葉身の先端部の形は鋭形、葉身裂片の切れ込みの深さは中、葉身の周縁部の欠刻の数は極多、葉身の周縁部の欠刻の深さは中、葉身の周縁部の波打ちの強弱は中、葉身のしわは弱、葉身の光沢は無又は極弱、葉身の毛の粗密は密、葉身の裏面の毛の粗密は密、葉身の色1は174B、葉身の色1の分布は全体の葉脈間、葉身の色1の様子は均一、葉身の色1の面積はやや大、葉身の色2はN199A、葉身の色2の分布は葉脈に沿う、葉身の色2の様子はぼかし、葉身の色2の面積は小、葉身の色3の分布は無、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色は186Aである。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「カサンドラ」は、対照品種「CAMEL」と比較して、葉身の先端部の形が鋭形であること、葉身のしわが弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Sandrine Delabroye
43 Rue Mirabeau 59496 Hantay, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Sandrine Delabroye

7 出願公表の年月日 平成22年9月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第24203号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. ミヨダイナバイオレット

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、花序の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は有、花茎の長さはかなり長、花茎の太さは太、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は中、花茎の翼の波打ちの強弱はやや強、一次分枝部のたく葉の長さはやや短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはかなり長、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数はかなり多、がくの長さは長、がくの直径は大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN88A、がくの中肋の色はNN155A、花冠の大きさはやや大、花冠の型はⅠ型、花冠の色はNN155B、開花始期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ミヨダイナバイオレット」は、対照品種「ミヨラスアメジスト」と比較して、がくの主な色がN88Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ミッドナイトブルー」と比較して、草丈が高であること、一次分枝の長さがかなり長であること等で区別性が認められる。対照品種「スマッシュバイオレット」と比較して、花序の数がかなり多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇山嘉秀

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24204号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. コロナディープブルー

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、花序の数はかなり少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は濃、葉の光沢の強弱はやや強、葉の周縁の波打ちの強弱はやや弱、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は無、花茎の長さはやや長、花茎の太さは中、花茎の色は緑、一次分枝部のたく葉の長さは短、花序の型はⅣ型、一次分枝の長さはやや短、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は斜上、花序の花数は中、がくの長さは短、がくの直径は小、がくの形は鐘形、がくの主な色は84A、がくの中肋の色は138B、花冠の大きさは中、花冠の型はⅡ型、花冠の色は90D、開花始期は晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「コロナディープブルー」は、対照品種「コロナパープル」と比較して、葉の周縁の波打ちの強弱がやや弱であること、花冠の色が90Dであること等で区別性が認められる。対照品種「コロナブルー」と比較して、葉の周縁の波打ちの強弱がやや弱であること、花冠の色が90Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ヒルアルミク」と比較して、花冠の色が90Dであること、やくに対する柱頭の位置が同位であること、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇山嘉秀

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24205号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. コロナパープル

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、花序の数はかなり少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉身の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は濃、葉の光沢の強弱はやや強、葉の周縁の波打ちの強弱は強、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は無、花茎の長さは長、花茎の太さは中、花茎の色は緑、一次分枝部のたく葉の長さは短、花序の型はⅣ型、一次分枝の長さはやや短、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は斜上、花序の花数はやや多、がくの長さは短、がくの直径は小、がくの形は鐘形、がくの主な色は84A、がくの中肋の色は138B、花冠の大きさは中、花冠の型はⅡ型、花冠の色はN87C、開花始期は晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「コロナパープル」は、対照品種「コロナディープブルー」と比較して、葉の周縁の波打ちの強弱が強であること、花冠の色がN87Cであること等で区別性が認められる。対照品種「コロナブルー」と比較して、草丈が高であること、がくの主な色が84Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ヒルアルミク」と比較して、やくに対する柱頭の位置が同位であること、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇山嘉秀

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24206号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. コロナブルー

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、花序の数はかなり少、葉の長さは中、葉の幅は中、葉身の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は濃、葉の光沢の強弱はやや強、葉の周縁の波打ちの強弱は強、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は無、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の色は緑、一次分枝部のたく葉の長さは短、花序の型はⅣ型、一次分枝の長さは短、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は斜上、花序の花数はやや多、がくの長さは短、がくの直径は小、がくの形は鐘形、がくの主な色はN82D、がくの中肋の色は138B、花冠の大きさは中、花冠の型はⅡ型、花冠の色はN87C、開花始期はやや晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「コロナブルー」は、対照品種「コロナディープブルー」と比較して、葉の周縁の波打ちの強弱が強であること、花冠の色がN87Cであること等で区別性が認められる。対照品種「コロナパープル」と比較して、草丈が中であること、がくの主な色がN82Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ヒルアルミク」と比較して、やくに対する柱頭の位置が同位であること、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇山嘉秀

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24207号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. ブルーポイント

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、花序の数はやや多、葉の長さは中、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱はやや弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さはかなり長、花茎の太さは中、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちの強弱は弱、一次分枝部のたく葉の長さは中、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは長、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数はやや少、がくの長さは中、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN87B、がくの中肋の色は184B、花冠の大きさは小、花冠の型はⅠ型、花冠の色はNN155A、開花始期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ブルーポイント」は、対照品種「リウスブルー」と比較して、がくの主な色がN87Bであること、がくの中肋の色が184Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

徳弘晃二 北村里美

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24208号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSパールオランジュ

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、花序の数はやや多、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱はやや弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は有、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちの強弱はやや弱、一次分枝部のたく葉の長さはかなり短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは中、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は直立、花序の花数は中、がくの長さは長、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は49D、がくの中肋の色は157C、花冠の大きさは小、花冠の型はⅠ型、花冠の色は155B、開花始期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TSパールオランジュ」は、対照品種「TSピーチアノー」と比較して、花序の数がやや多であること、葉柄の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「TSルージュオランジュ」と比較して、がくの主な色が49Dであること、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。対照品種「アルテミスピンク」と比較して、がくの主な色が49Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24209号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSピーチアノー

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、花序の数は少、葉の長さはやや長、葉の幅は広、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡はやや淡、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱はやや弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は有、花茎の長さは長、花茎の太さは太、花茎の色は緑、花茎の翼の幅はやや狭、花茎の翼の波打ちの強弱はやや弱、一次分枝部のたく葉の長さはやや短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはかなり長、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は直立、花序の花数はやや多、がくの長さはやや長、がくの直径はかなり大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は27B、がくの中肋の色は157C、花冠の大きさはやや大、花冠の型はⅠ型、花冠の色は155A、開花始期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TSピーチアノー」は、対照品種「TSパールオランジュ」と比較して、花序の数が少であること、葉柄の長さが極長であること等で区別性が認められる。対照品種「TSルージュオランジュ」と比較して、がくの主な色が27Bであること、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。対照品種「アルテミスピンク」と比較して、がくの主な色が27Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24210号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSピンクファム

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、花序の数は多、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちの強弱はやや弱、一次分枝部のたく葉の長さは短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは中、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は直立、花序の花数は中、がくの長さは長、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は75A、がくの中肋の色は155C、花冠の大きさは中、花冠の型はⅠ型、花冠の色はNN155A、開花始期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TSピンクファム」は、対照品種「アルテミスピンク」と比較して、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。対照品種「プレミィソフトピンク」と比較して、葉の切れ込みの強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。対照品種「TSオーキッドフレール」と比較して、花序の数が多であること、がくの主な色が75Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24211号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSブランバニラ

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、花序の数は多、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱はやや弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さは長、花茎の太さはやや細、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちの強弱はやや弱、一次分枝部のたく葉の長さは中、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはやや短、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数は中、がくの長さはやや長、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はNN155D、がくの中肋の色は155D、花冠の大きさはやや大、花冠の型はⅢ型、花冠の色は150D、開花始期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TSブランバニラ」は、対照品種「TS スノー フレール」と比較して、花冠の型がⅢ型であること、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。対照品種「アイスバーグ」と比較して、花茎の翼の波打ちの強弱がやや弱であること、花冠の型がⅢ型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24212号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSルージュオランジュ

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、花序の数はやや多、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡はやや濃、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さは中、花茎の太さはやや細、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちの強弱は弱、一次分枝部のたく葉の長さはかなり短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはやや短、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は直立、花序の花数は中、がくの長さは長、がくの直径は極大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は39C、がくの中肋の色は157C、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅠ型、花冠の色は8D、開花始期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TSルージュオランジュ」は、対照品種「TSパールオランジュ」と比較して、がくの主な色が39Cであること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。対照品種「TSピーチアノー」と比較して、がくの主な色が39Cであること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。対照品種「アルテミスピンク」と比較して、がくの主な色が39Cであること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24213号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSルージュペチ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、花序の数は中、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱はやや強、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さは長、花茎の太さは中、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちの強弱はやや弱、一次分枝部のたく葉の長さはかなり短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはやや長、花序の分枝性はやや強、分枝の方向は直立、花序の花数はかなり多、がくの長さは中、がくの直径はかなり大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は63B、がくの中肋の色は157D、花冠の大きさはかなり小、花冠の型はⅠ型、花冠の色はNN155B、開花始期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TSルージュペチ」は、対照品種「TSロイヤルオランジュ」と比較して、がくの主な色が63Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ティーエスマナリザ」と比較して、がくの主な色が63Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24214号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSロイヤルオランジュ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、花序の数は中、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さは長、花茎の太さは中、花茎の色は緑、花茎の翼の幅はかなり狭、花茎の翼の波打ちの強弱は弱、一次分枝部のたく葉の長さはやや短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは長、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数はかなり多、がくの長さはやや長、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は58D、がくの中肋の色は157C、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅠ型、花冠の色はNN155B、開花始期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TSロイヤルオランジュ」は、対照品種「TSルージュペチ」と比較して、がくの主な色が58Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ダイナローズ」と比較して、がくの主な色が58Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24215号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSロシアンフルール

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、花序の数はやや少、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱はやや弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花茎の長さは長、花茎の太さは中、花茎の色は緑、花茎の翼の幅はやや狭、花茎の翼の波打ちの強弱は中、一次分枝部のたく葉の長さはやや長、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは中、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数は多、がくの長さはやや長、がくの直径は大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は76C、がくの中肋の色は158B、花冠の大きさは小、花冠の型はⅠ型、花冠の色は2B、開花始期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TSロシアンフルール」は、対照品種「TS桜並木フルール」と比較して、がくの主な色が76Cであること、花冠の色が2Bであること等で区別性が認められる。対照品種「プレミソフトピンク」と比較して、がくの主な色が76Cであること、花冠の色が2Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24216号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TS桜並木フルール (TSサクラミフルール)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、花序の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は有、花茎の長さは長、花茎の太さは中、花茎の色は緑、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちの強弱はやや弱、一次分枝部のたく葉の長さはやや短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはかなり長、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数はやや多、がくの長さはやや長、がくの直径は大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は75C、がくの中肋の色は157C、花冠の大きさは中、花冠の型はⅠ型、花冠の色はNN155A、開花始期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TS桜並木フルール」は、対照品種「TSロシアンフルール」と比較して、がくの主な色が75Cであること、花冠の色がNN155Aであること等で区別性が認められる。対照品種「プレミィソフトピンク」と比較して、がくの主な色が75Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24217号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vaccinium L. フロリダローズ

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の大きさはやや小、樹姿は斜上、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや大、葉の形は楕円、葉の先端部の形は鋭、葉の表面の色は緑、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る）は中、葉の周縁の型は鋸歯縁、花序の長さは中、花冠の形はつぼ、花冠の色は白、花筒の大きさは中、花筒のアントシアニン着色の強弱は極弱、花筒の稜の有無は有、果房の着生密度は中、未熟果の緑色の濃淡はかなり淡、果実の大きさはやや大、果実の縦断面の形は円、果柄痕の大きさは小、がくあの形は円、がく片の向きは水平、がく片の反り方は内曲、がくあの直径は中、がくあの深さは中、果粉の程度は弱、果皮の色は青赤、果実の硬さはやや軟、果肉の色は淡黄、糖度は少、酸度は多、着果習性は前年枝のみ、裂果性は中、前年枝の果実の成熟期はやや晩、収穫期間は長である。

出願品種「フロリダローズ」は、対照品種「Tifblue」と比較して、果粉の程度が弱であること、果皮の色が青赤であること等で区別性が認められる。

対照品種「Climax」と比較して、葉の先端部の形が鋭であること、果粉の程度が弱であること、果皮の色が青赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Florida Foundation Seed Producers, Inc.
3913 Hwy 71, Greenwood, Florida 32443 USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Paul M. Lyrene

7 出願公表の年月日 平成21年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第24218号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vaccinium L. ケラアンブルー

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の大きさは中、樹姿は開張、前年枝の色は赤褐、前年枝の長さは中、前年枝の節間長は中、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや大、葉の形は楕円、葉の先端部の形は鋭、葉の表面の色は緑、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る）は濃、葉の周縁の型は全縁、花芽のアントシアニン着色の強弱は中、花序の長さは中、花冠の形はつぼ、花冠の色は淡黄白、花筒の大きさは中、花筒のアントシアニン着色の強弱は弱、花筒の稜の有無は有、果房の着生密度は中、未熟果の緑色の濃淡は中、果実の大きさは大、果実の縦断面の形は扁円、果柄痕の大きさはやや大、がくあの形は円、がく片の向きは中間、がく片の反り方は内曲、がくあの直径はやや大、がくあの深さは浅、果粉の程度は強、果皮の色は濃青、果実の硬さは中、果肉の色は淡黄、糖度はかなり多、酸度はやや少、着果習性は前年枝のみ、裂果性は少、ほう芽期は中、前年枝の開花始期は中、前年枝の果実の成熟期は中、収穫期間は中である。

出願品種「ケラアンブルー」は、対照品種「Weymouth」と比較して、果肉の色が淡黄であること、前年枝の果実の成熟期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「Coville」と比較して、果肉の色が淡黄であること、前年枝の果実の成熟期が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

伊藤祐司 中島二三一 京谷英壽 千葉和彦 工藤和典 水本文洋 加藤秀憲

7 出願公表の年月日 平成22年7月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第24219号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vaccinium L. エピルカブルー

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の大きさは中、樹姿は開張、前年枝の色は赤褐、前年枝の長さは中、前年枝の節間長は中、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや大、葉の形は楕円、葉の先端部の形は鋭、葉の表面の色は緑、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る）は中、葉の周縁の型は全縁、花芽のアントシアニン着色の強弱は中、花序の長さは中、花冠の形は鐘、花冠の色は淡緑白、花筒の大きさは中、花筒のアントシアニン着色の強弱は極弱、花筒の稜の有無は有、果房の着生密度は中、未熟果の緑色の濃淡は中、果実の大きさはかなり大、果実の縦断面の形は円、果柄痕の大きさは中、がくあの形は円、がく片の向きは斜上、がく片の反り方は内曲、がくあの直径はやや大、がくあの深さはやや浅、果粉の程度は強、果皮の色は濃青、果実の硬さはやや硬、果肉の色は白、糖度はかなり多、酸度は中、着果習性は前年枝のみ、裂果性は少、ほう芽期は中、前年枝の開花始期は中、前年枝の果実の成熟期はやや晩、収穫期間は中である。

出願品種「エピルカブルー」は、対照品種「Weymouth」と比較して、がく片の向きが斜上であること、果粉の程度が強であること、前年枝の果実の成熟期がやや晩であること等で区別性が認められる。対照品種「Coville」と比較して、果実の縦断面の形が円であること、がく片の反り方が内曲であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

伊藤祐司 中島二三一 京谷英壽 千葉和彦 工藤和典 水本文洋 加藤秀憲

7 出願公表の年月日 平成22年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24220号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vaccinium L. ちくし昂 (チクシバル)

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の大きさは小、樹姿は斜上、前年枝の色は赤褐、前年枝の長さはかなり短、前年枝の節間長は中、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅は中、葉の形は楕円、葉の先端部の形は鈍、葉の表面の色は緑、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る）は中、葉の周縁の型は鋸歯縁、花序の長さはかなり短、花冠の形はつぼ、花冠の色は白、花筒の大きさはかなり小、花筒のアントシアニン着色の強弱は極弱、花筒の稜の有無は有、果房の着生密度はかなり密、果実の大きさは小、果実の縦断面の形は円、果柄痕の大きさはやや小、がくあいの形は円、がく片の向きは立、がく片の反り方は平、がくあいの直径はかなり小、がくあいの深さは浅、果粉の程度は弱、果皮の色は濃青、果実の硬さは硬、果肉の色は白、糖度は多、酸度は中、着果習性は前年枝のみ、裂果性は少、ほう芽期は中、前年枝の開花始期は中、前年枝の果実の成熟期は早、収穫期間は中である。

出願品種「ちくし昂」は、対照品種「Flordablue」と比較して、果実の大きさが小であること、糖度が多であること、前年枝の開花始期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「Spartan」と比較して、果実の大きさが小であること、果実の縦断面の形が円であること、果実の硬さが硬であること、糖度が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人宮崎大学
宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1番地
P-DESTM株式会社
福岡県久留米市田主丸町地徳2272番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

國武久登

7 出願公表の年月日 平成23年1月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第24221号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vaccinium L. ちくしあおい

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の大きさは小、樹姿は斜上、前年枝の長さは極短、前年枝の節間長はやや短、葉の長さは短、葉の幅はかなり狭、葉の長さ／幅はやや大、葉の形は楕円、葉の先端部の形はやや鋭、葉の表面の色は緑、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る）は中、葉の周縁の型は全縁、花序の長さは短、花冠の形は筒、花冠の色は白、花筒の大きさはかなり小、花筒のアントシアニン着色の強弱は極弱、花筒の稜の有無は有、果房の着生密度は中、未熟果の緑色の濃淡は淡、果実の大きさはやや小、果実の縦断面の形は円、果柄痕の大きさは小、がくあいの形は円、がく片の向きは中間、がく片の反り方は平、がくあいの直径はかなり小、がくあいの深さはやや深、果粉の程度は弱、果皮の色は青、果実の硬さは中、果肉の色は白、糖度はやや少、酸度は少、着果習性は前年枝のみ、裂果性は少、前年枝の果実の成熟期は早、収穫期間は中である。

出願品種「ちくしあおい」は、対照品種「ちくし昂」と比較して、葉の周縁の型が全縁であること、糖度がやや少であること等で区別性が認められる。対照品種

「Spartan」と比較して、樹の大きさが小であること、前年枝の長さが極短であること、果実の大きさがやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

P-DESTM株式会社
福岡県久留米市田主丸町地徳2272番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉岡克則 鹿毛哲郎 古賀尚樹 二又朋則

7 出願公表の年月日 平成24年5月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第24222号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vaccinium L. ちくしるり

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の大きさは小、樹姿は斜上、前年枝の長さはかなり短、前年枝の節間長はやや短、葉の長さはかなり短、葉の幅はかなり狭、葉の長さ／幅は中、葉の形は楕円、葉の先端部の形は中、葉の表面の色は緑、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る）は中、葉の周縁の型は全縁、花序の長さは短、花冠の形は筒、花冠の色は白、花筒の大きさはかなり小、花筒のアントシアニン着色の強弱は極弱、花筒の稜の有無は有、果房の着生密度は中、未熟果の緑色の濃淡は淡、果実の大きさは小、果実の縦断面の形は円、果柄痕の大きさは中、がくあいの形は円、がく片の向きは中間、がく片の反り方は平、がくあいの直径はかなり小、がくあいの深さは浅、果粉の程度は弱、果皮の色は濃青、果実の硬さは軟、果肉の色は淡緑、糖度は少、酸度は中、着果習性は前年枝のみ、裂果性は中、前年枝の果実の成熟期は早、収穫期間は中である。

出願品種「ちくしるり」は、対照品種「ちくし昂」と比較して、葉の周縁の型が全縁であること、裂果性が中であること等で区別性が認められる。対照品種「Sharpblue」と比較して、前年枝の長さがかなり短であること、がくあいの直径がかなり小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

P-DESTM株式会社
福岡県久留米市田主丸町地徳2272番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉岡克則 鹿毛哲郎 古賀尚樹 二又朋則

7 出願公表の年月日 平成24年5月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第24223号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vaccinium L. RYOKU NH-5

3 登録品種の特性の概要

樹勢はやや強、樹姿は斜上、前年枝の色は赤黄、前年枝の長さは中、前年枝の節間長はやや長、葉の長さは長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや小、葉の形は楕円、葉の先端部の形は中、葉の表面の色は緑、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る）は淡、葉の周縁の型は全縁、花芽のアントシアニン着色の強弱は中、花序の長さは中、花冠の形は筒、花冠の色は淡桃、花筒の大きさは中、花筒のアントシアニン着色の強弱は中、花筒の稜の有無は有、果房の着生密度は密、未熟果の緑色の濃淡は中、果実の大きさはやや大、果実の縦断面の形は扁円、果柄痕の大きさは中、がくあいの直径はやや小、がくあいの深さは中、果粉の程度は中、果皮の色は青、果実の硬さは中、果肉の色は淡緑、糖度はやや多、酸度はやや少、着果習性は前年枝のみ、裂果性は少、ほう芽期は中、前年枝の開花始期は中、前年枝の果実の成熟期は早、収穫期間は中である

出願品種「RYOKU NH-5」は、対照品種「デューク」と比較して、樹姿が斜上であること、果肉の色が淡緑であること等で区別性が認められる。対照品種「Spartan」と比較して、樹姿が斜上であること、葉の長さ／幅がやや小であること、がくあいの深さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ニッポン緑産株式会社
長野県松本市大字今井2534番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

櫻井茂隆

7 出願公表の年月日 平成24年1月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第24224号 平成27年3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vaccinium L. RYOKU NH-6

3 登録品種の特性の概要

樹勢はやや強、樹姿は立、前年枝の色は赤褐、前年枝の長さは中、前年枝の節間長は中、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の形は楕円、葉の先端部の形は中、葉の表面の色は緑、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る）は中、葉の周縁の型は鋸歯縁、花芽のアントシアニン着色の強弱は強、花序の長さは中、花冠の形は鐘、花冠の色は白、花筒の大きさは中、花筒のアントシアニン着色の強弱は弱、花筒の稜の有無は有、果房の着生密度は粗、未熟果の緑色の濃淡は濃、果実の大きさはやや大、果実の縦断面の形は扁円、果柄痕の大きさは大、がくあいの直径はやや小、がくあいの深さは中、果粉の程度は中、果皮の色は青、果実の硬さは軟、果肉の色は白、糖度は多、酸度はやや少、着果習性は前年枝のみ、裂果性は中、ほう芽期は中、前年枝の開花始期は中、前年枝の果実の成熟期は中、収穫期間は中である。

出願品種「RYOKU NH-6」は、対照品種「Blueray」と比較して、葉の周縁の型が鋸歯縁であること、花冠の形が鐘であること、花冠の色が白であること等で区別性が認められる。対照品種「Berkeley」と比較して、葉の周縁の型が鋸歯縁であること、花冠の形が鐘であること、花冠の色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ニッポン緑産株式会社
長野県松本市大字今井2534番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

櫻井茂隆

7 出願公表の年月日 平成24年1月13日