1 品種登録の番号及び年月日 第25205号 平成28年6月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Abelia R. Br. 石田一号 (イダイチゴリ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半直立性、新梢の色は褐、葉全体の形は卵形、葉先端の形は鋭形、葉基部の形は円形、新葉表面の色は黄緑、成葉表面の色は緑、葉色の季節変化は有、変化後の葉色は濃褐、斑の有無は無、葉の光沢は有、花序のタイプは円錐花序、花の向きは横向き、花形は一重咲、花冠の形は鐘状、花径はかなり小、花の長さは短、蕾の色は1C、花色はNN155A、花筒の色はN155B、がく片の色は淡紅、がく片数は中、花数はかなり多である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「石田一号」は、対照品種「エドワード ゴーチャー」と比較して、花径がかなり小であること、花色がNN155Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

石田良廣
愛知県稲沢市堀之内町西郷847番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

石田良廣

7 出願公表の年月日 平成27年1月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第25206号 平成28年6月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. GAPOWE

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、茎の太さは中、葉の長さはかなり長、葉の幅はやや広、花序の分枝数はやや少、花の主な色1は黄、花の大きさはやや小、花の長さは長、花被片の展開度は中、外花被片の形は倒卵形、外花被の中央部の色は7A、外花被の先端部の色は7A、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は倒卵形、側方内花被の色は7A(先端～中間部)、155A(基部)、側方内花被の条線分布部の大きさは極大、側方内花被の条線部分の色は7A、側方内花被の条線の数是多、側方内花被の条線の長さはやや短、側方内花被の条線の幅はやや狭、中央内花被の色は7A(先端～中間部)、155A(基部)、中央内花被の条線の有無は有、中央内花被の条線の数はやや少、中央内花被の条線の大きさは中、花糸の色は黄である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「GAPOWE」は、対照品種「TESDIRT」と比較して、外花被の基部の色が155Cであること、花糸の色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「ZALSAMON」と比較して、外花被の基部の色が155Cであること、花糸の色が黄であること、子房のアントシアニン着色の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hilverda Kooij B.V.

Mijnsherenweg 15, 1424CA De Kwakel, the Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Kees Eveleens

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第25207号 平成28年6月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alternanthera ficoidea (L.) P. Beauv. SBW01

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、株の幅は広、節間長はやや長、着色葉の長さは長、着色葉の幅はやや狭、着色葉の基部の形は鋭形、着色葉の先端部の形は鋭形、非着色葉の基部の形は鋭形、非着色葉の先端部の形は鋭形、着色葉の展開直後の色は7A、着色葉の色は8C、非着色葉の色は緑である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「SBW01」は、対照品種「アキランサス 播州」と比較して、着色葉の色が8Cであること等で区別性が認められる。対照品種「早生系アキランサス(黄)」と比較して、着色葉の基部の形が鋭形であること、非着色葉の基部の形が鋭形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岩崎茂
兵庫県相生市矢野町上146
進藤勝信
兵庫県姫路市安富町塩野911-1
尾崎一雄
兵庫県宍粟市山崎町田井142
瀬尾幸範
兵庫県赤穂市加里屋南6-6
堀田雄介
兵庫県赤穂郡上郡町山野里763-6
春本靖雄
兵庫県佐用郡佐用町末廣1457
吉本康二
兵庫県赤穂郡上郡町高田台2-2-14
岡田健志
兵庫県佐用郡佐用町弦谷145-14

6 登録品種の育成をした者の氏名

岩崎茂 進藤勝信 尾崎一雄 瀬尾幸範 堀田雄介 春本靖雄 吉本康二 岡田健志

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第25208号 平成28年6月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alternanthera ficoidea (L.) P. Beauv. SBW02

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、株の幅は広、節間長は長、着色葉の長さは長、着色葉の幅はやや狭、着色葉の基部の形は鋭形、着色葉の先端部の形は鋭形、非着色葉の基部の形は鋭形、非着色葉の先端部の形は鋭形、着色葉の展開直後の色は37B、着色葉の色は49B、非着色葉の色は緑である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「SBW02」は、対照品種「アキランサス 赤穂」と比較して、株の幅が広であること等で区別性が認められる。対照品種「早生系アキランサス(赤)」と比較して、着色葉の基部の形が鋭形であること、非着色葉の基部の形が鋭形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岩崎茂
兵庫県相生市矢野町上146
進藤勝信
兵庫県姫路市安富町塩野911-1
尾崎一雄
兵庫県宍粟市山崎町田井142
瀬尾幸範
兵庫県赤穂市加里屋南6-6
堀田雄介
兵庫県赤穂郡上郡町山野里763-6
春本靖雄
兵庫県佐用郡佐用町末廣1457
吉本康二
兵庫県赤穂郡上郡町高田台2-2-14
岡田健志
兵庫県佐用郡佐用町弦谷145-14

6 登録品種の育成をした者の氏名

岩崎茂 進藤勝信 尾崎一雄 瀬尾幸範 堀田雄介 春本靖雄 吉本康二 岡田健志

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第25209号 平成28年6月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alternanthera ficoidea (L.) P. Beauv. 須磨の娘 (スマムス)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、株の幅は中、節間長は中、着色葉の長さは中、着色葉の幅は狭、着色葉の基部の形は鈍形、着色葉の先端部の形は鋭形、非着色葉の基部の形は鈍形、非着色葉の先端部の形は鋭形、着色葉の展開直後の色は24B、着色葉の色は49C、非着色葉の色は緑である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「須磨の娘」は、対照品種「SUMA」と比較して、着色葉の基部の形が鈍形であること、非着色葉の基部の形が鈍形であること等で区別性が認められる。対照品種「オータムオレンジT1号」と比較して、着色葉の先端部の形が鋭形であること、着色葉の色が49Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岩崎茂
兵庫県相生市矢野町上146

6 登録品種の育成をした者の氏名

岩崎茂

7 出願公表の年月日 平成26年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第25210号 平成28年6月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. クレスト ミドリ

3 登録品種の特性の概要

種子の色は褐（全ての特性はインキュベータ内24時間日長下のデータである。）、株幅は狭、花茎の長さは中、花茎の節数は中、花茎の基部のアントシアニンの着色は中、ロゼット葉の長さはやや短、ロゼット葉の切れ込みは無又は極浅、花序の上部の形は平形、花型は一重である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「クレスト ミドリ」は、対照品種「Columbia」と比較して、暗所で発芽した子葉の色が緑であること、連続日長の要求性が有であること等で区別性が認められる。対照品種「Landsberg erecta」と比較して、暗所で発芽した子葉の色が緑であること、連続日長の要求性が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

松山知樹
東京都練馬区平和台1-17-5
浅見忠男
東京都新宿区二十騎町1-6

6 登録品種の育成をした者の氏名

松山知樹 浅見忠男

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第25211号 平成28年6月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brassica x napus hort. 青光 (ショウコウ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は中、茎の長さは中、葉形は円形、葉先の形は平、葉の大きさはやや小、葉色は濃緑、葉の色素は無、葉の光沢は中、葉のろう質は少、葉の毛じは少、葉のきょ歯の強弱は弱、葉面の波打ちは多、葉縁の切れ込みは中、葉面の凹凸は多、葉柄の形は扁、葉柄の長さはやや長、結球性は結球、結球葉数はやや多、球形は卵、球頂の形はとがり、球底の形はとがり、球高は中、球径は中、球重は小、かぶりは浅、中肋の形は中、中肋の厚さは中、中肋の幅は細、葉先のそりは有、球頭の色は淡緑、球内の色は黄、球内の色の濃淡は淡、芯長はかなり長、球のしまりはかなりしまる、収穫期はかなり晩である。

出願品種「青光」は、対照品種「細田早生」と比較して、外葉数がかかなり多であること、葉柄の長さがやや長であること、収穫期がかかなり晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高田宗男

岐阜県安八郡安八町西結533番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

高田宗男 望月龍也 丸山靖志 渡辺俊昭 野口裕司 堀武男 野田静

7 出願公表の年月日 平成26年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第25212号 平成28年6月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 泉郷の駒 (センキョウノコマ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはかなり長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は粗、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は6C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はかなり大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや高、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は管状2、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下、管弁の返しの高さ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は大、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は強、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は長、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はかなり高である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「泉郷の駒」は、対照品種「泉郷の水」と比較して、葉の基部の形が円形であること、舌状花の裏面の色が6Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成26年5月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第25213号 平成28年6月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. トモアンジュ

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは大、葉の長さはやや長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はアネモネ、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数に1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は56D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は大、花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）は154A、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）は56C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「トモアンジュ」は、対照品種「セイフォースター」と比較して、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が内巻きであること、舌状花の表面の主な色が56Dであること等で区別性が認められる。対照品種「セイアイシス」と比較して、たく葉の大きさが大であること、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）がアネモネであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中神智弘
愛知県田原市赤羽根町長沢43番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

中神智弘

7 出願公表の年月日 平成27年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第25214号 平成28年6月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. トモアミー

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はアネモネ、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数に2、頭花の舌状花の主要な形は舌状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は11A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は10B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は極大、花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）は154B、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）は7A、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「トモアミー」は、対照品種「セイフォースター」と比較して、頭花の舌状花の形の数に2であること、舌状花の表面の主な色が11Aであること等で区別性が認められる。対照品種「セイリムー」と比較して、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）がアネモネであること、頭花の舌状花の形の数に2であること、舌状花の表面の主な色が11Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中神智弘
愛知県田原市赤羽根町長沢43番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

中神智弘

7 出願公表の年月日 平成27年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第25215号 平成28年6月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. トモクオーレ

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は極多、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は2A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は1B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「トモクオーレ」は、対照品種「セイフリルグリーン」と比較して、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）が極多であること、舌状花の先端の形が深い切込みであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中神智弘
愛知県田原市赤羽根町長沢43番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

中神智弘

7 出願公表の年月日 平成27年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第25216号 平成28年6月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. トモレーブ

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はアネモネ、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数に1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はかなり大、花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）は3B、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）は155B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「トモレーブ」は、対照品種「セイフォースター」と比較して、頭花の直径（摘らいしていないもの）が中であること、舌状花の表面の主な色がNN155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「セイダロカ」と比較して、葉の基部の形が鈍形であること、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）がアネモネであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中神智弘
愛知県田原市赤羽根町長沢43番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

中神智弘

7 出願公表の年月日 平成27年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第25217号 平成28年6月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. トモボヌール

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はアネモネ、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形は舌状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN74C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色はN155B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は大、花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）は1C、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）はN74C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「トモボヌール」は、対照品種「セイフォースター」と比較して、頭花の舌状花の形の数2であること、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）が著しく異なること等で区別性が認められる。対照品種「セイソリア」と比較して、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）がアネモネであること、頭花の舌状花の形の数2であること、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）が著しく異なること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中神智弘
愛知県田原市赤羽根町長沢43番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

中神智弘

7 出願公表の年月日 平成27年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第25218号 平成28年6月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 泉郷紙芝居 (センキョウカミシハイ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはかなり長、葉の幅は中、葉の長さ／幅は高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は粗、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は8B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は8B、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや高、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は管状2、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下、管弁の返しの高さ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は大、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は強、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はかなり長、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は極狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は極高である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「泉郷紙芝居」は、対照品種「泉郷の水」と比較して、葉の基部の形が円形であること、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）が極高であること等で区別性が認められる。対照品種「泉郷明星」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、葉の基部の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成27年7月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第25219号 平成28年6月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 泉郷のいろ (センキョウノイロ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは極長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は粗、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は18D、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は管状2、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下、管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は大、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は中、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや長、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は高である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「泉郷のいろ」は、対照品種「泉郷女傑」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、舌状花の裏面の色が18Dであること等で区別性が認められる。対照品種「泉郷玉椿」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が170B, 5C（基部）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成27年7月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第25220号 平成28年6月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華中原 (コッカチュウケン)

3 登録品種の特性の概要

草丈は極高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはかなり長、葉の幅は広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華中原」は、対照品種「国華細雪」と比較して、頭花の舌状花の形の数が1であること等で区別性が認められる。対照品種「国華理想郷」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成27年7月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第25221号 平成28年6月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華の太 (コッカタ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはかなり長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は4C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は4C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや高、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華の太」は、対照品種「国華偉業」と比較して、葉柄の葉長に対する長さがやや短であること、葉の基部の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「国華金山」と比較して、葉柄の葉長に対する長さがやや短であること、葉の基部の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成27年7月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第25222号 平成28年6月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華祝い酒 (コッカワイサケ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは極長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は2、舌状花の花筒の長さはやや長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は4C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は4C、開花習性は10月～11月咲き

（秋）、各開花習性における早晚性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は高、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はやや低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華祝い酒」は、対照品種「国華徳人」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや浅であること、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、頭花の舌状花の形の数が2であること等で区別性が認められる。対照品種「国華吉兆」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや浅であること、頭花の舌状花の形の数が2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成27年7月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第25223号 平成28年6月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華の孫 (コッカノゴ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはかなり長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は2、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや高、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）はさじ状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華の孫」は、対照品種「国華正倉」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること、舌状花の先端の形が尖るであること等で区別性が認められる。対照品種「国華若菜」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成27年7月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第25224号 平成28年6月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華87 (コッカ87)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは大、葉の長さは長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は2、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや高、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）はさじ状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華87」は、対照品種「国華横綱」と比較して、たく葉の大きさが大であること等で区別性が認められる。対照品種「国華変革」と比較して、たく葉の大きさが大であること、舌状花の先端の形が丸であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成27年7月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第25225号 平成28年6月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ipomoea purpurea (L.) Roth 元気な5つの青い星 (ケンキナ5ツノアオイホシ)

3 登録品種の特性の概要

草型はつる性、はい軸の地色は赤褐、成葉の形は丸葉、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、成葉表面の色は緑、成葉の斑の有無は無、葉柄の長さはやや短、葉柄の色は緑、花型は一重咲、花形は丸咲、花の大きさはやや小、花の色は155C、花冠の模様の有無は無、花冠咽喉部のタイプは筒白、曜の数は5、曜の色はN89A、弁縁の切れ込みは浅、がく片全体の形は長楕円形、がく片の数は5、雄ずいのは数は5、やくの色は白、種子の色は黒褐、開花始期はかなり早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「元気な5つの青い星」は、対照品種「五泉 白かすり青」と比較して、葉柄の色が緑であること、曜の色がN89Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社札幌採種園
北海道札幌市白石区本通17丁目北17番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

望月正実 古林健吾

7 出願公表の年月日 平成26年5月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第25226号 平成28年6月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. オータム ヘッドグラス

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、子葉の大きさは中、子葉の形は楕円形、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅は中、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）は中、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）はやや固い、球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）はやや小、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）は偏円形、葉の長さは中、葉の幅は広、収穫期の葉の姿勢は斜上、葉の形は横広楕円形、葉身の先端の形は円形、外葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱は中、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは中、葉身の先端部の切れ込みの粗密は粗、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）は歯状、収穫期は中、抽だい始期は早、開花期の草丈はやや高である。

出願品種「オータム ヘッドグラス」は、対照品種「スプリング ヘッドグラス」と比較して、葉身の先端部の切れ込みの深さが中であること、抽だい始期が早であること等で区別性が認められる。対照品種「オリンピア」と比較して、種子の色が黒であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ツルタのタネ株式会社
長野県南佐久郡川上村大字大深山1193番地4

6 登録品種の育成をした者の氏名

鶴田敏行 森井雅彦 祢津耕作 太田奈々

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第25227号 平成28年6月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. ナガノヴィーナス

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、子葉の大きさはやや大、子葉の形は楕円形、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅はやや小、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）はやや弱、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）はやや固い、球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）はやや小、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）は円形、葉の長さは短、葉の幅はやや広、収穫期の葉の姿勢は斜上、葉の形は横広楕円形、葉身の先端の形は円形、外葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱はやや弱、葉の凹凸の強弱は弱、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さはやや浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密は中、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）は歯状、開花期の草丈はやや高である。

出願品種「ナガノヴィーナス」は、対照品種「スプリング ヘッドグラス」と比較して、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）が円形であること、芯の大きさがやや小であること等で区別性が認められる。対照品種「オータム ヘッドグラス」と比較して、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）が円形であること、葉身の先端部の切れ込みの粗密が中であること、芯の大きさがやや小であること等で区別性が認められる。対照品種「オリンピア」と比較して、種子の色が黒であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県
長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

土屋宣明 芹澤啓明 臼井富太 塚田元尚 清水時哉 重盛勲 松本悦夫

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第25228号 平成28年6月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. KA-1231

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、子葉の大きさは中、子葉の形は楕円形、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅は中、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）は強、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）は固い、球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）は小、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）は円形、葉の長さは中、葉の幅はやや広、収穫期の葉の姿勢は斜上、葉の形は横広楕円形、葉身の先端の形は円形、外葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱はやや弱、葉の凹凸の強弱は中、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密は粗、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）は歯状、収穫期はやや晩、抽だい始期は晩である。

出願品種「KA-1231」は、対照品種「スプリング ヘッドグラス」と比較して、球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）が小であること、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「オータム ヘッドグラス」と比較して、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）が円形であること、抽だい始期が晩であること、根腐病菌レース1抵抗性が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ナガノヴィーナス」と比較して、球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）が強であること、葉の凹凸の強弱が中であること、根腐病菌レース1抵抗性が中であること等で区別性が認められる。対照品種「オリンピア」と比較して、種子の色が黒であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町1丁目50番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

堀内可一 木村智幸

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第25229号 平成28年6月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Luculia Sweet リメイク

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張、樹高は中、樹姿の幅は中、茎の太さはやや太、茎の色は褐緑、節間長は中、葉全体の形は長楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は鋭形、葉縁の形は全縁、葉身長は中、葉幅は中、葉の表面の色は緑、葉の裏面の色は淡緑、葉柄の色は紅、蕾の色は桃、花序の形は集散、花房の長径は中、花房の高さは中、1花房の花数は中、花形は受け咲、花のタイプは一重咲、花の大きさは中、花弁表面の色は65B、花筒の長さは中、花筒の色は桃、花弁全体の形は広卵形、花弁先端の形は円形、花弁のしわは少、花弁の長さは中、花弁の幅は中、花弁の裂片数は5枚、副花冠の形はフリル型、がくの長さはやや短、がく全体の形はやや開く、がくの色は赤褐、柱頭のタイプは長花柱花、花の香りは中、開花始期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「リメイク」は、対照品種「紅富士」と比較して、成葉裏面の脈の毛が有であること、葉柄の色が紅であること等で区別性が認められる。対照品種「アッサムニオイザクラ」と比較して、蕾の色が桃であること、花弁表面の色が65Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

矢澤秀成

長野県長野市篠ノ井布施高田935-4プロヌーブクラルテ203

6 登録品種の育成をした者の氏名

矢澤秀成

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第25230号 平成28年6月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross

チェリーフォーパーティ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、節間長はやや短、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の表面の主な色は緑、葉の表面の斑の有無は有、葉の表面の斑の主な模様は中斑、葉の表面の斑の主な色は淡緑、葉の表面の斑の二次色（2色以上の品種に限る。）は桃、葉の表面の帯状紋の明瞭度は明瞭、花柄の長さの中、花柄の色は褐、頭状花序の長さはやや短、頭状花序の主な色は68Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「チェリーフォーパーティ」は、対照品種「チェリーポップス」と比較して、葉の表面の斑の主な色が淡緑であること、花柄の色が褐であること等で区別性が認められる。対照品種「斑入りヒメツルソバ」と比較して、葉の表面の斑の主な模様が中斑であること、葉の表面の斑の主な色が淡緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

兵藤行英

愛知県安城市安城町常福寺10

6 登録品種の育成をした者の氏名

兵藤行英

7 出願公表の年月日 平成27年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第25231号 平成28年6月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. 久御山七号 (クヤマナナゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや低、茎の長さは短、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）はやや濃、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは短、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラップ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は3以上、花冠裂片の表面の主な色はN87D、花冠裂片の表面の二次色は143A、花冠裂片の二次色の分布は中央脈に沿う、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色はN81C、花筒の内面の脈の明瞭度は弱、やくの色は青紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「久御山七号」は、対照品種「久御山一号」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN87Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中西義晴

京都府久世郡久御山町藤和田馬場崎野41-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

中西義晴

7 出願公表の年月日 平成26年9月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第25232号 平成28年6月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. アムルーズドトワ

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はかなり多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はやや弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は56B、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アムルーズドトワ」は、対照品種「Ausimmon」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、花弁の表面の主な色が56Bであること等で区別性が認められる。対照品種「トワアンティークベビー」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、花弁の表面の主な色が56Bであること等で区別性が認められる。対照品種「keiji1001」と比較して、花弁の表面の主な色が56Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

今井清
広島県呉市広町4913番地の1
有限会社はなプロデュース南里
大阪府大阪市鶴見区鶴見5丁目9番3-711号

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井清

7 出願公表の年月日 平成25年5月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第25233号 平成28年6月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. VUVUZELA

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は心臓形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数はやや多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は36D、花卉の表面の二次色は13B、花卉の表面の二次色の分布は基部、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は49Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「VUVUZELA」は、対照品種「トワシュシュ」と比較して、花卉の表面の主な色が36Dであること、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）が49Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

De Ruiter Intellectual Property B.V.
Meerlandenweg55, 1187ZR, Amstelveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

J. van Dam

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第25234号 平成28年6月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Setaria italica (L.) P. Beauv. ゆいこがね

3 登録品種の特性の概要

第一葉の先端の形は尖、葉しょうのアントシアニンの着色は強、葉群の緑色の濃淡は中、草姿は直立、葉の襟のアントシアニンの着色は強、出穂期はやや晩、支持根のアントシアニン着色の有無は有、葉身の姿勢は半直立、穂の硬毛の長さは中、穂の硬毛のアントシアニン着色の有無は無、やくの色は白、止め葉のアントシアニンの着色は無又は極弱、稈の長さは短、護穎のアントシアニン着色の有無は無、節間の数は中、穂の姿勢は下垂、穂首の長さは中、穂の形は円筒状、穂の長さはやや短、枝梗の粗密（猿手状の穂を持つ品種を除く。）は中、穀粒の千粒重は中、穀粒の形は円形、穀粒の色は灰、玄穀粒の色（無精白）は黄、胚乳の型はもち性である。

出願品種「ゆいこがね」は、対照品種「仁左平在来」と比較して、葉の襟のアントシアニンの着色が強であること、穂の硬毛の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「大槌10」と比較して、玄穀粒の色（無精白）が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「平」と比較して、出穂期がやや晩であること、穂の硬毛の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岩手県
岩手県盛岡市内丸10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

仲條眞介

7 出願公表の年月日 平成26年2月5日