

1 品種登録の番号及び年月日 第26519号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Carex oshimensis Nakai EVERLIME

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はやや低、株幅は極広、花茎の長さは短、葉身の長さは長、葉身の幅はやや狭、葉身の緑色部の色は137A、葉身の斑の有無は有、葉身の斑の模様は外斑、葉身の斑の色は146C、葉身の斑の面積は中、葉身の中肋の色は緑、雄小穂の長さはやや長、雄小穂の褐色の濃淡は濃、雌小穂の長さは中、出穂期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「EVERLIME」は、対照品種「FIWHITE」と比較して、葉身の斑の色が146Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Patrick Fitzgerald
Oldtown Stoneyford Co.Kilkenny, Ireland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Patrick Fitzgerald

7 出願公表の年月日 平成28年7月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26520号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Carex oshimensis Nakai EVERSHEEN

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張、草丈は低、株幅は狭、花茎の長さは短、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の緑色部の色はN137D、葉身の斑の有無は有、葉身の斑の模様は中斑、葉身の斑の色はN144A、葉身の斑の面積は中、葉身の中肋の色は緑、雄小穂の長さは短、雄小穂の褐色の濃淡は中、雌小穂の長さはやや短、出穂期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「EVERSHEEN」は、対照品種「EVERORO」と比較して、葉身の斑の色がN144Aであること、雄小穂の長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「エヴァーゴールド」と比較して、花茎の数がかなり多であること、葉身の斑の色がN144Aであること、雄小穂の長さが短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Patrick Fitzgerald
Oldtown Stoneyford Co.Kilkenny, Ireland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Patrick Fitzgerald

7 出願公表の年月日 平成28年7月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26521号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀群 (シュウゲン)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形は船底状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の花筒の長さは中、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は晩、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はかなり少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀群」は、対照品種「精州」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや深であること、葉の裂片縁部の重なりが接近するであること、頭花の舌状花の形の数2であること等で区別性が認められる。対照品種「秀芳白景」と比較して、たく葉の大きさが中であること、頭花の舌状花の形の数2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一

広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成26年9月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第26522号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精の長 (セイナ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはかなり短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数3以上、頭花の舌状花の主要な形は船底状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の主な色は9A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は6C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性はかなり早、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はかなり少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜上である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精の長」は、対照品種「精の枕」と比較して、葉の一次欠刻の深さが深であること、頭花の直径（摘らいしたもの）がやや小であること等で区別性が認められる。対照品種「精の光彩」と比較して、葉の長さがかなり短であること、頭花の直径（摘らいしたもの）がやや小であること、舌状花の花筒の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「芳園の錦」と比較して、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること、舌状花の表面の主な色が9Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成28年3月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26523号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. サザンチェルシーイエロー

3 登録品種の特性の概要

草丈は極高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや大、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや広、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は8A、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「サザンチェルシーイエロー」は、対照品種「サザンパイン」と比較して、舌状花の長さが中であること、舌状花の表面の主な色が6Aであること、舌状花の裏面の色が8Aであること等で区別性が認められる。対照品種「サザンキーサ」と比較して、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）がやや斜上であること、舌状花の表面の主な色が6Aであること、舌状花の裏面の色が8Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鹿児島県
鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

渡辺剛史 吉水竜次 永吉実孝 長谷健 遠嶋太志 田之頭優樹

7 出願公表の年月日 平成28年7月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26524号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀ここみ (シュウコミ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはかなり短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN74C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は75B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晩性はかなり晩である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀ここみ」は、対照品種「精わくみ」と比較して、花らしい外面の色が70Aであること、舌状花の表面の主な色がN74Cであること等で区別性が認められる。対照品種「かれん」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、舌状花の表面の主な色がN74Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一

広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成28年8月31日

1 品種登録の番号及び年月日 第26525号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀うちわ (シュウチワ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形は舌状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晩性は極晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀うちわ」は、対照品種「秀むらさめ」と比較して、頭花の舌状花の形の数2であること、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）が斜上であること、舌状花の先端の形が突起状であること等で区別性が認められる。対照品種「すいこ」と比較して、頭花の舌状花の形の数2であること、舌状花の縦断面の形状が外反であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一

広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成28年8月31日

1 品種登録の番号及び年月日 第26526号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイアリアカ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイアリアカ」は、対照品種「セイエルチェホホワイト」と比較して、葉の基部の形が鈍形であること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）が強いドーム状であること等で区別性が認められる。対照品種「セイバルカン」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、葉の一次欠刻の深さがかなり深であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成28年8月31日

1 品種登録の番号及び年月日 第26527号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイウルビーノ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは大、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度

(叢生でない品種に限る)はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型(八重及び露心する八重品種を除く)はデージー、頭花の直径(摘らいしていないもの)はやや小、頭花の舌状花数(一重及び半八重品種に限る)は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き(一重及び半八重品種に限る)は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形(管状でない舌状花)は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性(ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む)は類似する、舌状花の裏面の色は5C、花盤の頭花に対する直径の大きさ(一重及び半八重品種に限る)はやや大、花盤の開やく前の色の区分(デージー型の品種に限る)は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無(デージー型の品種に限る)は無、日長感応グループ(正確な日長制御での栽培)は9週間、開花習性は7月～9月咲き(夏秋)である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「セイウルビーノ」は、対照品種「セイイズミル」と比較して、舌状花の基部の向き(一重及び半八重品種に限る)が水平であること、舌状花の周縁の巻き方(管状でない舌状花)が弱い外巻きであること等で区別性が認められる。対照品種「セイリムー」と比較して、たく葉の大きさが大であること、花盤の断面の形(デージー型の品種に限る)が強い円錐状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成28年8月31日

1 品種登録の番号及び年月日 第26528号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 笑の結 (シヨウノユイ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は粗、頭花の舌状花の形の数3以上、頭花の舌状花の主要な形は舌状、頭花の舌状花の二次的な形は船底状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN74C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN74D、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は極晩、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はかなり少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「笑の結」は、対照品種「笑紋」と比較して、舌状花の表面の主な色がN74Cであること等で区別性が認められる。対照品種「笑の舞」と比較して、舌状花の表面の主な色がN74Cであること等で区別性が認められる。対照品種「笑の宿」と比較して、舌状花の表面の主な色がN74Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小井戸輝雄
長野県松本市元町一丁目1番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名

小井戸輝雄

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26529号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイパオーラ

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形は舌状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイパオーラ」は、対照品種「セイパレット」と比較して、頭花の舌状花の形の数2であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が内巻きであること、舌状花の先端の形が歯状であること等で区別性が認められる。対照品種「セイリンドス」と比較して、葉の基部の形が円形であること、頭花の舌状花の形の数2であること等で区別性が認められる。対照品種「セイイレルダ」と比較して、葉の基部の形が円形であること、頭花の舌状花の形の数2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成28年10月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26530号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. コイレイカ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや大、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は72C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は84C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晩性はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「コイレイカ」は、対照品種「コイステージ」と比較して、舌状花の縦断面の形状が平であること、舌状花の表面の主な色が72Cであること等で区別性が認められる。対照品種「コイアリサ」と比較して、舌状花の縦断面の形状が平であること、舌状花の先端の形が歯状であること、舌状花の表面の主な色が72Cであること等で区別性が認められる。対照品種「コイジェンヌ」と比較して、舌状花の先端の形が歯状であること、舌状花の表面の主な色が72Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小井戸輝雄
長野県松本市元町一丁目1番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名

小井戸輝雄

7 出願公表の年月日 平成28年11月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第26531号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイスプリト

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや広、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイスプリト」は、対照品種「セイマニサ」と比較して、花序の形（叢生でない品種に限る）が深いドーム形であること、舌状花の先端の形が歯状であること等で区別性が認められる。対照品種「セイアイシスホワイト」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること、花序の形（叢生でない品種に限る）が深いドーム形であること、舌状花の先端の形が歯状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成29年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第26532号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイエルク

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は75D:75B(中央部の縦線)、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイエルク」は、対照品種「セイリポルホットピンク」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）が無であること等で区別性が認められる。対照品種「セイパミエ」と比較して、舌状花の先端の形が丸であること、舌状花の表面の色数が1であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成29年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第26533号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイハニア

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイハニア」は、対照品種「セイリンドス」と比較して、葉の基部の形が鈍形であること、花盤の開やく時の色（デージー型の品種に限る）が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「セイエーゲ」と比較して、葉の基部の形が鈍形であること、花序の形（叢生でない品種に限る）が散房花序型であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が平（巻かない）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成29年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第26534号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイカーニャ

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は4B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は4C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイカーニャ」は、対照品種「セイリムー」と比較して、舌状花の先端の形が丸であること、舌状花の表面の主な色が4Bであること、舌状花の裏面の色が4Cであること等で区別性が認められる。対照品種「セイアイシスイエロー2」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること、舌状花の先端の形が丸であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成29年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第26535号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. サザンサマーピンク

3 登録品種の特性の概要

草丈は極高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「サザンサマーピンク」は、対照品種「サザンコスモ」と比較して、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が外巻きであること、舌状花の表面の色数が1であること、舌状花の表面の主な色がN155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鹿児島県

鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

渡辺剛史 吉水竜次

7 出願公表の年月日 平成29年4月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第26536号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gomphrena L. エレスチャル

3 登録品種の特性の概要

草型は直立、草丈は低、茎の色は帯紅、一次分枝数はやや少、節間長は短、葉全体の形は長楕円形、葉身の長さは短、葉身の幅は中、葉の表面の色は緑、葉柄の有無と長さは短、苞葉の形は卵形、苞葉の長さは短、苞葉の幅はやや狭、頭花の形は球体、頭花の長さは短、頭花の幅はやや狭、花首の長さは短である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エレスチャル」は、対照品種「SAKGOM001」と比較して、頭花の色が75D;N78Aであること、花首の長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「バディーローズ」と比較して、頭花の色が75D;N78Aであること等で区別性が認められる。対照品種「掛川DA1」と比較して、頭花の色が75D;N78Aであること、花首の長さが短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社角田ナーセリー
愛知県一宮市萩原町萩原橋上14-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

高木三吏

7 出願公表の年月日 平成27年10月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第26537号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus L. HAWHIB1440

3 登録品種の特性の概要

樹皮の亀裂の形は線状、樹皮の色は灰、枝の粗密は中、葉全体の形は心形、葉先端の形は鋭形、葉基部の形は心形1、葉縁の形は鈍鋸歯、葉身の長さは中、葉身の幅は中、新葉表面の色はNN137A、成葉表面の色は139A、斑の有無は無、新葉表面の光沢は中、成葉表面の光沢は中、新葉表面の毛は有（白）、成葉表面の毛は有（白）、葉脈の形は掌状型、葉柄の太さは中、葉柄の長さは中、葉柄の色は緑、托葉の形は線状披針形、托葉の長さは中、花冠の向きは横向き、花冠の開き方は平開、花冠の型は一重咲き、花弁の重なりは重なる、花冠の長径は極小、つぼみの色は1C, 23C(先端部及び花弁の縁部)、単色・複色の別は二色、複色のタイプはバンド、花弁のバンド1の色は32A、花弁のバンド2の色は22B、花弁の脈の明瞭さは不明瞭、花弁のバンド1の幅は広、花弁のバンド2の幅はかなり狭、花弁全体の形は扇型、花弁のねじれは無、花弁の長さは短、花弁の幅は中、花弁の数は少、花弁の光沢は無、ずい柱の弁化の有無は無、ずい柱の曲りは無、ずい柱の太さは中、ずい柱の長さは短、ずい柱の色のタイプは二色、ずい柱基部の色は26A、ずい柱先端の色は18A、ずい柱先端裂片の数は5裂、花柱枝の色はその他（淡黄）、花柱枝の毛は有（赤）、柱頭の色はオレンジ、花糸の長さは中、花糸の色は黄、やくの色は黄、花柄上部の太さは中、花柄上部の長さは中、花柄上部の色は143B、花柄下部の太さは細、花柄下部の長さは長、花柄下部の色は143B、副がくの形は狭披針形、副がくの開放の方向はやや接着、副がくの色は緑、がく筒の形は鐘形、がく筒の長さは中、がく筒の色は淡緑、がく裂片の形態は鋭形、がく裂片の切れ込みは中裂、がく裂片の毛は有（白）、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「HAWHIB1440」は、対照品種「チョイベ」と比較して、花弁のバンド1の色が32Aであること、ずい柱基部の色が26Aであること等で区別性が認められる。対照品種「NEW APOLLO」と比較して、花弁のバンド1の色が32Aであること、ずい柱基部の色が26Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

SPURVELUND I/S

Fangelvej 32, Allested-Vejle DK-5672 BROBY, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Stefan Lund Thorsten Lund

7 出願公表の年月日 平成28年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第26538号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus L. HAWHIB1508

3 登録品種の特性の概要

樹皮の亀裂の形は線状、樹皮の色は灰、枝の粗密は中、葉全体の形は広卵形、葉先端の形は鋭形、葉基部の形は円形、葉縁の形は鈍鋸歯、葉身の長さは中、葉身の幅は中、新葉表面の色は137B、成葉表面の色は139A、斑の有無は無、新葉表面の光沢は中、成葉表面の光沢は中、新葉表面の毛は有（白）、成葉表面の毛は有（白）、葉脈の形は掌状型、葉柄の太さは中、葉柄の長さは中、葉柄の色は緑、托葉の形は線状披針形、托葉の長さは中、花冠の向きは横向き、花冠の開き方は平開、花冠の型は一重咲き、花卉の重なりは重なる、花冠の長径は小、つぼみの色は53A、単色・複色の別は一色、単色花の色はN45B、花卉の脈の明瞭さは明瞭（濃ピンク）、花卉全体の形は扇型、花卉のねじれは弱、花卉の長さは短、花卉の幅は中、花卉の数は少、花卉の光沢は無、ずい柱の弁化の有無は無、ずい柱の曲りは無、ずい柱の太さは中、ずい柱の長さは中、ずい柱の色のタイプは一色、ずい柱基部の色は43A、ずい柱先端裂片の数は5裂、花柱枝の色は赤、花柱枝の毛は有（赤）、柱頭の色は赤、花糸の長さは中、花糸の色はその他（赤）、やくの色は黄、花柄上部の太さは中、花柄上部の長さは中、花柄上部の色は143A、花柄下部の太さは細、花柄下部の長さは長、花柄下部の色は143B、副がくの形は狭披針形、副がくの開放の方向はやや接着、副がくの色は緑、がく筒の形は鐘形、がく筒の長さは中、がく筒の色は淡緑、がく裂片の形態は鋭形、がく裂片の切れ込みは中裂、がく裂片の毛は有（白）、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「HAWHIB1508」は、対照品種「レッドスター」と比較して、単色・複色の別が一色であること、やくの色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種

「ARIONICUS」と比較して、単色・複色の別が一色であること、ずい柱基部の色が43Aであること等で区別性が認められる。対照品種「VOLCANO」と比較して、葉柄の色が緑であること、つぼみの色が53Aであること、単色・複色の別が一色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

SPURVELUND I/S

Fangelvej 32, Allested-Vejle DK-5672 BROBY, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Stefan Lund Thorsten Lund

7 出願公表の年月日 平成28年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第26539号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus L. HAWHIB1610

3 登録品種の特性の概要

樹皮の亀裂の形は線状、樹皮の色は灰、枝の粗密は中、葉全体の形は広卵形、葉先端の形は鋭形、葉基部の形は円形、葉縁の形は鈍鋸歯、葉身の長さは中、葉身の幅は中、新葉表面の色はNN137A、成葉表面の色はNN137A、斑の有無は無、新葉表面の光沢は中、成葉表面の光沢は中、新葉表面の毛は有（白）、成葉表面の毛は有（白）、葉脈の形は掌状型、葉柄の太さは中、葉柄の長さは中、葉柄の色はその他（褐）、托葉の形は線状披針形、托葉の長さは中、花冠の向きは横向き、花冠の開き方は平開、花冠の型は一重咲き、花卉の重なりは重なる、花冠の長径は小、つぼみの色は162C, 29C(先端部)、単色・複色の別は三色、複色のタイプはバンド、花卉のバンド1の色は187A、花卉のバンド2の色は33A、花卉のバンド3の色は24B、花卉の脈の明瞭さは明瞭（赤紫）、花卉のバンド1の幅はやや狭、花卉のバンド2の幅は中、花卉のバンド3の幅はかなり狭、花卉全体の形は扇型、花卉のねじれは無、花卉の長さは短、花卉の幅は中、花卉の数は少、花卉の光沢は無、ずい柱の弁化の有無は無、ずい柱の曲りは無、ずい柱の太さは中、ずい柱の長さは中、ずい柱の色のタイプは三色、ずい柱基部の色は187B、ずい柱先端の色は16B、ずい柱先端裂片の数は5裂、花柱枝の色はその他（淡橙）、花柱枝の毛は有（赤）、柱頭の色はオレンジ、花糸の長さは中、花糸の色は黄、やくの色は黄、花柄上部の太さは中、花柄上部の長さは長、花柄上部の色は143A、花柄下部の太さは細、花柄下部の長さは長、花柄下部の色は143B、副がくの形は線状披針形、副がくの開放の方向は開、副がくの色は緑、がく筒の形は鐘形、がく筒の長さは中、がく筒の色は緑、がく裂片の形態は鋭形、がく裂片の切れ込みは中裂、がく裂片の毛は有（白）、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「HAWHIB1610」は、対照品種「チョイベ」と比較して、花卉のバンド1の色が187Aであること、ずい柱基部の色が187Bであること等で区別性が認められる。対照品種「NEW APOLLO」と比較して、つぼみの色が162C, 29C(先端部)であること、花卉のバンド2の色が33Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

SPURVELUND I/S

Fangelvej 32, Allested-Vejle DK-5672 BROBY, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Stefan Lund Thorsten Lund

7 出願公表の年月日 平成28年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第26540号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus L. HAWHIB1710

3 登録品種の特性の概要

樹皮の亀裂の形は線状、樹皮の色は茶、枝の粗密は中、葉全体の形は広卵形、葉先端の形は鋭形、葉基部の形は円形、葉縁の形は鈍鋸歯、葉身の長さは中、葉身の幅は中、新葉表面の色はNN137A、成葉表面の色は139A、斑の有無は無、新葉表面の光沢は強、成葉表面の光沢は強、新葉表面の毛は有（白）、成葉表面の毛は有（白）、葉脈の形は掌状型、葉柄の太さは中、葉柄の長さは中、葉柄の色は緑、托葉の形は線状披針形、托葉の長さは中、花冠の向きは横向き、花冠の開き方は平開、花冠の型は一重咲き、花卉の重なりは重なる、花冠の長径は小、つぼみの色は145C, 50C(先端部及び基部)、単色・複色の別は三色、複色のタイプはバンド、花卉のバンド1の色はNN155B、花卉のバンド2の色はN57B、花卉のバンド3の色は52A、花卉の脈の明瞭さは明瞭（ピンク）、花卉のバンド1の幅は狭、花卉のバンド2の幅は中、花卉のバンド3の幅は狭、花卉全体の形は扇型、花卉のねじれは無、花卉の長さは短、花卉の幅は中、花卉の数は少、花卉の光沢は無、ずい柱の弁化の有無は無、ずい柱の曲りは無、ずい柱の太さは中、ずい柱の長さは短、ずい柱の色のタイプは一色、ずい柱基部の色は39C、ずい柱先端裂片の数は5裂、花柱枝の色は赤、花柱枝の毛は有（赤）、柱頭の色は赤、花糸の長さは中、花糸の色はその他（赤）、やくの色は黄、花柄上部の太さは中、花柄上部の長さは中、花柄上部の色は143A、花柄下部の太さは中、花柄下部の長さは中、花柄下部の色は143B、副がくの形は狭披針形、副がくの開放の方向はやや接着、副がくの色は緑、がく筒の形は鐘形、がく筒の長さは中、がく筒の色は淡緑、がく裂片の形態は鋭形、がく裂片の切れ込みは中裂、がく裂片の毛は有（白）、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「HAWHIB1710」は、対照品種「VOLCANO」と比較して、花卉のバンド1の色がNN155Bであること、花卉のバンド2の色がN57Bであること等で区別性が認められる。対照品種「GRACES2」と比較して、花卉のバンド1の色がNN155Bであること、ずい柱の色のタイプが一色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

SPURVELUND I/S

Fangelvej 32, Allested-Vejle DK-5672 BROBY, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Stefan Lund Thorsten Lund

7 出願公表の年月日 平成28年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第26541号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus L. HAWHIB1910

3 登録品種の特性の概要

樹皮の亀裂の形は線状、樹皮の色は灰、枝の粗密は中、葉全体の形は広卵形、葉先端の形は鋭形、葉基部の形は円形、葉縁の形は鈍鋸歯、葉身の長さは中、葉身の幅は中、新葉表面の色は137A、成葉表面の色は139A、斑の有無は無、新葉表面の光沢は中、成葉表面の光沢は中、新葉表面の毛は有（白）、成葉表面の毛は有（白）、葉脈の形は掌状型、葉柄の太さは中、葉柄の長さは長、葉柄の色は緑、托葉の形は線状披針形、托葉の長さは中、花冠の向きは横向き、花冠の開き方は平開、花冠の型は一重咲き、花卉の重なりは重なる、花冠の長径は小、つぼみの色は154D、単色・複色の別は二色、複色のタイプはバンド、花卉のバンド1の色は60A、花卉のバンド2の色は157D、花卉の脈の明瞭さは不明瞭、花卉のバンド1の幅はやや狭、花卉のバンド2の幅はやや広、花卉全体の形は扇型、花卉のねじれは無、花卉の長さは短、花卉の幅は中、花卉の数は少、花卉の光沢は無、ずい柱の弁化の有無は無、ずい柱の曲りは無、ずい柱の太さは中、ずい柱の長さは中、ずい柱の色のタイプは二色、ずい柱基部の色は69C、ずい柱先端の色は8D、ずい柱先端裂片の数は5裂、花柱枝の色はその他（淡黄）、花柱枝の毛は有（白）、柱頭の色はオレンジ、花糸の長さは中、花糸の色は黄、やくの色は黄、花柄上部の太さは中、花柄上部の長さは中、花柄上部の色は143B、花柄下部の太さは細、花柄下部の長さは長、花柄下部の色は143B、副がくの形は狭披針形、副がくの開放の方向はやや接着、副がくの色は緑、がく筒の形は鐘形、がく筒の長さは中、がく筒の色は淡緑、がく裂片の形態は鋭形、がく裂片の切れ込みは中裂、がく裂片の毛は有（白）、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「HAWHIB1910」は、対照品種「BOREAS」と比較して、ずい柱のよじれが弱であること、ずい柱基部の色が69Cであること、花糸の色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「アドニスパール」と比較して、花卉のバンド2の色が157Dであること、花糸の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

SPURVELUND I/S

Fangelvej 32, Allested-Vejle DK-5672 BROBY, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Stefan Lund Thorsten Lund

7 出願公表の年月日 平成28年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第26542号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus L. HAWHIB2010

3 登録品種の特性の概要

樹皮の亀裂の形は線状、樹皮の色は灰、枝の粗密は中、葉全体の形は広卵形、葉先端の形は鋭形、葉基部の形は円形、葉縁の形は鈍鋸歯、葉身の長さは中、葉身の幅は中、新葉表面の色は137A、成葉表面の色は139A、斑の有無は無、新葉表面の光沢は強、成葉表面の光沢は強、新葉表面の毛は有（白）、成葉表面の毛は有（白）、葉脈の形は掌状型、葉柄の太さは中、葉柄の長さは中、葉柄の色はその他（褐）、托葉の形は線状披針形、托葉の長さは短、花冠の向きは横向き、花冠の開き方は平開、花冠の型は一重咲き、花弁の重なりは重なる、花冠の長径は極小、つぼみの色は48C、単色・複色の別は三色、複色のタイプはバンド、花弁のバンド1の色はN187A、花弁のバンド2の色は53C、花弁のバンド3の色は65A、花弁の脈の明瞭さは不明瞭、花弁のバンド1の幅は狭、花弁のバンド2の幅はやや狭、花弁のバンド3の幅はやや狭、花弁全体の形は扇型、花弁のねじれは無、花弁の長さは短、花弁の幅は中、花弁の数は少、花弁の光沢は無、ずい柱の弁化の有無は無、ずい柱の曲りは弱、ずい柱の太さは中、ずい柱の長さは短、ずい柱の色のタイプは三色、ずい柱基部の色は59A、ずい柱先端の色は155B、ずい柱先端裂片の数は5裂、花柱枝の色は白、花柱枝の毛は有（赤）、柱頭の色はオレンジ、花糸の長さは短、花糸の色は白、やくの色は黄、花柄上部の太さは中、花柄上部の長さは中、花柄上部の色は143A、花柄下部の太さは中、花柄下部の長さは長、花柄下部の色は143B、副がくの形は狭披針形、副がくの開放の方向はやや接着、副がくの色は緑、がく筒の形は鐘形、がく筒の長さは中、がく筒の色は淡緑、がく裂片の形態は鋭形、がく裂片の切れ込みは中裂、がく裂片の毛は有（白）、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「HAWHIB2010」は、対照品種「GRACES2」と比較して、花弁のバンド1の色がN187Aであること、ずい柱基部の色が59Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

SPURVELUND I/S

Fangelvej 32, Allested-Vejle DK-5672 BROBY, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Stefan Lund Thorsten Lund

7 出願公表の年月日 平成28年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第26543号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. HORWES

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高はやや低、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形はやや細、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は平形、花序の花型はガクアジサイ型、花序の直径は小、両性花の色は淡紅（酸性区：淡青）、装飾花の数はかなり少、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度はやや強、装飾花の直径はやや小、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプは覆輪、装飾花の主色は63B（酸性区：100B）、装飾花の複色の色はNN155C、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「HORWES」は、対照品種「アウスレーゼ」と比較して、装飾花のがく片の重なり程度がやや強であること、枝の斑点の色が淡緑であること等で区別性が認められる。対照品種「紫式部」と比較して、装飾花のがく片の重なり程度がやや強であること、枝の斑点の色が淡緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Jungpflanzen Claus & Torsten Kuhne GbR
Radeburger Landstr. 12, Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Meinl Katrin

7 出願公表の年月日 平成27年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第26544号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. ファンタスヘッドグラス

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、子葉の大きさはやや大、子葉の形は楕円形、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅は中、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）は強、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）は固い、球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）は中、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）は偏円形、葉の長さは中、葉の幅は広、収穫期の葉の姿勢は水平、葉の形は横広楕円形、葉身の先端の形は円形、外葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱はやや弱、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さはかなり浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密は中、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）は深波状、収穫期は中である。

出願品種「ファンタスヘッドグラス」は、対照品種「スティンガー」と比較して、葉身の周縁の波打ちの強弱が中であること、葉身の先端部の切れ込みの粗密が中であること等で区別性が認められる。対照品種「シスコ」と比較して、葉の凹凸の強弱がやや弱であること、葉身の周縁の波打ちの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ツルタのタネ株式会社
群馬県伊勢崎市赤堀今井町二丁目1098番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名

鶴田敏行 森井雅彦 太田奈々 依田誠一郎

7 出願公表の年月日 平成26年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第26545号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. グランディヘッドグラス

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、子葉の大きさはやや大、子葉の形は楕円形、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅は中、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）は強、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）は中、球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）はやや大、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）は偏円形、葉の長さはやや長、葉の幅は広、収穫期の葉の姿勢は水平、葉の形は横広楕円形、葉身の先端の形は円形、外葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱は弱、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さはかなり浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密は粗、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）は深波状、収穫期は中である。

出願品種「グランディヘッドグラス」は、対照品種「バンガード」と比較して、葉の凹凸の強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ファンタスヘッドグラス」と比較して、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「シスコ」と比較して、葉の姿勢が開張性であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ツルタのタネ株式会社
群馬県伊勢崎市赤堀今井町二丁目1098番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名

鶴田敏行 森井雅彦 太田奈々 依田誠一郎

7 出願公表の年月日 平成26年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第26546号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. WN-LL749

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、子葉の大きさはかなり大、子葉の形は楕円形、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅は中、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）は強、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）は固い、球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）は中、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）は偏円形、葉の長さ（半結球、結球品種に限る。）は中、葉の幅は広、収穫期の葉の姿勢は水平、葉の形は横広楕円形、葉身の先端の形は円形、外葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱はやや弱、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さはかなり浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密は粗、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）は歯状、収穫期は中である。

出願品種「WN-LL749」は、対照品種「シナノスター」と比較して、葉の凹凸の強弱がやや弱であること、葉身の先端部の切れ込みの深さがかなり浅であること等で区別性が認められる。対照品種「ラプトル」と比較して、子葉の大きさがかなり大であること、葉身の先端部の切れ込みの深さがかなり浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

渡辺農事株式会社
千葉県野田市柳沢13番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

山田渉

7 出願公表の年月日 平成26年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26547号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. KAY-006

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、子葉の大きさは中、子葉の形は楕円形、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅は中、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）は強、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）は中、球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）は中、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）は偏円形、葉の長さはやや長、葉の幅は広、収穫期の葉の姿勢は水平、葉の形は横広楕円形、葉身の先端の形は円形、外葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱は強、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密は粗、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）は歯状、収穫期は中である。

出願品種「KAY-006」は、対照品種「ロジック」と比較して、葉の凹凸の強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種「ラプトル」と比較して、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

堀内可一 久保田斎 小金澤碩城

7 出願公表の年月日 平成26年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26548号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. SL-1411

3 登録品種の特性の概要

種子の色は白、子葉の大きさはかなり小、子葉の形は狭楕円形、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅はやや小、結球性は不結球、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、収穫期の葉の姿勢は立、葉の形は倒卵形、葉身の先端の形は円形、外葉の色相は赤味、葉のアントシアニン着色の有無は有、葉の光沢の強弱は強、葉の凹凸の強弱はかなり弱、葉身の周縁の波打ちの強弱はかなり弱、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密は密、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）は歯状、収穫期はやや早である。

出願品種「SL-1411」は、対照品種「イノベーションレッドグラス」と比較して、子葉の形が狭楕円形であること、収穫期の葉の姿勢が立であること、葉の凹凸の強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山陽種苗株式会社
兵庫県姫路市神屋町6-65

6 登録品種の育成をした者の氏名

古澤祥平

7 出願公表の年月日 平成27年7月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第26549号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. NL1965

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、子葉の大きさは大、子葉の形は楕円形、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅はやや小、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）は中、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）は固い、球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）はやや小、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）は偏円形、葉の長さは中、葉の幅はやや広、収穫期の葉の姿勢は斜上、葉の形は横広楕円形、葉身の先端の形は円形、外葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱はやや弱、葉身の周縁の波打ちの強弱はやや弱、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは中、葉身の先端部の切れ込みの粗密は中、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）は歯状、収穫期は中、抽だい始期は中、開花期の草丈は高である。

出願品種「NL1965」は、対照品種「シナノホープ」と比較して、葉身の先端部の切れ込みの粗密が中であること、抽だい始期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「KA-1231」と比較して、抽だい始期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「スプリング ヘッドグラス」と比較して、葉の凹凸の大きさがやや大であること、芯の大きさが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

日東農産種苗株式会社
神奈川県横浜市南区唐沢32番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

武居俊雄

7 出願公表の年月日 平成27年8月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第26550号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. TLE516

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、子葉の大きさは中、子葉の形は楕円形、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅はやや大、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）は強、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）は中、球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）は大、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）は偏円形、葉の長さはやや長、葉の幅は広、収穫期の葉の姿勢は水平、葉の形は倒卵形、葉身の先端の形は円形、外葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱は弱、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さはかなり浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密は粗、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）は深波状、収穫期は中である。

出願品種「TLE516」は、対照品種「シスコ」と比較して、球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）が大であること、芯の大きさがかなり大であること等で区別性が認められる。対照品種「TLE419」と比較して、球重（半結球、結球品種に限る。）が重であること、芯の大きさがかなり大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

石田了 岡田有平 山本正美 千葉潤一

7 出願公表の年月日 平成28年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26551号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. SAKLET013

3 登録品種の特性の概要

種子の色は白、子葉の大きさは極大、子葉の形は楕円形、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅は中、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）は強、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）はやや固い、球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）は中、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）は偏円形、葉の長さは中、葉の幅は広、収穫期の葉の姿勢は斜上、葉の形は横広楕円形、葉身の先端の形は円形、外葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱はやや弱、葉身の周縁の波打ちの強弱はやや弱、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは中、葉身の先端部の切れ込みの粗密はやや密、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）は歯状、収穫期は中、抽だい始期は極晩、開花期の草丈はやや低である。

出願品種「SAKLET013」は、対照品種「SAKLET004」と比較して、子葉の大きさが極大であること、芯の大きさがやや小であること等で区別性が認められる。対照品種

「SAKLET011」と比較して、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）はやや固いであること、葉身の先端部の切れ込みの粗密がやや密であること等で区別性が認められる。対照品種「タフオラ0566」と比較して、子葉の大きさが極大であること、葉身の先端部の切れ込みの粗密がやや密であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ

神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中康夫 栃木隆廣 松田佳子 西川盾士

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26552号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. FLAMBINE

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、子葉の大きさは小、子葉の形は広楕円形、葉身の切れ込みの型は全裂、株の幅は小、結球性は不結球、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、収穫期の葉の姿勢は水平、葉の形は横広楕円形、葉身の先端の形は円形、外葉の色相は赤味、葉のアントシアニン着色の有無は有、葉の光沢の強弱は強、葉の凹凸の強弱は強、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは深、葉身の先端部の切れ込みの粗密は粗、収穫期はやや早である。

出願品種「FLAMBINE」は、対照品種「ルージュ」と比較して、種子の色が黒であること、葉のアントシアニン着色の強弱がかなり強であること等で区別性が認められる。対照品種「キュアレッド1号」と比較して、葉身の切れ込みの型が全裂であること、葉の幅がやや狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Vilmorin SA

Route du Manoir la Garenne 49250 La Menitre France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Herve MICHEL

7 出願公表の年月日 平成28年8月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26553号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 日本杉山錦515-宮城1号 (ニホンスギヤマニシキ515-ミヤギ1ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期は早、柱頭の色は白、稈の太さはやや太、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は長、穂の主軸の長さはやや長、穂数は少、芒の有無は無、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は早、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、粳の千粒重はやや大、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重はやや大、玄米の長さはやや長、玄米の幅はやや広、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は6型、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性はかなり弱、穂発芽性はかなり難、脱粒性は難、精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）は41～60%である。

出願品種「日本杉山錦515-宮城1号」は、対照品種「美山錦」と比較して、障害型耐冷性がかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「華かほり」と比較して、出穂期が早であること、成熟期が早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

杉山親嗣

宮城県仙台市若林区伊在字東通57番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

杉山親嗣

7 出願公表の年月日 平成24年5月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第26554号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus avium (L.) L. ぽれん太 (ポレンタ)

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹姿は開張、節間長は短、枝の太さは中、葉身の長さは中、葉身の長さ／幅は中、葉身の長さ／葉柄の長さは中、花の直径はやや大、花弁の形は広倒卵形、果実の大きさは小、果実の形は扁円形、果頂部の形は凹、果実の縫合線の明瞭度は不明瞭、果柄の長さは中、果皮の色は淡赤、果肉の色はクリーム、果実の硬さは軟、果実の酸味は低、果実の甘味は中、果汁の多少は多、核の大きさは中、核の形は円形、開花始期はかなり早、収穫始期はかなり早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ぽれん太」は、対照品種「甲斐オウ果6」と比較して、枝の皮目の数が中であること、果実の形が扁円形であること、核の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「高砂」と比較して、枝の皮目の数が中であること、果実の形が扁円形であること、核の大きさが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山梨県
山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

新谷勝広 太田佳宏 三宅正則 雨宮秀仁 竹下政春 飯島光夫 佐藤明子 猪股雅人 竹腰優

7 出願公表の年月日 平成28年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第26555号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch こがね名月 (コガネイゲツ)

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさは中、樹勢は弱、樹姿は開張、枝の太さは中、着花枝のアントシアニン着色の強弱は中、着花枝の花芽の粗密は密、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は橙、花冠の表面の色は桃、花弁の大きさは中、雄ずいの花弁に対する位置は同位、柱頭のやくに対する位置は上位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、新しょうのたく葉の長さは短、葉身の長さは短、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は凹、葉身の先端の反りの有無は有、葉身の基部の形はほぼ直角、葉身の色は緑黄、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は円形、腎臓形、蜜腺の数は3以上、果実の大きさはやや大、果実の形は扁円形、果頂部の形は深狭凹、果実の対称性は非対称、縫合線の強弱は強、梗あ幅はやや広、果実の地色は黄、果実の着色の型は斑状、果実の着色面積はやや大、果実の毛じの粗密は密、果皮の厚さは薄、果皮の付着性は強、果肉の硬さは硬、果肉の地色は黄、果肉のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、果肉の肉質は繊維質、果実の甘味はかなり高、核の大きさは中、核の横面の形は倒卵形、核の褐色の濃淡はかなり濃、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少は無又は極低、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は中、収穫期は極晩である。

出願品種「こがね名月」は、対照品種「西尾ゴールド」と比較して、花粉の有無が有であること、果実の着色の型が斑状であること、果肉の硬さが硬であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社天香園
山形県東根市中島通り1丁目34号

6 登録品種の育成をした者の氏名

岡田誠

7 出願公表の年月日 平成27年7月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第26556号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch 岡山PEH9号 (オカヤマPEH9ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさは大、樹勢はやや強、樹姿は開張、枝の太さは中、着花枝のアントシアニン着色の強弱は中、着花枝の花芽の粗密は密、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は緑黄、花冠の表面の色は桃、花弁の大きさは大、雄ずいの花弁に対する位置は同位、柱頭のやくに対する位置は上位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、新しょうのたく葉の長さは長、葉身の長さは中、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は凹、葉身の先端の反りの有無は有、葉身の基部の形はほぼ直角、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は2、果実の大きさは中、果実の形は扁円形、果頂部の形は広浅凹、果実の対称性は対称、縫合線の強弱はやや弱、梗あ幅はやや狭、果実の地色は乳白、果実の着色の型はぼかし状、果実の着色面積は中、果実の毛じの粗密は中、果皮の厚さは薄、果皮の付着性は弱、果肉の硬さは軟、果肉の地色は乳白、果肉のアントシアニン着色の強弱は弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は弱、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味は高、核の大きさは中、核の横面の形は楕円形、核の褐色の濃淡は中、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少は低、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は強、収穫期は中である。

出願品種「岡山PEH9号」は、対照品種「白鳳」と比較して、樹姿が開張であること、核の周辺のアントシアニン着色の強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「清水白桃RS」と比較して、樹姿が開張であること、果肉のアントシアニン着色の強弱が弱であること、核の周辺のアントシアニン着色の強弱が弱であること、後期落果性が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岡山県
岡山県岡山市北区内山下二丁目4番6号

6 登録品種の育成をした者の氏名

日原誠介 田村隆行

7 出願公表の年月日 平成27年7月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第26557号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch var. *nucipersica* (Suckow) C. K. Schneid.

秋光 (シュウコウ)

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさは大、樹勢は中、樹姿は開張、枝の太さは中、着花枝のアントシアニン着色の強弱は弱、着花枝の花芽の粗密は密、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は橙、花冠の表面の色は桃、花弁の大きさはやや小、雄ずいの花弁に対する位置は同位、柱頭のやくに対する位置は同位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は無、新しょうのたく葉の長さは短、葉身の長さは長、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は平、葉身の先端の反りの有無は有、葉身の基部の形は鋭、葉身の色は緑黄、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は3以上、果実の大きさはやや大、果実の形は円形、果頂部の形は広浅凹、果実の対称性は対称、縫合線の強弱は弱、梗あ幅はやや狭、果実の地色は黄、果実の着色の型はべた状、果実の着色面積は極大、果皮の厚さは薄、果皮の付着性は中、果肉の硬さは硬、果肉の地色は黄、果肉のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は弱、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味は極高、核の大きさは中、核の横断面の形は倒卵形、核の褐色の濃淡は中、核の表面の紋様は条、核割れの多少は無又は極低、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は強、収穫期は晩である。

出願品種「秋光」は、対照品種「ファンタジア」と比較して、樹姿が開張であること、果実の甘味が極高であること、果実の酸味が低であること、核の褐色の濃淡が中であること、核と果肉の粘離の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「スイートネクタリン 晶光」と比較して、果肉の地色が黄であること、核と果肉の粘離の有無が有であること、収穫期が晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

相馬賢志

長野県中野市大字新井531

6 登録品種の育成をした者の氏名

相馬賢志

7 出願公表の年月日 平成27年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第26558号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus salicina Lindl. ふかさわ

3 登録品種の特性の概要

樹勢は強、枝の色の濃淡は中、短果枝の長さは中、葉身の形は楕円形、葉柄の長さは中、花の大きさは大、花弁の大きさは大、花弁の形は倒卵形、果実の大きさは極大、果実の形は円形、果頂部の形は平、梗あいの深さは中、果皮の地色は黄、果皮を覆う色は紫、果肉の色は赤、果肉の硬さは中、果汁の多少は多、果実の酸味はやや多、果実の甘味は高、核の粘離は離性、核の大きさは中、核の横面の形は楕円形、開花始期は中、成熟期はかなり晩である。

出願品種「ふかさわ」は、対照品種「ソルダム」と比較して、果実の大きさが極大であること、核の粘離が離性であること、成熟期がかなり晩であること等で区別性が認められる。対照品種「太陽」と比較して、果肉の色が赤であること、果実の甘味が高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

深澤渉

山梨県南アルプス市落合2298

6 登録品種の育成をした者の氏名

深澤渉

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第26559号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rubus L. シャロンズデライト

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立、樹の大きさは極小、樹の生育の強さは弱、前年茎枝の色は緑褐、新茎枝の長さは短、新茎枝の太さはかなり細、新茎枝のとげの多少は無又は極少、新茎枝のとげの長さは長、結果枝の発生部位は新茎枝、前年茎枝副しょう、前年茎枝、結果枝の発生数は少、結果枝の長さはかなり短、葉の長さは極短、葉の幅は極狭、葉の鋸歯の型は単、葉の表面の色は淡緑、葉柄の長さは短、花型は一重、花卉の色は白、花卉の形は楕円形、果梗の長さは極短、果実の大きさは極大、果実の形は楕円形、果実の色は黒、小核果の大きさは極大、果床の大きさは極大、果汁の多少は多、果汁の甘味はやや多、果汁の酸味はやや多、果汁の渋味は無又は極少、果汁の香気は中、開花期は中、成熟期は早、収穫期間は中である。

出願品種「シャロンズデライト」は、対照品種「APF-12」と比較して、樹の大きさが極小であること、新茎枝の長さが短であること、新茎枝の太さがかなり細であること、新茎枝のとげの多少が無又は極少であること、成葉の小葉数が3であること、小葉の葉柄の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「APF-8」と比較して、樹の大きさが極小であること、新茎枝の長さが短であること、新茎枝の太さがかなり細であること、新茎枝のとげの多少が無又は極少であること、成葉の小葉数が3であること、小葉の葉柄の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Board of Trustees of the University of Arkansas
2404 North University Avenue, Little Rock, Arkansas, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

John Reuben Clark

7 出願公表の年月日 平成27年7月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第26560号 平成30年 2月 8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Sanvitalia Lam. DISANPOBIN

3 登録品種の特性の概要

草型は中間型、茎の長さは極短、茎の太さはやや太、節間の長さは短、茎の色は紫褐、葉形は長卵形、葉の先端の形は鋭形、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉のアントシアニンの着色の有無は無、葉の表面の色は濃緑、葉の裏面の色は灰緑、葉柄の有無は無、花型は一重、花の大きさはやや大、花弁数は少、花弁の形は広線形、花弁の表面の色は17A、花弁の表面の模様の有無は無、花弁の裏面の色は6B、花弁の裏面の模様の有無は有、花弁の裏面の模様の色は緑、花梗の有無は有、花盤の大きさは中、花盤の形は凸、筒状花の色は黄、花柱の形はⅠ型、花柱の色は黄、総苞片の重なりは一重、がく片の形はⅡ型、がく片先端の形は鋭形、がく片の色は緑、開花期はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DISANPOBIN」は、対照品種「アズテックゴールド」と比較して、花弁の表面の色が17Aであること等で区別性が認められる。対照品種「スタービーニ」と比較して、花弁の表面の色が17Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Hugo Dittmar

7 出願公表の年月日 平成28年6月23日