

1 品種登録の番号及び年月日 第27226号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀涼 (シュリョウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る。）はやや粗、頭花の舌状花の形の数は2、頭花の舌状花の主要な形は船底状、頭花の舌状花の二次的な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは長、舌状花の幅はやや広、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は極早、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る。）はやや多、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る。）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀涼」は、対照品種「芳来」と比較して、たく葉の大きさが小であること、頭花の舌状花の形の数が2であること等で区別性が認められる。対照品種「精の東」と比較して、たく葉の大きさが小であること、頭花の舌状花の形の数が2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成29年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第27227号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀の陽向 (シュノヨウコウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたしたもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る。）は中、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形は船底状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は71A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は70B、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晩性は極早、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る。）はやや多、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る。）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀の陽向」は、対照品種「秀の彩」と比較して、頭花の舌状花の形の数2であること、舌状花の花筒の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「芳園の宮」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、頭花の舌状花の形の数2であること、舌状花の表面の主な色が71Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成29年5月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第27228号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀の美神 (シュウビジン)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る。）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、舌状花の花筒の長さは長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は70A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は75A、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晩性は極早、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る。）はやや多、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る。）はやや斜上である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀の美神」は、対照品種「花泉」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、頭花の舌状花の形の数1であること、舌状花の表面の主な色が70Aであること等で区別性が認められる。対照品種「秀の陽向」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、頭花の舌状花の形の数1であること、舌状花の表面の主な色が70Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成29年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第27229号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイカベロ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る。）は小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らしていないもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る。）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロータ状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）は類似する、舌状花の裏面の色はN155D、開花習性は4月～6月咲き（夏）、各開花習性における早晩性は極晩、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る。）はかなり斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイカベロ」は、対照品種「セイラスタバン」と比較して、花序の形（叢生でない品種に限る。）が散房花序型であること、花らいの外面の色が69Cであること、舌状花の表面の主な色がN155Dであること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る。）がかなり斜下であること等で区別性が認められる。対照品種「マロー」と比較して、花らいの外面の色が69Cであること、舌状花の裏面の色がN155Dであること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る。）がかなり斜下であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成29年9月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第27230号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 栄翔 (エイショウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたしたもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る。）は粗、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）は類似する、舌状花の裏面の色は3C、開花習性は4月～6月咲き（夏）、各開花習性における早晚性は極晩、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る。）は少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る。）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「栄翔」は、対照品種「晃花の宝」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや深であること、葉の周縁の二次欠刻の深さがやや浅であること等で区別性が認められる。対照品種「夏光花」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、頭花の舌状花の形の数1であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中村秀晃
静岡県浜松市西区和地町240

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村秀晃

7 出願公表の年月日 平成30年1月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第27231号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精の夏白 (セイナツシロ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る。）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは長、舌状花の幅はやや広、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は6.5週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る。）はかなり少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る。）はやや斜上である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精の夏白」は、対照品種「精州」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、葉の裂片縁部の重なりが接近するであること等で区別性が認められる。対照品種「精の一世」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、頭花の舌状花の形の数1であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成30年2月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第27232号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイリポルサーモン

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る。）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く。）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る。）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る。）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は158C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）は類似する、舌状花の裏面の色は158D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る。）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る。）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る。）は無、日長感応グルー。プ（正確な日長制御での栽培）は7週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイリポルサーモン」は、対照品種「セイリポルペールオレンジ」と比較して、舌状花の表面の主な色が158Cであること等で区別性が認められる。対照品種「セイガデス」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが接近するであること、葉の基部の形が円形であること、舌状花の表面の主な色が158Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹 荒木篤

7 出願公表の年月日 平成30年2月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第27233号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイリポルホワイト

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る。）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く。）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る。）は少、頭花の舌状花の形の数はいくつか、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る。）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや広、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る。）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る。）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る。）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイリポルホワイト」は、対照品種「セイアイシスホワイト」と比較して、花らしい外面の色が4Cであること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が外巻きであること等で区別性が認められる。対照品種「セイバルカン」と比較して、葉の一次欠刻の深さがかなり深であること、花序の形（叢生でない品種に限る。）が散房花序型であること、花らしい外面の色が4Cであること、舌状花の先端の形が丸であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹 幸田福男

7 出願公表の年月日 平成30年2月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第27234号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイリポルレモン

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る。）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く。）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る。）は少、頭花の舌状花の形の数値は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る。）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや広、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は2D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）は類似する、舌状花の裏面の色は4D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る。）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る。）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る。）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイリポルレモン」は、対照品種「セイリムー」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが接近すること、葉の基部の形が円形であること、舌状花の表面の主な色が2Dであること等で区別性が認められる。対照品種「セイオプティ」と比較して、舌状花の表面の主な色が2Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹 玉越洋成

7 出願公表の年月日 平成30年2月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第27235号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイタルク

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る。）はやや大、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く。）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る。）は少、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る。）は斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）は類似する、舌状花の裏面の色は4C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る。）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る。）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る。）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイタルク」は、対照品種「セイアドリア」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数が極多であること、花序の形（叢生でない品種に限る。）が散房花序型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成30年2月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第27236号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイレウカ

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る。）はかなり小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く。）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る。）は少、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る。）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は69C、舌状花の表面の二次色はNN155B、舌状花の表面の二次色の分布は基部、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）は類似する、舌状花の裏面の色は76D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る。）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る。）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は6週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイレウカ」は、対照品種「セイパミエ」と比較して、花らしいの外面の色が75Bであること、舌状花の先端の形が丸であること、舌状花の表面の主な色が69Cであること等で区別性が認められる。対照品種「セイリポル」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること、葉の基部の形が凹形であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がわずかに凹であること、舌状花の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成30年2月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第27237号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイチジョーロ

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る。）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く。）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る。）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る。）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は72B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）は類似する、舌状花の裏面の色は77C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る。）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る。）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る。）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイチジョーロ」は、対照品種「ディープセイピサ」と比較して、葉柄の葉長に対する長さが長であること、舌状花の表面の色数が1であること、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る。）が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成30年2月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第27238号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. シューアナバス

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る。）はやや大、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く。）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る。）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る。）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや広、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は77D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）は類似する、舌状花の裏面の色は76C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る。）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る。）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る。）は無、開花習性は4月～6月咲き（夏）、各開花習性における早晚性は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シューアナバス」は、対照品種「ソワレ」と比較して、茎の色が紫又は褐を帯びた緑であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が外巻きであること、舌状花の表面の主な色が77Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ジュリア」と比較して、たく葉の大きさが小であること、舌状花の表面の主な色が77Dであること、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る。）が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成30年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第27239号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀いちろ (シュイチロ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る。）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く。）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る。）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る。）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る。）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る。）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る。）は無、開花習性は4月～6月咲き（夏）、各開花習性における早晩性はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀いちろ」は、対照品種「かんぱい」と比較して、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る。）が斜上であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が平（巻かない）であること等で区別性が認められる。対照品種「秀このえ」と比較して、葉柄の葉長に対する長さがかなり長であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が平（巻かない）であること、自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る。）がかなり早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成30年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第27240号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀まなび (シュマナビ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る。）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く。）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る。）は少、頭花の舌状花の形の数は一、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る。）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）は類似する、舌状花の裏面の色は6C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る。）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る。）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る。）は無、開花習性は4月～6月咲き（夏）、各開花習性における早晩性は極晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀まなび」は、対照品種「秀こむろく」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さがやや長であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がやや凹であること等で区別性が認められる。対照品種「かりん」と比較して、舌状花の縦断面の形状が平であること、舌状花の先端の形が突起状であること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る。）がややドーム状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一

広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成30年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第27241号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイパレア

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る。）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く。）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る。）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る。）は斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る。）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る。）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る。）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイパレア」は、対照品種「セイイレルダ」と比較して、たく葉の大きさが小であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が平（巻かない）であること等で区別性が認められる。対照品種「セイエーグ」と比較して、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が平（巻かない）であること、舌状花の先端の形が丸であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成30年3月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第27242号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精の白虹 (セイハッコウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る。）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは長、舌状花の幅はやや広、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る。）は中、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る。）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精の白虹」は、対照品種「精の東」と比較して、葉の長さ／幅がやや高であること、葉の基部の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「精州」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、葉の裂片縁部の重なりが接すること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成30年3月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第27243号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精の曙光 (セイ/ショコウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたしたもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る。）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は7B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）は類似する、舌状花の裏面の色は10A、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る。）は少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る。）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精の曙光」は、対照品種「精の新」と比較して、葉の基部の形が円形であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が内巻きであること等で区別性が認められる。対照品種「精の枕」と比較して、葉の一次欠刻の深さがかなり深であること、葉の裂片縁部の重なりが接近するであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成30年3月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第27244号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. スズマルR

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は有、伸育型は有限、分枝の数は多、草姿は直立～斜上、茎の毛じの色は白、茎の長さは中、茎の節数は中、側小葉の形は三角形、花の色は紫、最下着きょう節位の高さは高、裂きょうの難易は中、熟さやの色の濃淡は淡、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）はかなり小、子実の形は球、種皮の色数は1色、種皮の地色は黄、子実のへその色は黄、子実の子葉の色は黄、開花始期は中、成熟期は中、生態型は夏大豆型、粗タンパク含有率はやや低である。

出願品種「スズマルR」は、対照品種「スズマル」と比較して、ダイズシストセンチュウ抵抗性（レース1）が極強であること、ダイズシストセンチュウ抵抗性（レース3）が極強であること等で区別性が認められる。対照品種「ユキシズカ」と比較して、茎の長さが中であること、ダイズシストセンチュウ抵抗性（レース1）が極強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

地方独立行政法人北海道立総合研究機構
北海道札幌市北区北十九条西11丁目1番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤田正平 鴻坂扶美子 大西志全 田中義則 黒崎英樹 竹内徹 木口忠彦
山下陽子 樋浦里志

7 出願公表の年月日 平成28年3月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第27245号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. えんれいのそら

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は有、伸育型は有限、分枝の数は中、草姿は直立～斜上、茎の毛じの色は白、茎の長さはやや短、茎の節数はやや少、側小葉の形は鋭先卵形、花の色は紫、最下着きょう節位の高さは中、裂きょうの難易は難、熟さやの色の濃淡は中、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）は大、子実の形は球、種皮の色数は1色、種皮の地色は黄、子実のへその色は黄、子実の子葉の色は黄、開花始期は早、成熟期はやや早、生態型は中間型、粗タンパク含有率は高である。

出願品種「えんれいのそら」は、対照品種「エンレイ」と比較して、裂きょうの難易が難であること等で区別性が認められる。対照品種「タチナガハ」と比較して、側小葉の形が鋭先卵形であること、裂きょうの難易が難であること、粗タンパク含有率が高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋浩司 山田哲也 菱沼亜衣 湯本節三 羽鹿牧太 平田香里 山田直弘
船附秀行 大木信彦 松永亮一 小巻克巳

7 出願公表の年月日 平成28年7月27日

1 品種登録の番号及び年月日 第27246号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. 竜系3号 (リュウケイ3ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は有、伸育型は有限、分枝の数は極多、草姿は直立～斜上、茎の毛じの色は褐、茎の長さは極長、茎の節数はやや多、側小葉の形は披針形、花の色は紫、最下着きょう節位の高さは極高、裂きょうの難易は難、熟さやの色の濃淡は極濃、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）はかなり小、子実の形は球、種皮の色数は1色、種皮の地色は黒、子実のへその色は黒、子実の子葉の色は緑、開花始期はかなり晩、成熟期はかなり晩である。

出願品種「竜系3号」は、対照品種「早生黒千石(P)」と比較して、胚軸のアントシアニン着色の強弱が中であること、側小葉の形が披針形であること等で区別性が認められる。対照品種「黒千石大豆」と比較して、胚軸のアントシアニン着色の有無が有であること、側小葉の形が披針形であること、花の色が紫であること等で区別性が認められる。対照品種「柳川黒小粒」と比較して、側小葉の形が披針形であること、熟さやの色の濃淡が極濃であること、子実の子葉の色が緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

三分一敬

北海道岩見沢市上幌向南3条7丁目611番地30

6 登録品種の育成をした者の氏名

三分一敬

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第27247号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. つくも4号 (ツクモ4ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は無、伸育型は有限、分枝の数は少、草姿は直立～斜上、茎の毛じの色は褐、茎の長さはやや短、茎の節数はやや少、側小葉の形は鋭先卵形、花の色は白、最下着きょう節位の高さは中、裂きょうの難易は易、熟さやの色の濃淡は濃、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）は極大、子実の大きさ（極大群の品種に限る。）は極小、子実の形は偏球、種皮の色数は1色、種皮の地色は褐、子実のへその色は暗褐、子実の子葉の色は黄、開花始期はやや早、成熟期は早である。

出願品種「つくも4号」は、対照品種「恋姫」と比較して、分枝の数が少であること等で区別性が認められる。対照品種「COL青森1983-29号」と比較して、茎の長さがやや短であること、さやの数が少であること、開花始期がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「茶豆L103」と比較して、茎の長さがやや短であること、さやの数が少であること、開花始期がやや早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

三分一敬

北海道岩見沢市上幌向南3条7丁目611番地30

6 登録品種の育成をした者の氏名

三分一敬

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第27248号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. プリモネーベ

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は低、枝の斑点の多少は中、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は微突形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形はやや粗、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は小、両性花の色は淡紅（酸性区:淡青）、装飾花の数はやや多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度はやや弱、装飾花の直径はやや小、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプはその他（ぼかし）、装飾花の主色はNN155C、装飾花の複色の色は75C（酸性区:100D）、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は有、開花の開始時期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「プリモネーベ」は、対照品種「シュガーホワイト」と比較して、装飾花のがく片の縁の切れ込みの深さが浅であること、花色の変化性が有であること、がく片の幅が中であること等で区別性が認められる。対照品種「HBA202903」と比較して、装飾花のがく片の縁の切れ込みが有であること、花色の変化性が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

仁木照夫
群馬県桐生市黒保根町下田沢3470

6 登録品種の育成をした者の氏名

仁木照夫

7 出願公表の年月日 平成25年2月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第27249号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. 花道 (ハナミチ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は高、枝の斑点の多少はやや少、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長はやや長、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は紅（酸性区：淡紫）、装飾花の数は中、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は極強、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプはその他（爪斑）、装飾花の主色は61D（酸性区：68B）、装飾花の複色の色はNN155C、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は3から7、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「花道」は、対照品種「ピンク マナスル」と比較して、樹高が高であること、装飾花の単色・複色が複色であること等で区別性が認められる。対照品種「HBA205904」と比較して、装飾花のがく片の重なり程度が極強であること、装飾花の単色・複色が複色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

田中伸介
三重県四日市市水沢野田町849-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中伸介

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第27250号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. ミネルヴァ

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は高、枝の斑点の多少はやや多、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長はやや長、葉身幅はやや広、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径はやや小、両性花の色は白、装飾花の数は多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径は小、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプは覆輪、装飾花の主色はNN155C、装飾花の複色の色は58B（酸性区:70B）、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は3から7、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミネルヴァ」は、対照品種「ジャパーニュ ミカコ」と比較して、枝の斑点の多少がやや多であること、装飾花のがく片の重なり程度が強であること等で区別性が認められる。対照品種「リップル」と比較して、装飾花のがく片の重なり程度が強であること、装飾花の直径が小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

田中伸介

三重県四日市市水沢野田町849-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中伸介

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第27251号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. ワンダーランド

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長はやや長、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は白、装飾花の数はやや多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度はやや強、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプは覆輪、装飾花の主色はNN155C、装飾花の複色の色は63A（酸性区:70B）、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は3から7、花色の変化性は有、開花の開始時期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ワンダーランド」は、対照品種「リップル」と比較して、装飾花のがく片の縁の切れ込みの深さがやや浅であること等で区別性が認められる。対照品種「未来」と比較して、装飾花のがく片の縁の切れ込みが有であること、がく片の幅がやや広であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

田中伸介

三重県四日市市水沢野田町849-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中伸介

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第27252号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. ハワイアンジュピター

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高はかなり低、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は心形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は小、両性花の色は淡紅（酸性区：青）、装飾花の数はやや多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径はやや小、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプは覆輪、装飾花の主色は63A（酸性区：77A）、装飾花の複色の色はNN155C、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は3から7、花色の変化性は有、開花の開始時期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ハワイアンジュピター」は、対照品種「センセーション（白覆輪系）」と比較して、装飾花のがく片の縁の切れ込みが無であること等で区別性が認められる。対照品種「チボリ」と比較して、葉身基部の形が心形であること、がく片の幅がやや狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

葉山一幸
愛知県田原市小塩津町宮東13番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

葉山一幸

7 出願公表の年月日 平成26年1月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第27253号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. HORZU

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は無、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形はやや細、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径はやや小、両性花の色は紅（酸性区：青）、装飾花の数は中、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプは絞り、装飾花の主色は67D（酸性区：N81D）、装飾花の複色の色はNN155C、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「HORZU」は、対照品種「桜組」と比較して、枝の斑点の多少が無であること、新梢の色がその他（紫褐）であること等で区別性が認められる。対照品種「ルミエール」と比較して、枝の斑点の多少が無であること、新梢の色がその他（紫褐）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Jungpflanzen Claus & Torsten Kuhne GbR
Radeburger Landstr. 12, Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Meinl Katrin

7 出願公表の年月日 平成27年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第27254号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 仁木1号 (ニキゴウ)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡はやや濃、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は半立、出穂期は極早、柱頭の色は淡緑、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は中、穂の主軸の長さは中、穂数はやや多、芒の有無は無、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は黄、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は極早、穎の色は黄白、護穎の長さは長、護穎の色は黄白、粳の千粒重は大、玄米の千粒重は大、玄米の長さはやや長、玄米の幅はやや広、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は5型、玄米の香りは無又は極弱、穂発芽性はかなり難、脱粒性は難である。

出願品種「仁木1号」は、対照品種「おしまこ180」と比較して、胚乳のアミロース含量が5型であること、穂発芽性がかなり難であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

仁木 覺
徳島県徳島市八万町夷山24番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

仁木 覺

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第27255号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 清水 1号 (シズ 1ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期は早、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）はかなり短、穂の主軸の長さはやや長、穂数の中、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さは極短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は早、穎の色は黄白、護穎の長さはやや長、護穎の色は黄白、粳の千粒重はやや大、玄米の千粒重はやや大、玄米の長さはやや長、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は5型、玄米の香りは無又は極弱、脱粒性は難である。

出願品種「清水 1号」は、対照品種「ふくまる」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）がかなり短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鷹見直美

岐阜県中津川市阿木7171番地

鷹見義公

岐阜県中津川市阿木6937番地

安藤孝義

岐阜県中津川市阿木6638番地の1

保母弘久

岐阜県中津川市阿木699番地

足立幸博

岐阜県中津川市阿木7314番地の1

鷹見和明

岐阜県中津川市阿木7046番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

鷹見直美 鷹見義公 安藤孝義 保母弘久 足立幸博 鷹見和明

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第27256号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Passiflora edulis Sims サニーシャイン

3 登録品種の特性の概要

葉身の緑色の濃淡は中、葉柄の長さはやや長、蜜腺の位置は葉身に接する、がく片の長さは中、花卉の長さは中、喉部の環状斑の色の濃淡は無又は淡、副花冠の直径は中、副花冠の環状紫斑の有無は有、副花冠の環状紫斑の幅はやや広、副花冠の先端部の斑点の有無は無、果実の大きさは中、果実の長さはやや長、果実の直径はやや大、果皮の色は鮮赤、種子の大きさは大、果肉の色は黄橙、果実の甘味は中、果実の酸味は中、収穫期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「サニーシャイン」は、対照品種「サマークイーン」と比較して、つるの色が緑紫であること、果皮の色が鮮赤であること、収穫期が晩であること等で区別性が認められる。対照品種「ルビースター」と比較して、つるの色が緑紫であること、葉身の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
茨城県つくば市大わし1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

緒方達志 山中慎介 高木洋子 香西直子 米本仁巳

7 出願公表の年月日 平成28年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第27257号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. REGPURSTR

3 登録品種の特性の概要

茎の色は緑、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の基部の重なりは大きく開く、葉の切れ込みの有無は有、葉の周縁の欠刻の深さはやや浅、葉身の表面の主な色は緑、小花柄の色は緑、花の直径は大、上部花弁の幅は広、上部花弁の模様の有無は有、上部花弁の模様の形は条斑状、斑紋状、上部花弁の表面の周縁部の色は69D、上部花弁の裏面の色は64A;69D(周縁部)、下部花弁の表面の周縁部の色は69D、下部花弁の裏面の色は85A;69D(周縁部)である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「REGPURSTR」は、対照品種「PELWWE」と比較して、花の直径が大であること、花弁の波打ちの強弱がやや強であること、上部花弁の模様の大きさがかなり大であること等で区別性が認められる。対照品種「REGWEY」と比較して、小花柄の色が緑であること、上部花弁の模様の大きさがかなり大であること、下部花弁の模様の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「CAMBI」と比較して、花の直径が大であること、下部花弁の表面の周縁部の色が69Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Str. 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Geibel

7 出願公表の年月日 平成28年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第27258号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. CAMPEACL

3 登録品種の特性の概要

茎の色は緑、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の基部の重なりは大きく開く、葉の切れ込みの有無は有、葉の周縁の欠刻の深さは中、葉身の表面の主な色はやや淡緑、小花柄の色は緑、花の直径はやや大、上部花弁の幅は中、上部花弁の模様の有無は有、上部花弁の模様の形は条斑状、斑紋状、上部花弁の表面の周縁部の色はN155B、上部花弁の裏面の色は73D、下部花弁の表面の周縁部の色はN155B、下部花弁の裏面の色は73Dである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「CAMPEACL」は、対照品種「エリカーム」と比較して、花の直径がやや大であること、上部花弁の幅が中であること、上部花弁の表面の周縁部と模様間の色が52Bであること等で区別性が認められる。対照品種「スカラップ」と比較して、花弁の波打ちの強弱が中であること、上部花弁の表面の周縁部と模様間の色が52Bであること、下部花弁の模様の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Str. 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Geibel

7 出願公表の年月日 平成28年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第27259号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. SSPEL03

3 登録品種の特性の概要

茎の色は緑、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の基部の重なりは大きく開く、葉の切れ込みの有無は有、葉の周縁の欠刻の深さはやや浅、葉身の表面の主な色はやや淡緑、小花柄の色は緑、花の直径は小、上部花弁の幅は狭、上部花弁の模様の有無は有、上部花弁の模様の形は条斑状、上部花弁の表面の周縁部の色は64B、上部花弁の裏面の色は71B、下部花弁の表面の周縁部の色はN155B、下部花弁の裏面の色はN74B;76C(周縁部)である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「SSPEL03」は、対照品種「パクヴィオラ」と比較して、葉身の基部の重なりが大きく開くであること、上部花弁の表面の周縁部の色が64Bであること等で区別性が認められる。対照品種「パクブルグ」と比較して、上部花弁の表面の周縁部と模様間の色がN74Aであること、下部花弁の表面の中間部の色がN74Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鈴木清次
神奈川県茅ヶ崎市中島1097番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木清次

7 出願公表の年月日 平成28年11月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第27260号 平成31年 2月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum tuberosum L. コナユタカ

3 登録品種の特性の概要

幼芽の大きさは小、幼芽の形は円錐形、幼芽の基部のアントシアニン着色の強弱は強、幼芽の頂部の基部に対する大きさは中、幼芽の頂部の型は中間、幼芽の頂部のアントシアニン着色の強弱は強、幼芽の根端の数は中、植物体の草姿は直立、小葉の重なりは中間、複葉の緑色の濃淡は濃、第二側小葉の長幅比は中、植物体の草高は高、花の数は多、花冠の大きさはやや大、花冠内面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、やくの色は黄橙、枯ちよう期はかなり晩、塊茎の形は円形、塊茎の皮色は黄、塊茎の目の基部の色は黄、塊茎の表皮のネットは少、塊茎の肉色は淡黄、上いも重はやや重、上いも数は中、上いもの平均重は極重、ジャガイモシストセンチュウ抵抗性は有である。

出願品種「コナユタカ」は、対照品種「コナフブキ」と比較して、幼芽の頂部のアントシアニン着色の強弱が強であること、花冠内面のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、ジャガイモシストセンチュウ抵抗性が有であること等で区別性が認められる。対照品種「サクラフブキ」と比較して、幼芽の頂部のアントシアニン着色の強弱が強であること、花冠内面のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

地方独立行政法人北海道立総合研究機構
北海道札幌市北区北十九条西11丁目1番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

大波正寿 藤田涼平 中山輝 萩原誠司 江部成彦 池谷聡 千田圭一 田中静幸
入谷正樹 伊藤武 竹内徹

7 出願公表の年月日 平成26年10月28日