

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 6 5 1 号 令和元年 1 2 月 2 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Bidens L. SUNBIDEVB 2

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間型、草丈は中、分枝性は多、茎のアントシアニン着色の強弱はかなり強、茎の毛の有無は無、葉の型は一回羽状複葉、葉の大きさは小、葉の色は濃緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の粗密は粗、頭花の型は一重咲（舌状花 8 未満）、舌状花の向きは水平、頭花の直径はやや小、花盤の頭花に対する直径の大きさは中、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の切れ込みの深さは浅、舌状花の表面の地色は14A、舌状花の表面の二次色は34A、舌状花の表面の二次色の分布は先端部、舌状花の表面の二次色の面積はやや大（低温期:かなり大）、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SUNBIDEVB 2」は、対照品種「DBIDBLAZGL」と比較して、茎の毛の有無が無であること、舌状花の長さ／幅が大であること、舌状花の表面の二次色が34Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤和規

7 出願公表の年月日 平成 2 8 年 5 月 3 1 日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27652号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. Tifosi dLV 01

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は中、茎の長さはやや長、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の先端の形は狭鋭形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、小花柄の長さは中、がく片の長さは中、がく片の幅は狭、花型は八重、花の幅はやや狭、花の切れ込みは極強、花の脈は中、花の主な色は84A、生育期間中の花色の変化は無又は弱、花冠裂片の先端の形は円形である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Tifosi dLV 01」は、対照品種「US08CJ1601」と比較して、花の幅がやや狭であること、花の切れ込みが極強であること、花冠裂片の先端の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジョルディカワムラ
栃木県日光市豊田319番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

川村一徳

7 出願公表の年月日 平成29年2月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 6 5 3 号 令和元年 1 2 月 2 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. Tifosi dPY 01

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は高、茎の長さは中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の先端の形は円形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、小花柄の長さは中、がく片の長さは短、がく片の幅は狭、花型は八重、花の幅はやや狭、花の切れ込みは中、花の脈は中、花の主な色は62A、花の二次色は11D、花の二次色の分布は不規則、生育期間中の花色の変化は無又は弱、花冠裂片の先端の形は凹形である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Tifosi dPY 01」は、対照品種「サムカリ2352」と比較して、花の脈が中であること、花の主な色が62Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジョルディカワムラ
栃木県日光市豊田319番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

川村一徳

7 出願公表の年月日 平成 2 9 年 2 月 2 3 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 6 5 4 号 令和元年 1 2 月 2 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. Tifosi dPR 01

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は中、茎の長さはやや長、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、小花柄の長さは短、がく片の長さは極短、がく片の幅は中、花型は八重、花の幅は狭、花の切れ込みは中、花の脈は無又は極弱、花の主な色はN74B、生育期間中の花色の変化は無又は弱、花冠裂片の先端の形は凹形である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Tifosi dPR 01」は、対照品種「US08CJ0202」と比較して、花の幅が狭であること、花の主な色がN74Bであること等で区別性が認められる。対照品種「MF Double Pink08」と比較して、花の幅が狭であること、花の脈が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジョルディカワムラ
栃木県日光市豊田319番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

川村一徳

7 出願公表の年月日 平成 2 9 年 2 月 2 3 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27655号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. Tifosi dCY 01

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は高、茎の長さは長、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は濃緑、小花柄の長さは中、がく片の長さは長、がく片の幅は中、花型は八重、花の幅はやや狭、花の切れ込みは中、花の脈は無又は極弱、花の主な色は2B、生育期間中の花色の変化は無又は弱、花冠裂片の先端の形は円形である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Tifosi dCY 01」は、対照品種「アマービレ ダブルパイナップル」と比較して、花の主な色が2Bであること等で区別性が認められる。対照品種「MF Double dark yellow 62」と比較して、茎の長さが長であること、葉の先端の形が鈍形であること、がく片の幅が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジョルディカワムラ
栃木県日光市豊田319番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

川村一徳

7 出願公表の年月日 平成29年2月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27656号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. Tifosi dRP 01

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は高、茎の長さは中、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は濃緑、小花柄の長さは短、がく片の長さは短、がく片の幅は狭、花型は八重、花の幅はやや狭、花の切れ込みは中、花の脈は無又は極弱、花の主な色は61B、生育期間中の花色の変化は無又は弱、花冠裂片の先端の形は凹形である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Tifosi dRP 01」は、対照品種「US08CJ0202」と比較して、花の主な色が61Bであること、花冠裂片の先端の形が凹形であること等で区別性が認められる。対照品種「KLECA09207」と比較して、花の幅がやや狭であること、開花初期の花の主な色が61Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジョルディカワムラ
栃木県日光市豊田319番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

川村一徳

7 出願公表の年月日 平成29年2月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 7 6 5 7 号 令和元年 1 2 月 2 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. Tifosi dWH 01

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張性、草丈はやや低、茎の長さは長、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、小花柄の長さは中、がく片の長さは短、がく片の幅は狭、花型は八重、花の幅は狭、花の切れ込みは中、花の脈は弱、花の主な色はNN155D、生育期間中の花色の変化は無又は弱、花冠裂片の先端の形は円形である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Tifosi dWH 01」は、対照品種「サムカリ2350」と比較して、花の脈が弱であること、花の主な色がNN155Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジョルディカワムラ
栃木県日光市豊田319番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

川村一徳

7 出願公表の年月日 平成 2 9 年 2 月 2 3 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27658号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. Tifosi dBP 01

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈はやや高、茎の長さはやや長、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は淡緑、小花柄の長さは中、がく片の長さは中、がく片の幅は中、花型は八重、花の幅は中、花の切れ込みは強、花の脈は中、花の主な色は73C、生育期間中の花色の変化は無又は弱、花冠裂片の先端の形は切形である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Tifosi dBP 01」は、対照品種「KLECA11228」と比較して、草姿が中間であること、花の幅が中であること等で区別性が認められる。対照品種「Tifosi dPY 01」と比較して、花の主な色が73Cであること、花冠裂片の先端の形が切形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジョルディカワムラ
栃木県日光市豊田319番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

川村一徳

7 出願公表の年月日 平成29年2月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27659号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. Tifosi HP 01

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈はやや高、茎の長さは中、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、小花柄の長さは短、がく片の長さは短、がく片の幅は中、花型は一重、花の幅はやや広、花の切れ込みは強、花の脈は無又は極弱、花の喉部の主な色の大きさはかなり小、花の喉部の主な色の型は円形、花の喉部の斑紋は無又は極小、花の主な色はNN74A、生育期間中の花色の変化は無又は弱、花冠裂片の先端の形は凹形、花筒の内面の主な色は12B、花筒の内面の脈は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Tifosi HP 01」は、対照品種「ノア メガピンク」と比較して、花の主な色がNN74Aであること、花冠裂片の先端の形が凹形であること等で区別性が認められる。対照品種「Suncalpi」と比較して、花の喉部の主な色の大きさがかなり小であること、花冠裂片の先端の形が凹形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジョルディカワムラ
栃木県日光市豊田319番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

川村一徳

7 出願公表の年月日 平成29年2月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27660号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. Tifosi LV 01

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈はやや低、茎の長さは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、小花柄の長さは極短、がく片の長さは短、がく片の幅は中、花型は一重、花の幅はやや狭、花の切れ込みは強、花の脈は弱、花の喉部の主な色の大きさはかなり小、花の喉部の主な色の型は部分的に円形、花の喉部の斑紋は無又は極小、花の主な色はN81B、生育期間中の花色の変化は無又は弱、花冠裂片の先端の形は円形、花筒の内面の主な色は9C、花筒の内面の脈は中である。
(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Tifosi LV 01」は、対照品種「CALPRIBUL」と比較して、花の切れ込みが強いこと、花の主な色がN81Bであること等で区別性が認められる。対照品種「tifosi MB 01」と比較して、花の幅がやや狭であること、花の主な色がN81Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジョルディカワムラ
栃木県日光市豊田319番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

川村一徳

7 出願公表の年月日 平成29年2月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27661号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. スフェラ オレンジ

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は168B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN167C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「スフェラ オレンジ」は、対照品種「太陽の琉歌」と比較して、舌状花の縦断面の形状が外反であること、舌状花の表面の主な色が168Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹 渡辺邦道 近藤美敏 加藤與志和

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

「セイトリニティー」にピンク色系の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27662号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. カトマイ風車 (カトマイフウシャ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはやや長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は169B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は170C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カトマイ風車」は、対照品種「かじか」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さがやや浅であること、頭花の舌状花の形の数1であること、舌状花の長さが中であること、舌状花の表面の主な色が169Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成28年12月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の黄色系スプーン咲き育成系統にスプーン咲き混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27663号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. コリマナトゥーラ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は34B、舌状花の表面の二次色はN163C、舌状花の表面の二次色の分布は先端、舌状花の表面の二次色の型はぼかし、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は167D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は6週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「コリマナトゥーラ」は、対照品種「ARTAPEKO」と比較して、たく葉の大きさが中であること、舌状花の表面の主な色が34Bであること等で区別性が認められる。対照品種「オリオン」と比較して、葉の基部の形が鈍形であること、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）が斜上であること、舌状花の長さ／幅が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成28年12月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の赤黄複色の一重咲き育成系統に一重咲き系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27664号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFARGE1

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはかなり短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は極小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは極短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は6週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFARGE1」は、対照品種「DLFOLGNE」と比較して、葉の長さがかなり短であること、葉の周縁の二次欠刻の深さが深であること、頭花の直径（摘らいしていないもの）が極小であること等で区別性が認められる。対照品種「SNOCATEC」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成28年12月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27665号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFPICA4

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は53A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は181C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は6.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFPICA4」は、対照品種「セイバーニング」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、葉の先端裂片の相対的な長さがやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「CRIMSON QUEEN」と比較して、花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成28年12月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27666号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFSCOT2

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は7D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は6.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFSCOT2」は、対照品種「レミダス」と比較して、花盤の直径（デージー型の一重及び半八重品種に限る）がかなり大であること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）がややドーム状であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が6.5週間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成28年12月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27667号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DELIJULI01

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度

(叢生でない品種に限る)はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型(八重及び露心する八重品種を除く)はデージー、頭花の直径(摘らいしていないもの)は中、頭花の舌状花数(一重及び半八重品種に限る)はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き(一重及び半八重品種に限る)は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形(管状でない舌状花)はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性(ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む)は類似する、舌状花の裏面の色はNN155D、花盤の頭花に対する直径の大きさ(一重及び半八重品種に限る)は中、花盤の開やく前の色の区分(デージー型の品種に限る)は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無(デージー型の品種に限る)は無、日長感応グループ(正確な日長制御での栽培)は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き(秋)である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「DELIJULI01」は、対照品種「セイヒラリー」と比較して、舌状花の縦断面の形状が外反であること、花盤の断面の形(デージー型の品種に限る)がややドーム状であること等で区別性が認められる。対照品種「フィファルコン」と比較して、花らしい外面の色が155Bであること、舌状花の表面の状態がうね状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社デリフローラジャパン
静岡県浜松市浜北区宮口4884番地の2

6 登録品種の育成をした者の氏名

菊池和則

7 出願公表の年月日 平成29年2月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27668号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイポポロン

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形は舌状、頭花の舌状花の二次的な形は管状、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色はNN155B、舌状花の表面の二次色は65C、舌状花の表面の二次色の分布は先端、舌状花の表面の二次色の型はぼかし、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN155B;65B(先端)、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は6週間未満、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイポポロン」は、対照品種「PICATEC」と比較して、舌状花の表面の主な色がNN155Bであること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が6週間未満であること等で区別性が認められる。対照品種「Pink PangPang」と比較して、葉の長さ／幅がやや高であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が6週間未満であること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）が水平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成29年2月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のポンポン咲き育成系統にポンポン咲き及びデコラ咲き系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27669号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. FICHRYCLASSI

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数値は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は75B、舌状花の表面の二次色はN155B、舌状花の表面の二次色の分布は先端部1/4、舌状花の表面の二次色の型はぼかし、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は69C;75C(中央部の縦線)、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FICHRYCLASSI」は、対照品種「セイエルマ」と比較して、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること、舌状花の表面の主な色が75Bであること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）が強い円錐状であること等で区別性が認められる。対照品種「フィグランド ピンク」と比較して、舌状花の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B.V.
Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jos Kester

7 出願公表の年月日 平成29年3月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27670号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. FICHRYSASWHI

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FICHRYSASWHI」は、対照品種「セイフレンド」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数が多いこと、舌状花の先端の形が歯状であること、花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）が黄緑であること等で区別性が認められる。対照品種「セイヒラリー」と比較して、舌状花の縦断面の形状が外反であること、舌状花の先端の形が歯状であること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が強い円錐状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B.V.
Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jos Kester

7 出願公表の年月日 平成29年3月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

「サーシャ」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27671号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ベント オレンジ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形はロート状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さは長、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は20B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は180A、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ベント オレンジ」は、対照品種「セイパトリックイエロー」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数がやや多であること、頭花の舌状花の主要な形がロート状であること、舌状花の先端の形が深い切込みであること等で区別性が認められる。対照品種「カトマイ風車」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、頭花の舌状花の主要な形がロート状であること、舌状花の表面の主な色が20Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹 近藤美敏

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の白紅色系スプーン咲き育成系統に同色系混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27672号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ベント ピンク

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり多、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形はロート状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは長、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅はやや高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN74D;155D(先端;基部)、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ベント ピンク」は、対照品種「シズル」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数が中であること、頭花の型が半八重であること、舌状花の表面の主な色が75Dであること等で区別性が認められる。対照品種「FIPITU」と比較して、草丈が低であること、たく葉の大きさがやや大であること、舌状花の裏面の色がN74D;155D(先端;基部)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹 近藤美敏

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のピンク色系デコラ咲き育成系統にポンポン咲き及びデコラ咲き系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27673号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ベント ストライプピンク

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さは中、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は69D、舌状花の表面の二次色は71A、舌状花の表面の二次色の分布2は至る所、舌状花の表面の二次色の型は斑点及び条、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は76D;75B（中央部の縦線）、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ベント ストライプピンク」は、対照品種「セアーティストピンク」と比較して、草丈が低であること、頭花の舌状花の主要な形がさじ状であること等で区別性が認められる。対照品種「アドバンジークピンク2」と比較して、草丈が低であること、葉の長さがやや短であること、頭花の舌状花の主要な形がさじ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹 近藤美敏

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の桃白複色系のスプーン咲き育成系統にスプーン咲き系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27674号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. スフェラ レッド

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は184A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は180C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「スフェラ レッド」は、対照品種「セイマーレッタ」と比較して、草丈が中であること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）がやや斜下であること等で区別性が認められる。対照品種「セリアルテガ」と比較して、草丈が中であること、たく葉の大きさがかなり小であること、舌状花の裏面の色が180Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹 近藤美敏

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の赤色系デコラ咲き育成系統にポンポン咲き及びデコラ咲き系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27675号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. スフェラ イエロー

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はかなり小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は4B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「スフェラ イエロー」は、対照品種「FICHRYSUN」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さがやや短であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がわずかに凸であること等で区別性が認められる。対照品種「ユーロベル イエロー」と比較して、頭花の花柄の長さがかなり短であること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）が斜下であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹 近藤美敏

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のページュ色系デコラ咲き育成系統にポンポン咲き及びデコラ咲き系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27676号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. スフェラ フラム

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は露心する八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形は舌状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の花筒の長さは中、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は179B、舌状花の表面の二次色は160A、舌状花の表面の二次色の分布は先端、舌状花の表面の二次色の型はぼかし、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は180D;180A（まだら）、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「スフェラ フラム」は、対照品種「太陽のグーマレッド」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さが中であること、頭花の直径（摘らいしていないもの）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「太陽の琉歌」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、舌状花の先端の形が歯状であること、舌状花の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹 近藤美敏

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のオレンジ色系一重咲き育成系統にアネモネ咲き系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27677号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. チェルキー イエロー

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はアネモネ、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は5C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は極大、花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）は153D、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）は9A、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「チェルキー イエロー」は、対照品種「セイアルマン」と比較して、葉の基部の形が円形であること、舌状花の長さ／幅が低であること等で区別性が認められる。対照品種「セイテデオイエロー」と比較して、葉の一次欠刻の深さがかなり深であること、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）がやや少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹 近藤美敏

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のオレンジ色系アネモネ咲き育成系統にアネモネ咲き系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27678号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイリップページュ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は27B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は36D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイリップページュ」は、対照品種「かじか」と比較して、葉の長さ／幅が中であること、頭花の直径（摘らいしていないもの）が中であること、頭花の舌状花の形の数1であること等で区別性が認められる。対照品種「太陽のシェルティ」と比較して、舌状花の縦断面の形状が内曲であること、舌状花の表面の主な色が27Bであること、花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）が黄橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹 芋高健一郎

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「セイリップ」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27679号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ザンムスーズ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅は高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はかなり小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は6週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ザンムスーズ」は、対照品種「SNOCATEC」と比較して、葉の表面の緑色の濃淡が中であること、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）がかなり小であること等で区別性が認められる。対照品種「DLFARGE1」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、葉の先端裂片の相対的な長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Van Zanten Breeding B. V.
Zonneveldslaan 15, 2235SC Valkenburg, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Henricus Cornelius Maria Jacobs

7 出願公表の年月日 平成29年7月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配させ、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27680号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイブリュー

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度

（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイブリュー」は、対照品種「DELIMIQUEL」と比較して、舌状花の縦断面の形状が内曲であること、花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「FICHRYSASWHI」と比較して、草丈が中であること、葉の基部の形が円形であること、葉の周縁の二次欠刻の数がやや少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の白色系一重咲き育成系統に同色系混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27681号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイヘイゼル

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は69D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は69D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイヘイゼル」は、対照品種「DELIGWEN」と比較して、頭花の直径（摘らいしていないもの）がやや小であること、花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）が黄橙であること等で区別性が認められる。対照品種「モゼセレクト」と比較して、舌状花の裏面の色が69Dであること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）がややドーム状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のピンク色系一重咲き育成系統に同色系混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27682号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイイバンカ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイイバンカ」は、対照品種「セイラオナ」と比較して、葉の長さがやや短であること、葉の周縁の二次欠刻の深さがやや浅であること等で区別性が認められる。対照品種「セイフレンド」と比較して、たく葉の大きさが小であること、舌状花の縦断面の形状が外反であること等で区別性が認められる。対照品種「DELIJULI01」と比較して、たく葉の大きさが小であること、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）が斜上であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の白色系一重咲き育成系統に同色系混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27683号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイハニービー

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はアネモネ、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は2A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は3C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は極大、花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）はN144D、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）は6B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は6.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイハニービー」は、対照品種「LENNOX」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが接するのであること、葉の基部の形が鈍形であること等で区別性が認められる。対照品種「セアルマン」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが接するのであること、舌状花の先端の形が尖るのであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の黄色系アネモネ咲き育成系統にアネモネ咲き系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27684号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFLAN1

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFLAN1」は、対照品種「DLFOLGNE」と比較して、舌状花の花筒の長さが極短であること、舌状花の先端の形が歯状であること等で区別性が認められる。対照品種「セイイートン」と比較して、たく葉の大きさが小であること、葉の長さがやや短であること、頭花の花柄の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成29年7月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27685号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFPWA3

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり多、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN74C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は75B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFPWA3」は、対照品種「セイリップ」と比較して、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）がかなり多であること、花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）が淡黄であること等で区別性が認められる。対照品種「シューハート」と比較して、葉の長さ／幅がやや高であること、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）がかなり多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27686号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFBAE3

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は70B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は84B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFBAE3」は、対照品種「精ももとせ」と比較して、葉の一次欠刻の深さがかなり深であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が7週間であること等で区別性が認められる。対照品種「シューハート」と比較して、たく葉の大きさが小であること、葉の長さ／幅がやや高であること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が強い円錐状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成29年7月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配させ、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27687号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイパレイラサーモン

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数に1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は36A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は27B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイパレイラサーモン」は、対照品種「セイリップページュ」と比較して、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がわずかに凸であること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が平であること等で区別性が認められる。対照品種「太陽のシェルティ」と比較して、舌状花の表面の主な色が36Aであること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が平であること、花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「セイパレイラ」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27688号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. SKE110-4503

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SKE110-4503」は、対照品種「DLFOLGNE」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、花序の側枝の頭花の向き（叢生でない品種に限る）が斜上であること等で区別性が認められる。対照品種「DLFLAN1」と比較して、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）が中であること、舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）が先端部から3/4までであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「セイトリニティー」にポンポン咲き及びデコラ咲き系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27689号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFMY13

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはかなり短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは極深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は9B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は21C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は6週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFMY13」は、対照品種「レクシー」と比較して、葉の長さがかなり短であること、葉の表面の緑色の濃淡が濃であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が6週間であること等で区別性が認められる。対照品種「栗まんじゅう」と比較して、葉の長さがかなり短であること、葉の周縁の二次欠刻の深さが深であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が6週間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成29年10月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配させ、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27690号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFFIR6

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は22A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は168C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFFIR6」は、対照品種「セイルアノオレンジ」と比較して、頭花の舌状花の形の数が1であること、舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が168C;172A(先端)であること等で区別性が認められる。対照品種「レクシー」と比較して、舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が内曲であること、舌状花の表面の主な色が22Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成29年10月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配させ、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27691号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFSE10

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はアネモネ、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや大、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は75C、舌状花の表面の二次色は59B、舌状花の表面の二次色の分布2は至る所、舌状花の表面の二次色の型は斑点及び条、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は70B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は大、花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）は154C、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）は69C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFSE10」は、対照品種「DEKMONAROSY」と比較して、舌状花の表面の色数が2であること、管状花の色（アネモネ型の品種に限る）がN155B;60C(二次色)であること等で区別性が認められる。対照品種「TSH18 1-06-25」と比較して、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）が中であること、舌状花の表面の色数が2であること、管状花の色（アネモネ型の品種に限る）がN155B;60C(二次色)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成29年10月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配させ、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27692号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFMOLT6

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は171A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は172B;5B(基部1/4)、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は6.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFMOLT6」は、対照品種「DLFFIR6」と比較して、葉の長さが短であること、舌状花の表面の主な色が171Aであること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）が水平であること等で区別性が認められる。対照品種「セイルアノオレンジ」と比較して、葉の長さが短であること、舌状花の裏面の色が172B;5B(基部1/4)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成29年10月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配させ、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27693号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DFLIC13

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はアネモネ、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや大、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや多、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は76D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は極大、花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）は151A、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）は75B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFLIC13」は、対照品種「DLFLIC1A」と比較して、頭花の舌状花の形の数1であること、管状花の色（アネモネ型の品種に限る）が69C;154D(二次色)であること等で区別性が認められる。対照品種「トーラス」と比較して、頭花の直径（摘らいしていないもの）がやや大であること、管状花の色（アネモネ型の品種に限る）が69C;154D(二次色)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成29年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

「DLFLIC1A」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27694号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFTISS3

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN74D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は77C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFTISS3」は、対照品種「DEKDORIAX」と比較して、舌状花の表面の主な色がNN74Dであること、舌状花の裏面の色が77Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ピンキーロックダーク」と比較して、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）が少であること、舌状花の先端の形が歯状であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が7週間であること等で区別性が認められる。対照品種「DEKNAVONASPLENDID」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが接するのであること、舌状花の縦断面の形状が内曲であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成29年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

「DLFTISSE」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27695号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFTIDE5

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は149D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は144D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFTIDE5」は、対照品種「DELIOLIVE」と比較して、葉の表面の緑色の濃淡がやや淡であること、舌状花の表面の主な色が149Dであること等で区別性が認められる。対照品種「セイパーマー」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、葉の一次欠刻の深さがかなり深であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が7週間であること等で区別性が認められる。対照品種「セスキューバグリーン」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）が小であること、舌状花の縦断面の形状が内曲であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成29年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統に「Deliolive」を交配させ、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27696号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFBEL3

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN75D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN75A、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFBEL3」は、対照品種「セイルアノ」と比較して、茎の色が紫であること、葉の基部の形が鈍形であること等で区別性が認められる。対照品種「DEKDORIX」と比較して、茎の色が紫であること、葉の基部の形が鈍形であること、舌状花の表面の主な色がN75Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成29年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Delibeldad」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27697号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFDUDO

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は露心する八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFDUDO」は、対照品種「DELIMAGGI」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが接すること、舌状花の縦断面の形状が内曲であること等で区別性が認められる。対照品種「ザンムボーマン」と比較して、頭花の直径（摘らいしていないもの）がやや小であること、舌状花の長さが短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成29年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Delimaggi」に出願者所有の育成系統を交配させ、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27698号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFOME10

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は72B、舌状花の表面の二次色は69D、舌状花の表面の二次色の分布は先端部1/4、舌状花の表面の二次色の型はぼかし、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は84B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFOME10」は、対照品種「JEANNY DARK PINK」と比較して、舌状花の表面の主な色が72Bであること、舌状花の裏面の色が84Bであること等で区別性が認められる。対照品種「DEKDORIX」と比較して、舌状花の表面の色数が2であること、舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）がNN155B;N66D(基部1/2)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成29年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配させ、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27699号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFAR1

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや大、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形は数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFAR1」は、対照品種「DLFGOET」と比較して、花序の形（叢生でない品種に限る）が散房花序型であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が7週間であること等で区別性が認められる。対照品種「セイフレンド」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）が強いドーム状であること、花盤の開やく時の色（デージー型の品種に限る）が淡黄であること等で区別性が認められる。対照品種「セイイバンカ」と比較して、葉の基部の形が円形であること、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）が緑であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が7週間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成29年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統に「ASTUN」を交配させ、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27700号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFLAC3

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は49C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は69D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は有、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFLAC3」は、対照品種「DELIGWEN」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、舌状花の表面の主な色が49Cであること等で区別性が認められる。対照品種「セイパレイラサーモン」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さが中であること、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）が少であること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）が強い円錐状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成29年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配させ、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27701号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFR0YC7

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形は2、頭花の舌状花の主要な形は舌状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は77A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は84B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFR0YC7」は、対照品種「DELIBARCA」と比較して、頭花の舌状花の形が2であること、舌状花の花筒の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「DELIARAGON」と比較して、草丈が高であること、葉の周縁の二次欠刻の深さがやや深であること、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成29年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Delivip」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27702号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFLOVE3

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや大、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は2、頭花の舌状花の主要な形は舌状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は69D;75A(中央部の縦線)、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFLOVE3」は、対照品種「DELIETNAD」と比較して、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること、舌状花の縦断面の形状が内曲であること、舌状花の裏面の色が69D;75A(中央部の縦線)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成29年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Delivip」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27703号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFELST

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は45A、舌状花の表面の二次色は2A、舌状花の表面の二次色の分布は先端部1/4、舌状花の表面の二次色の型はぼかし、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は180C;22B(先端部1/4)、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFELST」は、対照品種「オリオン」と比較して、葉の長さが長であること、舌状花の裏面の色が180C;22B(先端部1/4)であること等で区別性が認められる。対照品種「セイエチュード」と比較して、草丈がやや高であること、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）が水平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成29年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配させ、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27704号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFR0C1

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFR0C1」は、対照品種「DELIBALTICA」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが接すること、舌状花の先端の形が突起状であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が8.5週間であること等で区別性が認められる。対照品種「ザンムボーマン」と比較して、草丈が高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成29年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Delibaltica」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27705号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFYINX1

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数値は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）2は褐黒、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は6.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFYINX1」は、対照品種「DLFYIN1」と比較して、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）が大であること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）がややドーム状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成29年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

「DLFYIN1」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27706号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DEKDORIX PINK

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は75C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DEKDORIX PINK」は、対照品種「JEANNY DARK PINK」と比較して、舌状花の裏面の色が75Cであること等で区別性が認められる。対照品種「DLFBEL3」と比較して、茎の色が紫又は褐を帯びた緑であること、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること、葉の基部の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ジャパンアグリバイオ株式会社
静岡県浜松市中区板屋町110番地の5

6 登録品種の育成をした者の氏名

C. W. Dekker

7 出願公表の年月日 平成29年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

「DEKDORIX」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27707号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L. なったん

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張、樹の大きさは中、樹勢は中、枝梢の太さは中、枝梢の長さはやや長、節間長は長、枝梢のとげの多少は無、葉身の形は紡錘形、葉身の波状の程度はやや弱、葉身の大きさは小、葉身長はやや短、葉身幅は中、葉形指数は大、網脈の鮮明度はやや明瞭、翼葉の形は楔形、葉柄の長さは長、葉柄の太さはかなり細、花序の形成は総状、花(蕾)の重さはかなり軽、花弁の形は紡錘形、花弁の長さは短、花弁の幅はやや狭、花弁の色(花蕾の外側)は白、花弁の数は5枚、花糸の分離の程度は合一、花粉の多少は中、果実の形は扁球、果頂部の形は陥没、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は不明瞭、果梗部の形は切平面、果梗部放射条溝の多少は多、果心の充実度は中、果心の大きさは中、果実の重さは中、果皮の色は黄橙、油胞の大きさは中、油胞の密度はやや密、油胞の凹凸は凹,平、果面の粗滑は粗、果皮の厚さは中、果皮歩合はやや小、剥皮の難易はやや難、じょうのう膜の硬さは硬、さじょうの形は中、さじょうの大きさはやや大、さじょう(果肉)の色は黄橙、果汁の多少は中、甘味はやや低、酸味は低、香気の多少は中、種子数は中、発芽期は中、開花期は中、成熟期は中、隔年結果性は低である。

出願品種「なったん」は、対照品種「川野夏橙」と比較して、葉柄の長さが長であること、酸味が低であること等で区別性が認められる。対照品種「八朔」と比較して、葉身の形が紡錘形であること、葉身幅が中であること、果梗部放射条溝の多少が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

常盤幸宏

神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋526番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

常盤幸宏 常盤利正

7 出願公表の年月日 平成29年10月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「川野夏橙」に「春光柑」を交配し、選抜したもので、珠心胚実生の可能性がある。

1 品種登録の番号及び年月日 第27708号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 桃色小町 (モイロコマチ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は長楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は極弱、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鋭形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色はNN155C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は70B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色はNN155C、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は70B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱はかなり弱、リップの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、リップの中央部の色はNN155C、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色はN74D、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「桃色小町」は、対照品種「舞うさぎ」と比較して、ペタルの周縁の色が70Bであること、リップの周縁の色がN74Dであること等で区別性が認められる。対照品種「グレートキャティ アコさま」と比較して、リップの周縁の色がN74Dであること、ずい柱の先端の色がN155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野通郎

7 出願公表の年月日 平成30年3月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のチャームハートにドリームシティを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27709号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 想い人 (オモイト)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は極弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鋭形、セパルの中央部の色はNN155B、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色はNN155B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅は中、ペタルの正面の形は長楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色はNN155B、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色はNN155B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鋭形、リップの周縁の反転の強弱は無又は極弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色は155C、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は75B、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「想い人」は、対照品種「ピュアフラワー ゆかり」と比較して、ペタルの幅が中であること、ずい柱の先端の色が70Bであること等で区別性が認められる。対照品種「夢咲あんない」と比較して、ペタルの幅が中であること、ペタルの正面の形が長楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成30年5月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のピンクベールに「アップルティ」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27710号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 阿波乙女 (アヲトメ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅は狭、花の香りは無又は極弱、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は73D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は64B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は64B、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は73D、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は64B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は64B、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱はかなり弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色はNN155B、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は69C、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は64A、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は64A、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「阿波乙女」は、対照品種「永遠の約束」と比較して、リップの周縁の波打ちの強弱がかなり弱であること、リップのくさびの有無が有であること、ずい柱の先端の色が75Dであること等で区別性が認められる。対照品種「福娘」と比較して、リップのくさびの有無が有であること、ずい柱の先端の色が75Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成30年5月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のラズベリーにグレートキャティを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27711号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. うだつ美人 (ウダツビジン)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は69C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は70B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は70B、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はNN155B、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は186C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は186C、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は極弱、リップの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、リップの中央部の色はNN155C、リップの花境の明瞭度は明瞭、リップの周縁の色は64A、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色は61A、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は61A、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「うだつ美人」は、対照品種「エンゼルチャーム」と比較して、リップの正面の形が円形であること、リップの周縁の波打ちの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「きまぐれヴィーナス」と比較して、リップの周縁の波打ちの強弱が無又は極弱であること、リップの斑点の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成30年5月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のミルキークイーンに育成系統を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27712号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 悠久の華 (ユウキュウノハナ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さは太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は極広、ドーサルセパルの正面の形は倒卵形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅はかなり広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は69B、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は64A、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は64A、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は69B、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は64B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は64B、リップの長さはかなり長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は切型、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色は59D、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は59B、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「悠久の華」は、対照品種「フラガール」と比較して、リップの中央部の色が59Dであること、ずい柱の斑点の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「紅ちどり」と比較して、リップの中央部の色が59Dであること、リップの周縁の色が59Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成30年3月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27713号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. オペラグラス

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は倒卵形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は倒卵形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は8A、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は8A、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は8A、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は8A、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さはかなり長、リップの幅は広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は極弱、リップの周縁の波打ちの強弱は中、リップの中央部の色は8C、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は163C、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は163A、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「オペラグラス」は、対照品種「黄金伝説」と比較して、ドーサルセパルの正面の形が倒卵形であること、リップのくさびの色が163Aであること等で区別性が認められる。対照品種「華麗 イエロークレイン」と比較して、リップのくさびの色が163Aであること、ずい柱の先端の色が163Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野通郎

7 出願公表の年月日 平成30年6月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のニュートリノにオーシャンドームを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27714号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. フェリーチェ

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は長楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は淡、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は極弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色はN155B、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は70B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は70B、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はN155B、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は70C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は70C、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色は155C、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は155C、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは極小、リップの斑点の色は71D、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「フェリーチェ」は、対照品種「かわい子ちゃん」と比較して、リップの周縁の色が155Cであること、リップの斑点の色が71Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ミュージックアワー マリア」と比較して、リップの中央部の色が155Cであること、リップの周縁の色が155Cであること、リップの斑点の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成30年6月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の「スイートワッフル タルト」に「ビューティハーブ グッドイヤー」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27715号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. もも姫 (モモヒメ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は淡、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は極弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は76D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は186B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は186B、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はN155D、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は186C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は186C、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱はやや弱、リップの中央部の色はNN155B、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色はN66D、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は64B、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「もも姫」は、対照品種「かわい子ちゃん」と比較して、リップのくさびの有無が無であること、ずい柱の先端の色が70Bであること等で区別性が認められる。対照品種「フェリーチェ」と比較して、リップの周縁の色がN66Dであること、ずい柱の先端の色が70Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成30年6月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の「エンザンスプリングハレルヤ」に「グレートキャティ リトルローランサン」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27716号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. つながり

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは強、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は倒卵形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は倒卵形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は144B、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は144B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は150D、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は144C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さはかなり長、リップの幅は広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱は強、リップの中央部の色はNN155B、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は64D、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色は186B、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「つながり」は、対照品種「エンザンオリーブ エメラルドフェザー」と比較して、セパルの中央部の色が144Bであること、リップのくさびの有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「夜想曲」と比較して、リップの周縁の色が64Dであること、リップのくさびの有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成30年9月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27717号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. コン フォーコ

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡はやや淡、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さはやや細、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅は中、花の香りは無又は極弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は倒卵形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は70C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は70C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は60B、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は70C、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は70C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は60B、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は極弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色は155B、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は61B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは極小、リップの斑点の色は64B、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「コン フォーコ」は、対照品種「賛美歌」と比較して、ペタルの中央部の色が70Cであること、リップの斑点の大きさが極小であること等で区別性が認められる。対照品種「マイピーチ」と比較して、ラテラルセパルの周縁の反転の強弱が無又は極弱であること、リップの斑点の大きさが極小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成30年8月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27718号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. りっか

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅は中、花の香りは無又は極弱、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅はかなり広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅はかなり広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は76D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は70B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は70B、ペタルの長さはやや長、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は76D、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は76D、ペタルの斑点の有無は有、ペタルの斑点の大きさはかなり小、ペタルの斑点の色は70A、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は70C、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱はやや強、リップの中央部の色は155B、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は70B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは中、リップの斑点の色は61A、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「りっか」は、対照品種「純恋花」と比較して、ペタルの周縁の反転の強弱がやや弱であること、リップの周縁の波打ちの強弱がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「ジュジュ」と比較して、ペタルの周縁の反転の強弱がやや弱であること、リップの周縁の波打ちの強弱がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成30年9月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27719号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. シャンシャン

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや少、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さは中、花の幅は中、花の香りは無又は極弱、ドーサルセパルの長さは長、ドーサルセパルの幅はかなり広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや長、ラテラルセパルの幅はかなり広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色はNN155B、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色はNN155B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは長、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はNN155B、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色はNN155B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さはかなり長、リップの幅はかなり広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱はかなり弱、リップの周縁の波打ちの強弱は中、リップの中央部の色はNN155B、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は70B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはやや小、リップの斑点の色は64A、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シャンシャン」は、対照品種「さくらむす」と比較して、リップの周縁の色が70Bであること、ずい柱の先端の色が61Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ロールパンナ」と比較して、リップの幅がかなり広であること、リップの斑点の大きさがやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成30年9月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27720号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 黄蝶遊々

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さはやや太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は極弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅はかなり広、ドーサルセパルの正面の形は倒卵形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅はかなり広、ラテラルセパルの正面の形は倒卵形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は9B、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は9B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は9B、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は9B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱はかなり弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色は4D、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は12B、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色はN45A、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「黄蝶遊々」は、対照品種「月の恋人」と比較して、セパルの周縁の色が9Bであること、リップの周縁の波打ちの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「華麗 イエロークレイン」と比較して、リップのくさびの色がN45Aであること、ずい柱の斑点の色が181Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成30年9月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の「華麗 イエロークレイン」に育成系統を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27721号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ipomoea batatas (L.) Lam. スズコガネ

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張、茎の一次側枝の長さはやや短、節間長はやや短、茎の太さは中、茎のアントシアニンの着色は無又は極弱、茎の先端のアントシアニンの着色は弱、節のアントシアニンの着色は無又は極弱、茎の先端の毛の粗密は密、葉身の大きさはやや小、葉身の裂片の数は5、葉身の裂片の深さは極浅、葉身の表面の色（観賞用品種を除く。）は黄緑、葉身の表面のアントシアニンの着色（観賞用品種を除く。）は弱、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の大きさは無又は極小、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の強弱は極弱、葉身の蜜腺のアントシアニンの着色は無又は極弱、新葉の表面の主な色は紫褐、新葉の裏面の主な色は淡緑、葉柄のアントシアニンの着色は無又は極弱、葉柄の長さはやや短、塊根の形は卵形、塊根の長さ／幅は太、塊根の数はやや多、塊根の大きさは中、塊根の表皮の主な色は白、塊根の表皮の二次色は桃、塊根の肉の主な色は白、塊根の目の深さは中である。

出願品種「スズコガネ」は、対照品種「コガネセンガン」と比較して、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の大きさが無又は極小であること、新葉の表面の主な色が紫褐であること等で区別性が認められる。対照品種「シロユタカ」と比較して、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の大きさが無又は極小であること、新葉の表面の主な色が紫褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
霧島酒造株式会社
宮崎県都城市下川東4丁目28号1番

6 登録品種の育成をした者の氏名

甲斐由美 高畑康浩 吉永優 片山健二 小林晃 境哲文 藤田敏郎 岩井謙一
藤田剛嗣 宮川光世子 河野邦晃 小境敏揮 伊川秀治

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

「コガネセンガン」に「中国25号」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27722号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lindernia cleistandra W. R. Barker Mimi

3 登録品種の特性の概要

草姿は傾伏、草丈は中、株の幅は中、葉身の長さは長、葉身の幅は広、葉身の最大幅の位置は中間部、葉身の横断面の形は凸、葉身の周縁部の鋸歯は深、葉身の腺毛は密、花冠の縦径は中、花冠の横径はやや大、花喉部の内面の主な色はN81B、下唇弁の中央裂片の長さ／幅は小、下唇弁の中央裂片表面の主な色はN88Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Mimi」は、対照品種「L. cleistandra ‘051’」と比較して、葉身の周縁部の鋸歯が深であること、葉身の腺毛が密であること等で区別性が認められる。対照品種「L. cleistandra ‘083’」と比較して、葉身の幅が広であること、葉身の長さ／幅が小であること、葉身の周縁部の鋸歯が深であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Allen James Lowrie

6 Glenn Place, Duncraig, 6023 WESTERN AUSTRALIA, AUSTRALIA

高井功

埼玉県加須市芋荃1949番地5

6 登録品種の育成をした者の氏名

Allen James Lowrie 高井功

7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27723号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. コシヒカリかずさ10号 (コシカリカズサ10ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期は極早、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は短、穂の主軸の長さはやや短、穂数の中、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さは極短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は極早、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、粳の千粒重は中、玄米の千粒重は中、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は白、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPii、穂いもちほ場抵抗性は強である。

出願品種「コシヒカリかずさ10号」は、対照品種「コシヒカリかずさ1号」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が短であること、穂数の中であること等で区別性が認められる。対照品種「コシヒカリかずさ4号」と比較して、穂いもちほ場抵抗性が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

本田技研工業株式会社
東京都港区南青山二丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

地主建志 高師知紀 LIN SHAOYANG 佐々木敦司

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

「コシヒカリかずさ4号」に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27724号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORPOT003

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つばみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径は中、花の形は星形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は強、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は53A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや小、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORPOT003」は、対照品種「POULPAH053」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が弱であること、花弁の形が倒卵形であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が赤であること等で区別性が認められる。対照品種「Evera206」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱が強であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. KORDES' SOEHNE ROSENSCHULEN GMBH & CO KG
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Ernst Kordes Tim-Hermann Peter Kordes Margarita Kordes

7 出願公表の年月日 平成30年3月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Cannes Forever」に「KORhedani」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27725号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SAT1307001

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は矮性、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つばみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はN45C、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや小、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAT1307001」は、対照品種「POULPAH053」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Satter Roses Breeding B.V.

Hoekseweg 1b, 5307TC Poederloijen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

L. de Kloe

7 出願公表の年月日 平成29年4月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27726号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SAT1307702

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色はN57C、花卉の表面の二次色はNN155B、花卉の表面の二次色の分布はぼかし、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAT1307702」は、対照品種「サバナイト」と比較して、花卉の数がやや少であること、花の香りの強弱が無又は弱であること、花卉の表面の主な色がN57Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Satter Roses Breeding B.V.
Hoekseweg 1b, 5307TC Poederloijen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

L. de Kloe

7 出願公表の年月日 平成29年4月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27727号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. まごころ

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は矮性、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は緑、葉の大きさはかなり小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径は小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は155B、花弁の表面の二次色はN155B、花弁の表面の二次色の分布はぼかし、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「まごころ」は、対照品種「EveraR031」と比較して、花弁の数がやや少であること、花弁の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「メイナブロン」と比較して、先端小葉の葉身先端の形が鋭形であること、花色の分類が黄系であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高橋弘
愛知県弥富市稲元十丁目31番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋弘

7 出願公表の年月日 平成29年5月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27728号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. オレンジシャンテ

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は矮性、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや多、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はやや強、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は24A、花卉の表面の二次色は9A、花卉の表面の二次色の分布は基部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「オレンジシャンテ」は、対照品種「Poulpar080」と比較して、花卉の表面の主な色が24Aであること、花卉の表面の二次色の分布が基部であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高橋弘
愛知県弥富市稲元十丁目31番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋弘

7 出願公表の年月日 平成29年5月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27729号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. スペクト

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は矮性、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは小、葉の表面の緑色の濃淡はかなり淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は9B、花卉の表面の二次色は24A、花卉の表面の二次色の分布はぼかし、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「スペクト」は、対照品種「ルイロソラ」と比較して、花卉の表面の二次色が24Aであること、花卉の表面の二次色の分布がぼかしであること等で区別性が認められる。対照品種「Poulpar080」と比較して、先端小葉の葉身先端の形が鋭形であること、花の直径がやや小であること、花卉の表面の二次色が24Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高橋弘
愛知県弥富市稲元十丁目31番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋弘

7 出願公表の年月日 平成29年5月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27730号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. マリー ヴィフ レオン

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つばみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱はやや強、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は9D、花卉の表面の二次色はN57A、花卉の表面の二次色の分布は縁部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「マリー ヴィフ レオン」は、対照品種「INTERBICALIEL」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、花卉の表面の主な色が9Dであること等で区別性が認められる。対照品種「コロソラ」と比較して、葉の大きさがやや小であること、花卉の表面の主な色が9Dであること、外側の雄ずいの花糸の主な色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「ルイロソラ」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、花の直径が中であること、花卉の周縁の反りの強弱がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

内山輝亮
福岡県久留米市田主丸町地徳2282

6 登録品種の育成をした者の氏名

内山輝亮

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Tiffany」に「ハニーレオン」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27731号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORPOT064

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は矮性、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無

（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型

（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はやや弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は62A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはやや小、花卉の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORPOT064」は、対照品種「サバナイト」と比較して、植物体の生育型

（庭園用及び鉢物用品種に限る）が矮性であること、花の香りの強弱が無又は弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. KORDES' SOEHNE ROSENSCHULEN GMBH & CO KG

25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tim-Hermann Peter Kordes Wilhelm Ernst Kordes John Vincent Kordes

7 出願公表の年月日 平成30年3月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

（「KORTITPER」×「RUID196A」）に「RUID244A」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27732号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORPOT040

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は矮性、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は多、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は狭楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は多、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN45A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは中、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORPOT040」は、対照品種「Evera206」と比較して、花卉の数が多であること、がくの変形の強弱がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「POULPAH053」と比較して、花卉の数が多であること、がくの変形の強弱がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. KORDES' SOEHNE ROSENSCHULEN GMBH & CO KG
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tim-Hermann Peter Kordes Wilhelm Ernst Kordes Margarita Kordes

7 出願公表の年月日 平成30年3月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「RUIE57A」に出願者所有の無名実生種を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27733号 令和元年12月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Scabiosa L. ICHPIN

3 登録品種の特性の概要

草型は叢生性、草丈は中、茎の太さは太、茎の色は淡緑、茎の毛の有無は有、分枝性は有、分枝の多少は多、節間長は短、葉序は対生、葉の向きは斜上、茎葉の複葉化は有、茎葉全体の形は長楕円形、茎葉先端の形は鋭形、葉縁の形Ⅰは複葉状、茎葉の長さはやや短、茎葉の幅は中、根生葉の複葉化は有、根生葉全体の形は倒被針形、根生葉先端の形は円形、根生葉基部の形はくさび形、根生葉の長さは中、根生葉の幅は中、葉表面の色は緑、斑の有無は無、花序の形は頭状花序、一重・八重の別は半八重、花序の高さはやや低、花序の径はやや広、花序の分枝長は中、花序全体の形は扁平、心花と辺花の顕著な違いは有、辺花数の中、辺花の一重、八重の別は一重、辺花裂片先端の形は円形、辺花の長さは中、辺花の幅はやや狭、辺花の単色、複色の別は単色、辺花裂片表面の色は75A、辺花裂片裏面の色は75A、心花数の中、心花の長さは中、心花の幅はやや狭、心花の単色、複色の別は単色、心花裂片表面の色は75B、総苞片の数は中、総苞片の形は披針形、総苞片の色は緑、やくの色はピンク、花の香りは有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ICHPIN」は、対照品種「キースカピディ」と比較して、草丈が中であること、花序の径がやや広であること、辺花裂片表面の色が75Aであること、心花裂片表面の色が75Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

一場香理

東京都八王子市元八王子町3-2153-89

6 登録品種の育成をした者の氏名

一場香理

7 出願公表の年月日 平成29年5月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。