1 品種登録の番号及び年月日 第27818号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott クリン ハート

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは小、葉身の長さはかなり短、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の裂片の重なりは離れる、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡は中、葉柄の長さは短、花茎の長さは短、花茎の緑色の濃淡は中、花茎のアントシアニン着色の強弱は強、仏炎苞の大きさは小、仏炎苞の形は楕円形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは離れる、仏炎苞の端部の形は鈍形、仏炎苞の先端の形は広鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色は137A, 143C(中央部)、仏炎苞の凹凸の強弱は極弱、仏炎苞の花柄との角度は直角、肉穂花序の長さはかなり短、肉穂花序の太さは細、肉穂花序の曲がりは直、肉穂花序の先細りの強弱は弱、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は黄、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は黄、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は黄である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「クリン ハート」は、対照品種「ANTHINFAM」と比較して、植物体の大きさが小であること、仏炎苞の形が楕円形であること、仏炎苞の凹凸の強弱が極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「グリーンキング」と比較して、花茎のアントシアニン着色の強弱が強であること、仏炎苞の形が楕円形であること、仏炎苞の花柄との角度が直角であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

神谷政臣
愛知県刈谷市東境町新林90-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

神谷政臣

7 出願公表の年月日 平成29年4月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27819号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott ANTHEWUCH

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや小、葉身の長さは短、葉身の幅は中、葉身の形はやや狭卵形、葉身の裂片の重なりは離れる、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡は中、葉柄の長さは中、花茎の長さはやや短、花茎の緑色の濃淡は中、花茎のアントシアニン着色の強弱は弱、仏炎苞の大きさはやや小、仏炎苞の形は卵形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは離れる、仏炎苞の端部の形は鈍形、仏炎苞の先端の形は鋭形、仏炎苞の表面の主な色は50A、仏炎苞の凹凸の強弱は中、仏炎苞の花柄との角度は鈍角、肉穂花序の長さは短、肉穂花序の太さはやや細、肉穂花序の曲がり直、肉穂花序の先細りの強弱はやや弱、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は黄、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ANTHEWUCH」は、対照品種「アンセペディ」と比較して、仏炎苞の表面の主な色が50Aであること、仏炎苞の裏面の主な色が52Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ANTHCAXON」と比較して、仏炎苞の表面の主な色が50Aであること、仏炎苞の裏面の主な色が52Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.
Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Dijk

7 出願公表の年月日 平成29年5月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27820号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott ANTHEQIBO

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや小、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の形はやや狭卵形、葉身の裂片の重なりは離れる、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡は中、葉柄の長さはやや短、花茎の長さはやや短、花茎の緑色の濃淡は淡、花茎のアントシアニン着色の強弱はやや弱、仏炎苞の大きさはやや小、仏炎苞の形は卵形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは離れる、仏炎苞の端部の形は円形、仏炎苞の先端の形は広鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色は44B、仏炎苞の凹凸の強弱はやや弱、仏炎苞の花柄との角度は直角、肉穂花序の長さはかなり短、肉穂花序の太さはやや細、肉穂花序の曲がり直、肉穂花序の先細りの強弱はかなり弱、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は黄、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は黄、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は黄である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ANTHEQIBO」は、対照品種「RIJN200332」と比較して、仏炎苞の葉に対する位置がやや上位であること、仏炎苞の裏面の主な色が44Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ANTHUPAP」と比較して、仏炎苞の端部の形が円形であること、仏炎苞の裏面の主な色が44Dであること、肉穂花序の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Dijk

7 出願公表の年月日 平成29年5月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27821号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott ANHEMFO

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや小、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の形はやや狭卵形、葉身の裂片の重なりは離れる、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡は中、葉柄の長さはやや短、花茎の長さは短、花茎の緑色の濃淡は中、花茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、仏炎苞の大きさは小、仏炎苞の形は広卵形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは離れる、仏炎苞の端部の形は鈍形、仏炎苞の先端の形は鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色は155A;144A(裂片下部)、仏炎苞の凹凸の強弱はかなり弱、仏炎苞の花柄との角度は直角、肉穂花序の長さはかなり短、肉穂花序の太さは細、肉穂花序の曲がり直、肉穂花序の先細りの強弱は弱、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は黄、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は黄である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ANHEMFO」は、対照品種「ANTHCAPBUK」と比較して、仏炎苞の葉に対する位置が同位であること、肉穂花序の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「ANTHCOTBIK」と比較して、仏炎苞の裂片の重なりが離れるであること、仏炎苞の光沢の強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.
Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Dijk

7 出願公表の年月日 平成29年5月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27822号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott ANTHCUFPA

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや小、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の形はやや狭卵形、葉身の裂片の重なりは内曲で非接触、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡は濃、葉柄の長さはやや短、花茎の長さはやや短、花茎の緑色の濃淡は中、花茎のアントシアニン着色の強弱は弱、仏炎苞の大きさは中、仏炎苞の形は卵形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは離れる、仏炎苞の端部の形は鈍形、仏炎苞の先端の形は鋭形、仏炎苞の表面の主な色は187A、仏炎苞の凹凸の強弱は強、仏炎苞の花柄との角度は鋭角、肉穂花序の長さは短、肉穂花序の太さはやや細、肉穂花序の曲がり直、肉穂花序の先細りの強弱は弱、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は黄、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は緑、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は緑である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ANTHCUFPA」は、対照品種「ANTHCIMWI」と比較して、仏炎苞の凹凸の強弱が強であること、仏炎苞の横断面の形が平であること等で区別性が認められる。対照品種「RIJN200449」と比較して、仏炎苞の端部の形が鈍形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.
Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Dijk

7 出願公表の年月日 平成29年5月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27823号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott ANTHEUBP

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、葉身の長さは短、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の裂片の重なりは離れる、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡は中、葉柄の長さは中、花茎の長さは中、花茎の緑色の濃淡は中、花茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、仏炎苞の大きさは中、仏炎苞の形は広卵形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは離れる、仏炎苞の端部の形は鈍形、仏炎苞の先端の形は広鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色は52B、仏炎苞の凹凸の強弱は中、仏炎苞の花柄との角度は直角、肉穂花序の長さは短、肉穂花序の太さはやや細、肉穂花序の曲がりは弱く内曲、肉穂花序の先細りの強弱は中、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は黄、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は黄である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ANTHEUBP」は、対照品種「ANTHCASZIM」と比較して、葉身の先端部の角度が鋭であること、肉穂花序の曲がりが弱く内曲であること等で区別性が認められる。対照品種「ANTHEPDAK」と比較して、仏炎苞の裏面の主な色が52C, 144A(裂片下部)であること、仏炎苞の光沢の強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Dijk

7 出願公表の年月日 平成29年5月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27824号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. シェリエメール

3 登録品種の特性の概要

草型は立型、草丈はやや高、分枝の粗密は粗、茎のアントシアニン着色の有無は無、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の形はⅢ型、葉の周縁の鋸歯の形は深鈍鋸歯、葉の周縁の鋸歯の粗密は粗、葉の表面の色は暗緑、葉片の長さはやや短、葉片の幅は狭、花型は丁字状、頭花の直径は小、舌状花の数（一重品種を除く。）はかなり少、舌状花の形は広線形、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は狭、舌状花の色数は2、舌状花の表面の色の分布状態は斑点状（吹きかけ、砂子、かすり）、舌状花の表面の主な色は69A、舌状花の表面の複色の色（複色品種に限る。）はNN155C、花盤の直径（一重品種、半八重品種及び丁字状品種に限る。）は極大、丁字状花の色（丁字状品種に限る。）は65C、開花期（秋植）はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シェリエメール」は、対照品種「ゲブラスター2」と比較して、葉柄の長さが長であること、葉の周縁の鋸歯の粗密が粗であること等で区別性が認められる。対照品種「Lazarg1215」と比較して、草型が立型であること、草丈はやや高であること、葉の長さがやや短であること、花柄の長さがやや短であること、丁字状花の色（丁字状品種に限る。）が65Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

静岡県
静岡県静岡市葵区追手町9番6号

6 登録品種の育成をした者の氏名

武藤貴大 勝岡弘幸

7 出願公表の年月日 平成29年10月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の自然交雑実生を、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27825号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. 伊浜ホワイト (イマ ホワイト)

3 登録品種の特性の概要

草型は立型、草丈は高、分枝の粗密は極粗、茎のアントシアニン着色の有無は無、葉の長さはやや短、葉の幅はやや広、葉の形はⅢ型、葉の周縁の鋸歯の形は深鈍鋸歯、葉の周縁の鋸歯の粗密は中、葉の表面の色は緑、葉片の長さはやや長、葉片の幅はやや狭、花型は一重、頭花の直径は小、舌状花の形は線形、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の色数は1、舌状花の表面の色の分布状態は均一、舌状花の表面の主な色はNN155C、花盤の直径（一重品種、半八重品種及び丁字状品種に限る。）は中、花盤の主な色（一重品種及び半八重品種に限る。）は黄、開花期（秋植）は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「伊浜ホワイト」は、対照品種「サザンエレガンスホワイト」と比較して、葉の周縁の鋸歯の形が深鈍鋸歯であること、頭花の直径が小であること等で区別性が認められる。対照品種「サワーリップル」と比較して、葉の幅がやや広であること、葉片の長さがやや長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

齋藤高広
静岡県賀茂郡南伊豆町伊浜617

6 登録品種の育成をした者の氏名

齋藤高広

7 出願公表の年月日 平成29年7月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の自然交雑実生から、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27826号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. SUPA2067

3 登録品種の特性の概要

草型は立型、草丈は低、分枝の粗密はやや粗、茎のアントシアニン着色の有無は無、葉の長さはやや短、葉の幅はやや広、葉の形はⅢ型、葉の周縁の鋸歯の形は深鈍鋸歯、葉の周縁の鋸歯の粗密は中、葉の表面の色は灰緑、葉片の長さは長、葉片の幅はやや広、花型は半八重、頭花の直径は中、舌状花の数（一重品種を除く。）はかなり少、舌状花の形は広線形、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の色数は2、舌状花の表面の色の分布状態は斑点状（吹きかけ、砂子、かすり）、舌状花の表面の主な色は62B、舌状花の表面の複色の色（複色品種に限る。）は155A、花盤の直径（一重品種、半八重品種及び丁字状品種に限る。）はやや大、花盤の主な色（一重品種及び半八重品種に限る。）は黄、開花期（秋植）は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SUPA2067」は、対照品種「モリンバ ウォーターメロン」と比較して、茎のアントシアニン着色の有無が無であること、頭花の直径が中であること、花盤の主な色（一重品種及び半八重品種に限る。）が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「H24-018レ」と比較して、葉の周縁の鋸歯の粗密が中であること、頭花の直径が中であること、花盤の複色の有無（一重品種及び半八重品種に限る。）が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plantinova SL
Rafael Martinez Valls, 16 08348 Cabrils Barcelona, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Graham Brown

7 出願公表の年月日 平成30年3月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27827号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. INARGBUBBL

3 登録品種の特性の概要

草型は丸型、草丈は低、分枝の粗密は密、茎のアントシアニン着色の有無は無、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の形はⅢ型、葉の周縁の鋸歯の形は深鈍鋸歯、葉の周縁の鋸歯の粗密は粗、葉の表面の色は暗緑、葉片の長さはやや短、葉片の幅は狭、花型は一重、頭花の直径は小、舌状花の形は広線形、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の色数は2、舌状花の表面の色の分布状態は斑点状（吹きかけ、砂子、かすり）、基部、舌状花の表面の主な色は64C、舌状花の表面の複色の色（複色品種に限る。）は155A、花盤の直径（一重品種、半八重品種及び丁字状品種に限る。）は中、花盤の主な色（一重品種及び半八重品種に限る。）は黄、開花期（秋植）は極早である。
（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INARGBUBBL」は、対照品種「ピーチサザンキャンドル」と比較して、草丈が低であること、葉の周縁の鋸歯の粗密が粗であること、舌状花の形が広線形であること等で区別性が認められる。対照品種「コブシング」と比較して、舌状花の表面の主な色が64Cであること、舌状花の裏面の主な色が62Cであること等で区別性が認められる。対照品種「マシェリエ」と比較して、舌状花の表面の色の分布状態が斑点状（吹きかけ、砂子、かすり）、基部であること、花盤の複色の有無（一重品種及び半八重品種に限る。）が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ruth Elsen

7 出願公表の年月日 平成30年3月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者が所属する法人が所有する育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27828号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Callisia Loefl. Rosato

3 登録品種の特性の概要

草型は這性、草丈はかなり低、茎の太さは細、茎の長さは極短、茎のアントシアニンの発現の有無は有、茎のアントシアニン着色部の色は中、茎の毛の有無は有、葉長は短、葉幅は狭、葉の形は卵形、葉の先端の形は鋭形、葉表面の色は緑、葉表面の色の变化の有無は無、葉表面の斑の有無は有、葉表面の斑の種類は不鮮明な条斑、葉表面の斑の色はN75B、葉裏面の着色の有無は有、葉裏面着色のパターンは均一、葉の毛の有無は有である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Rosato」は、対照品種「桜色カリシア」と比較して、葉の形が卵形であること、葉表面の斑の色がN75Bであること等で区別性が認められる。対照品種「グリーントートル」と比較して、葉の形が卵形であること、葉表面の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

New Variety B.V.

Kudelstaartseweg 145, 1433GC Kudelstaart, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Obed Smit

7 出願公表の年月日 平成30年10月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

「グリーントートル」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27829号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精きつの(セイツツ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度(叢生でない品種に限る)は小、頭花の型は半八重、花盤の型(八重及び露心する八重品種を除く)はデイジー、頭花の直径(摘らいしていないもの)は小、頭花の舌状花数(一重及び半八重品種に限る)は少、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形は舌状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の基部の向き(一重及び半八重品種に限る)は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形(管状でない舌状花)は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は72B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性(ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む)は類似する、舌状花の裏面の色はN75A、花盤の頭花に対する直径の大きさ(一重及び半八重品種に限る)は中、花盤の開やく前の色の区分(デイジー型の品種に限る)は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無(デイジー型の品種に限る)は無、開花習性は7月～9月咲き(夏秋)、各開花習性における早晚性はかなり早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「精きつの」は、対照品種「精さとえ」と比較して、頭花の舌状花の形の数2であること、舌状花の最大幅部の横断面の形(管状でない舌状花)が平であること、舌状花の縦断面の平でない部位(平でない舌状花)が先端部から1/2であること等で区別性が認められる。対照品種「精はんな」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが接するであること、頭花の舌状花の形の数2であること、舌状花の先端の形が歯状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の紅色系一重咲き育成系統に同色系混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27830号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精しらか (セイラカ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は一重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はかなり斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精しらか」は、対照品種「白精ひなの」と比較して、頭花の型が一重であること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が平であること等で区別性が認められる。対照品種「精ねわた」と比較して、頭花の型が一重であること、舌状花の長さ／幅がやや低であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鶴飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の白色系一重咲き育成系統に同色系混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27831号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀ありな (シュウアリナ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は76C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は有、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀ありな」は、対照品種「しゅうわかな」と比較して、たく葉の大きさが小であること、舌状花の表面の主な色が75Bであること、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成29年7月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

「しゅうわかな」に赤色系小ギクの混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27832号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精たからぼし (セイカラボシ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は6D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精たからぼし」は、対照品種「精さとみ」と比較して、舌状花の表面の主な色が6Aであること、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）が中であること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が平であること等で区別性が認められる。対照品種「精けいか」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が平（巻かない）であること、舌状花の表面の主な色が6Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鶴飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成29年9月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の黄色系一重咲き育成系統に同色系混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27833号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精はなば (セイナバ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は極小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は9A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は9C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精はなば」は、対照品種「精はぎの」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが接近すること、舌状花の縦断面の形状が外反であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鶴飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成30年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の黄色系一重咲きの育成系統に同色系混合花粉を交配し選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27834号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精かざね (セウザネ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はかなり小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精かざね」は、対照品種「精しずえ」と比較して、葉の基部の形が円形であること、花序の形（叢生でない品種に限る）が深いドーム形であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がわずかに凸であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること等で区別性が認められる。対照品種「精なつぜみ」と比較して、葉の基部の形が円形であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がわずかに凸であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成30年5月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の白色系一重咲き育成系統に同色系混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27835号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精なりひら (セイヤヒラ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は9A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は9C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精なりひら」は、対照品種「精やさか」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが接するのであること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が平であること等で区別性が認められる。対照品種「精やすず」と比較して、葉柄の葉長に対する長さがやや短であること、葉の裂片縁部の重なりが接するのであること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鶴飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成30年6月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の黄色系一重咲き育成系統に同色系混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27836号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精あいゆう (セイイユウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は4C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晩性はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精あいゆう」は、対照品種「シューファイン」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、舌状花の先端の形が突起状であること、舌状花の表面の主な色が5Cであること等で区別性が認められる。対照品種「精なるかみ」と比較して、頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）がかなり少であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること、舌状花の表面の主な色が5Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鶴飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成30年6月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の黄色系一重咲き育成系統に同色系混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27837号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精るこう (セルコウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形は2、頭花の舌状花の主要な形は舌状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN75C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は76C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精るこう」は、対照品種「精ひなの」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さがやや短であること、舌状花の表面の色数が1であること等で区別性が認められる。対照品種「精わくみ」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが接近するであること、葉の基部の形が円形であること、舌状花の表面の主な色がN75Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成30年5月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の白色系一重咲きの育成系統に同色系混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27838号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. シューデュエット

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シューデュエット」は、対照品種「シュークール」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、葉の裂片縁部の重なりが接するであること等で区別性が認められる。対照品種「秀なつのくも」と比較して、茎の色が紫又は褐を帯びた緑であること、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）が少であること、花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成30年6月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

「フェスティバル」に育成者所有のスプレーギクの混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27839号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイアイレ

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや大、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は71A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は75A、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイアイレ」は、対照品種「セイチジョーロ」と比較して、花序の形（叢生でない品種に限る）が深いドーム形であること、舌状花の先端の形が突起状であること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が強いドーム状であること等で区別性が認められる。対照品種「ディープセイピサ」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、舌状花の表面の色数が1であること、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鶉飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成30年7月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の赤色系一重咲き育成系統に同色系混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27840号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイラサラス

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の直径（摘らいしたもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は76C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は76C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイラサラス」は、対照品種「セイアクイラ」と比較して、花らいの外面の色がN78Cであること、舌状花の先端の形が歯状であること、舌状花の裏面の色が76Cであること等で区別性が認められる。対照品種「セイラスタバン」と比較して、たく葉の大きさが中であること、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）が少であること、舌状花の表面の主な色が76Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鶉飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成30年7月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のピンク色系のデコラ咲き育成系統にポンポン咲きとデコラ咲き系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27841号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精の奏 (セイカゲ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）はやや大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は2、頭花の舌状花の主要な形は船底状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は8B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はかなり少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精の奏」は、対照品種「精の曲」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが接するのであること、舌状花の先端の形が窪むであること、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）がかなり少であること等で区別性が認められる。対照品種「精の蜂」と比較して、葉の一次欠刻の深さが深であること、頭花の直径（摘らいしたもの）がやや大であること、舌状花の先端の形が窪むであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鶴飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成30年7月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の黄色系八重咲き育成系統に同色系混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27842号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 寄のだるま (キノダルマ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は5C、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は早、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はかなり少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「寄のだるま」は、対照品種「精の曲」と比較して、葉の基部の形が円形であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が強い内巻きであること、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）がかなり少であること等で区別性が認められる。対照品種「寄の要」と比較して、頭花の舌状花の形の数1であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が強い内巻きであること、舌状花の表面の主な色が3Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

寄能節雄
広島県福山市新市町大字常1598番地2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

寄能節雄

7 出願公表の年月日 平成31年2月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「寄の要」に「寄の煌」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27843号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. みなみの風 (ミナノカゼ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は2、頭花の舌状花の主要な形は船底状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は6.5週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はかなり少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「みなみの風」は、対照品種「精の夏白」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、頭花の舌状花の形の数が2であること、舌状花の先端の形が尖るであること等で区別性が認められる。対照品種「精の一世」と比較して、葉の長さが中であること、葉の裂片縁部の重なりが接するであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

愛知みなみ農業協同組合
愛知県田原市古田町岡ノ越6番地4
愛知県経済農業協同組合連合会
愛知県名古屋市中区錦三丁目3番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

森下光徳 太田英孝 鈴木康弘 黒柳智勝 渡会達朗

7 出願公表の年月日 平成31年2月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27844号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 小夏の恋 (コツノコイ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はかなり小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はかなり斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は72C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN75A、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「小夏の恋」は、対照品種「春日の鈴音」と比較して、茎の色が紫又は褐を帯びた緑であること、葉の裂片縁部の重なりが接近するであること、舌状花の先端の形が尖るであること等で区別性が認められる。対照品種「紅式部」と比較して、茎の色が紫又は褐を帯びた緑であること、葉の表面の緑色の濃淡が濃であること、舌状花の表面の主な色が72Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

群馬県
群馬県前橋市大手町一丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

田島明美 小林智彦 浅見典令 千木良昭宏

7 出願公表の年月日 令和元年6月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の赤色系の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27845号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 春日Y2 (カサ`Y2)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは極深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は7D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は5D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「春日Y2」は、対照品種「しゅうわくら」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが重なること、舌状花の表面の主な色が7Dであること、舌状花の裏面の色が5Dであること等で区別性が認められる。対照品種「小夏の月」と比較して、舌状花の裏面の色が5Dであること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）がややドーム状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

奈良県
奈良県奈良市登大路町30

6 登録品種の育成をした者の氏名

中嶋大貴 印田清秀 虎太有里 仲照史 辻本直樹 角川由加 倉田淳 山本尚明

7 出願公表の年月日 令和元年6月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27846号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Coreopsis L. カミホン WH01

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、茎の緑色程度はやや濃、茎葉の羽状複葉の有無は有、茎葉の羽状複葉の型は1回羽状複葉、茎葉の羽状複葉の長さはやや長、茎葉の羽状複葉裂片の幅は広、葉の色は緑、葉の斑の有無及び程度は無又は極少、葉の表面の毛の有無及び多少は無又は極少、葉の裏面の毛の有無及び多少は無又は極少、舌状花の重なりは一重、花の大きさはやや小、花の厚みはやや薄、管状花部の大きさはやや小、舌状花表面の色は1D、舌状花の複色の有無は有、舌状花の複色模様の種類は基部複色、舌状花基部の複色模様の型はⅢ型、舌状花の複色の色は59B、舌状花裏面の色は157B、管状花部の色は黄、舌状花先端の切れ込みは浅い切れ込み、舌状花の反り方は平、舌状花の副弁の有無は無、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花数は少、総ほう外列の大きさは中、総ほう外列の反り方は平、総ほう内列の大きさは中、やくの色は褐、花の香りは極弱、開花の早晩は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「カミホン WH01」は、対照品種「レッドシフト」と比較して、舌状花表面の色が1Dであること、舌状花裏面の色が157Bであること等で区別性が認められる。対照品種「Star Cluster」と比較して、茎のアントシアニンの着色の有無が有であること、舌状花基部の複色模様の型がⅢ型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1
ハクサンインターナショナル株式会社
愛知県長久手市山越606番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

「レッドシフト」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27847号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cyclamen L. カールレッド

3 登録品種の特性の概要

草型は小型、葉の数は少、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の形は心臓形、葉縁の欠刻は浅く粗、葉縁の波打ちの強弱は無又は弱、葉身の裏面のアントシアニンの着色は弱、葉身の表面の地色は濃緑、葉身の表面の模様の有無は有、葉身の模様の明瞭度は弱、葉身の模様の型は帯斑、葉柄の長さは極短、花茎の長さは短、花茎の結実後の回旋性は無又は弱、花の型は一重、花の香りは無又は極弱、花弁の数は極少、花弁の長さはかなり短、花弁の幅は極狭、花弁の縁の欠刻の有無は無、花弁の縁の波打ちの有無は無、花弁の反転は非反転（ロココ型）、花弁のねじれは無又は極弱、花弁の模様の有無は有、花弁の模様のタイプは目、花弁先端の色は46A、花弁中央部の色は46A、花弁基部の色は59A、花弁の表面の突起の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カールレッド」は、対照品種「クラシカルドレスA」と比較して、花弁の幅が極狭であること、がく片の弁化が無であること等で区別性が認められる。対照品種「スタイリッシュレッド」と比較して、花弁の幅が極狭であること、花弁の反転が非反転（ロココ型）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

麻野間秀一

愛知県北設楽郡設楽町西納庫字駒ヶ原157

6 登録品種の育成をした者の氏名

麻野間秀一

7 出願公表の年月日 平成29年1月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

「スタイリッシュレッド」の変異株の実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27848号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Digitalis L. TMDG1301

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、株幅はやや広、花茎の数は少、葉の長さは長、葉の幅はかなり広、葉の形は狭楕円形、葉縁の形は鋸歯状、花序の長さは短、花序の幅はやや狭、花序の花の粗密はやや粗、花柄の長さはやや短、花の向きは外向き、花の長さは短、花冠の縦径は中、花冠の横径は中、花筒の縦径はやや大、花筒の横径はやや大、下唇弁の中央裂片の長さは中、花冠の外面上部の主な色は168D、花冠の内面下部の主な色は155B、花冠の内面下部の二次色の模様は花冠先端部、花冠の内面下部の二次色は169B、花冠の内面下部の三次色の模様は中点、花冠の内面下部の三次色は60A、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TMDG1301」は、対照品種「DG09-4」と比較して、花冠の外面上部の主な色が168Dであること、花冠の内面下部の二次色が169Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Charles Valin

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者の所属する法人の所有する育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27849号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Geranium L. 夢サンシャイン (ユメサンシャイン)

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、草丈はかなり低、根出葉の葉身の形は腎臓形、根出葉の葉身の長さは極短、根出葉の葉身の幅はかなり狭、根出葉の裂片の長さはかなり短、根出葉の表面の緑色は淡、根出葉の斑の有無は無、茎葉の葉柄の長さは極短、茎葉の葉身の形は腎臓形、茎葉の裂片の形は倒角卵形、茎葉の裂片の先端の形は鈍頭、茎葉の葉身の長さはかなり短、茎葉の葉身の幅は狭、茎葉の裂片の長さはかなり短、茎葉の表面の着色の有無は無、茎葉の表面の緑色は淡、茎葉の斑の有無は無、花型は一重、花冠の形は水平、花の向きは上向き、花径はやや小、花卉の形は倒心形、花卉の色はN80B、花卉の斑の有無は有、花卉の斑の模様は条線、花卉の斑の色はN79C、がくの形は盃状形、開花期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「夢サンシャイン」は、対照品種「サンギネウム ローズ」と比較して、根出葉の表面の緑色が淡であること、茎葉の表面の緑色が淡であること等で区別性が認められる。対照品種「ブラッシング タートル」と比較して、根出葉の表面の緑色が淡であること、茎葉の表面の緑色が淡であること、花冠の形が水平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大森康雄
北海道広尾郡広尾町字紋別14線98番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

大森康雄

7 出願公表の年月日 平成29年8月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

購入種子の実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27850号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hebe Comm. ex Juss. Eyecatcher

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張、樹高はやや低、幼しょうのアントシアニンの着色は無又は極弱、幼しょうの毛の有無は無、新しょうの枝の色は緑褐、枝の節間長はかなり短、葉芽の隙間の有無は有、葉柄の有無は無、葉身の長さはやや短、葉身の幅はかなり狭、葉身の長さ／幅は極大、葉身の形は長楕円形、葉身の最大幅の位置は中央部、葉身の先端の形は鋭形、葉身の周縁の鋸歯の有無は無、葉身の主な色は189A、葉身の二次色の分布は周縁部、葉身の二次色は8D、葉身の三次色の分布は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Eyecatcher」は、対照品種「Heartbreaker」と比較して、新しょうの枝の色が緑褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Leonardus Theodorus Antonius Vergeer
Den Ham 50, 2771WV Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Leonardus Theodorus Antonius Vergeer

7 出願公表の年月日 平成29年1月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Mrs Winder」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27851号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hebe Comm. ex Juss. Jewel of the Nile

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半直立、樹高は中、幼しょうのアントシアニンの着色は弱、幼しょうの毛の有無は無、新しょうの枝の色は紫、枝の節間長はやや短、葉芽の隙間の有無は有、葉柄の有無は有、葉柄の長さは中、葉身の長さは長、葉身の幅はやや狭、葉身の長さ／幅はかなり大、葉身の形は長楕円形、葉身の最大幅の位置は中央部、葉身の先端の形は鋭形、葉身の周縁の鋸歯の有無は無、葉身の主な色は189A、葉身の二次色の分布は周縁部、葉身の二次色は8C、葉身の三次色の分布は覆輪及び主脈部、葉身の三次色は187Cである。
(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Jewel of the Nile」は、対照品種「Heartbreaker」と比較して、枝の節間長がやや短であること、葉身の長さが長であること等で区別性が認められる。対照品種「Eyecatcher」と比較して、新しょうの枝の色が紫であること、枝の節間長がやや短であること、葉身の長さが長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Stephen Michael Burton
249, Peake Road, RD1 NZ-Cambridge New Zealand

6 登録品種の育成をした者の氏名

Stephen Michael Burton

7 出願公表の年月日 平成28年12月27日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27852号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hypericum L. ALLHY1236

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立、樹高はやや低、枝のアントシアニン着色の強弱は中、新葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の形は卵形、葉の表面の緑色の濃淡はかなり濃、葉の斑の有無は無、葉の先端の形は鈍形、葉の基部の形は円形、花型は一重、花の大きさはやや小、花弁の長さはやや短、花弁の幅はやや狭、花弁の形は楕円形、花弁の色は12A、花弁の開き方は下向き、花弁の重なりは離れる、やくの色は橙、花柱の長さはやや短、果序の長さはやや短、果序の幅はやや狭、果序の形は凸形、果序の果実の数は中、果実の長さは中、果実の幅は中、果実の縦断面の形は広卵形、果実の横断面の形は三角形、果実の先端のくぼみの有無は無、果実の表面の粗滑（先端部を除く。）は溝あり、果実の色の区分は白、果実の主な色は155B、果実の二次色の有無は無、果実の光沢の強弱は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ALLHY1236」は、対照品種「マジカルホワイト」と比較して、果実の主な色が155Bであること、開花期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「KOLMASUN」と比較して、果実の幅が中であること、果実の縦断面の形が広卵形であること、果実の主な色が155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Allplants Holding B.V.
Simon Homburgstraat 19, 5431NN Cuijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wim van den Hoogen

7 出願公表の年月日 平成28年12月27日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27853号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hypsizygus marmoreus (Peck) Bigelow チクマッシュH-150

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度はやや高、菌さんの断面の形は丸山形、菌さん表面の斑紋の多少は少、菌さん表面の斑紋の大小は大、菌さん表面の斑紋の分布状態は中央部分、菌さん表面の斑紋の明瞭度は明瞭、菌さんの大きさはかなり小、菌さん表面の中央部の色は暗黄褐色、菌さん表面の周縁部の色は黄茶色、菌さんの厚さは極厚、菌さんの肉質はやや硬、子実層たくの並び方は波状・ちぢれ、子実層たくの幅は中、子実層たくの密度は中、子実層たくの色は淡橙黄色、菌柄の形は中太、菌柄の長さはやや短、菌柄の太さは中、菌柄の色は灰色、菌柄の毛の多少は少、菌柄の肉質は中、菌さん下径と菌柄最大径との比率はやや大、子実体の発生型は株状、最適培養期間はやや長、菌かき後の発生までの期間はやや長、原基形成最適温度は中、子実体の生育最適温度は中、子実体の収量はかなり多、子実体の有効基本数は中である。

出願品種「チクマッシュH-150」は、対照品種「チクマッシュH-140」と比較して、菌さん表面の斑紋の大小が大であること、菌かき後の発生までの期間がやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「チクマッシュH-130」と比較して、菌さん表面の斑紋の大小が大であること、菌さん表面の斑紋の明瞭度が明瞭であること、菌さんの厚さが極厚であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社千曲化成
長野県千曲市大字内川1101番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

池田忠夫

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「チクマッシュH-130」に「チクマッシュH-140」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27854号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ilex crenata Thunb. Annys5

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半直立、新葉の主な色は144A、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の長さ／幅は大、葉身の形は倒卵形、葉身の主な色は137B、葉身の斑の有無は無、葉身の縦方向の反りは外反、葉身の横断面の形は平形、葉身の基部の形は鋭形、葉身の先端部の形は鈍形、花性は雄、雄花の色（雄株品種に限る。）は155Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Annys5」は、対照品種「Beehive」と比較して、樹姿が半直立であること、葉身の長さがやや短であること、葉身の幅がやや狭であること等で区別性が認められる。対照品種「Carolina Upright」と比較して、葉身の幅がやや狭であること、葉身の光沢が強であること、葉身の横断面の形が平形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Andre van Nijnatten
Meirseweg 26 4881 DJ Zundert, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andre van Nijnatten

7 出願公表の年月日 平成29年10月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27855号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinus edodes (Berk.) Sing. 森6E55号 (㊦6E55コリ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は25℃、菌さんの形(平面)は円形、菌さんの形(側面)は凸形、菌さんの形(肉の形)は1型、菌さんの大きさ(自然栽培)は小、菌さんの色は褐色、菌さんの厚さ(自然栽培)はやや薄、菌さんの肉質はやや硬、りん皮の付着部位は全面、りん皮の大きさは中、りん皮の色は有、子実層たくの形状は1型、子実層たくの並び方は正常、子実層たくの幅は狭、子実層たくの密度はやや密、子実層たくの色は白色、菌柄の形は1型、菌柄の長さは短、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率は大、菌柄の太さは中、菌さんの直径と菌柄の太さとの比率はやや大、菌柄の表面の色あいは有、菌柄の毛の色は有、菌柄の毛の有無は有、菌柄の肉質は中、子実体の発生時期(自然栽培)は春秋、子実体の発生型は散発、子実体の発生温度は中、子実体の発生最盛期までの期間はやや長、収量性は少である。

出願品種「森6E55号」は、対照品種「もりの春太」と比較して、20℃の場合の菌糸体の生長速度が速であること、30℃の場合の菌糸体の生長速度が速であること、菌さんの厚さ(自然栽培)がやや薄であること、子実体の発生温度が中であること、平均乾重が3.5~4.0g未満であること等で区別性が認められる。対照品種「ゆう次郎」と比較して、20℃の場合の菌糸体の生長速度が速であること、菌柄の形が1型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

森産業株式会社
群馬県桐生市西久方町一丁目2番23号

6 登録品種の育成をした者の氏名

後田牧洋 田村孝史 生野泰文

7 出願公表の年月日 平成26年5月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

「もりの夏実」に出願者所有の育成系統を交配し、選抜したものである。

- 1 品種登録の番号及び年月日 第27856号 令和2年3月9日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Oryza sativa L. コシヒカリ新潟大学NU1号 (コシヒカリニガタニカクNU1コウ)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は半立、出穂期は中、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は長、穂の主軸の長さは中、穂数は中、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は上1/4のみ、最長芒の長さは短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は中、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾の千粒重は中、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重は中、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は5型、玄米の香りは無又は極弱、穂発芽性は難、脱粒性は難である。

出願品種「コシヒカリ新潟大学NU1号」は、対照品種「コシヒカリ」と比較して、高温登熟性が強であることで区別性が認められる。

- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立大学法人新潟大学
新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050番地

- 6 登録品種の育成をした者の氏名
三ツ井敏明 森太紀 金古堅太郎 及川和聡 伊藤紀美子 高橋能彦 星豊一 高松壮

- 7 出願公表の年月日 平成27年11月27日

- 8 登録品種の育成の経過の概要
「コシヒカリ」の細胞培養突然変異株を選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27857号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. PLANOV006

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はやや低、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉の周縁の切れ込みの深さはかなり浅、葉の斑の有無は無、葉の緑色の濃淡は中、開花初期の頭花の舌状花の主な色はN78C、副花冠の有無は無、舌状花の数はやや多、頭花の直径は小、花盤の型はアネモネ型、優勢な管状花の型（花盤がアネモネ型の品種に限る。）は漏斗状、舌状花の長さは短、舌状花の幅は中、舌状花の先端の形は鈍形、舌状花の横断面の内巻きの有無はすべての頭花に無、舌状花の下部の主な色はNN78A、舌状花の中央部の主な色はNN78B、舌状花の上部の主な色はNN78B、舌状花の裏面の色の区分2は褐紫～褐青紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PLANOV006」は、対照品種「パティエ ダブルピンク」と比較して、開花初期の頭花の舌状花の主な色がN78Cであること、舌状花の中央部の主な色がNN78Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Klemm+Sohn GmbH & Co. KG
Hanfacker 10, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Maike Boxriker

7 出願公表の年月日 平成30年3月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27858号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. PLANOV007

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張、草丈は低、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の周縁の切れ込みの深さは中、葉の斑の有無は無、葉の緑色の濃淡はかなり濃、開花初期の頭花の舌状花の主な色は8A、副花冠の有無は無、舌状花の数はやや多、頭花の直径は中、花盤の型はアネモネ型、優勢な管状花の型（花盤がアネモネ型の品種に限る。）は漏斗状、舌状花の長さは中、舌状花の幅は広、舌状花の先端の形は鈍形、舌状花の横断面の内巻きの有無はすべての頭花に無、舌状花の下部の主な色は8C、舌状花の中央部の主な色は8C、舌状花の上部の主な色は8B、舌状花の裏面の色の区分2は黄に緑の条である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PLANOV007」は、対照品種「SAKOST026」と比較して、草丈が低であること、花盤の直径（花盤がアネモネ型の品種に限る。）が大であること、舌状花の中央部の主な色が8Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Klemm+Sohn GmbH & Co. KG
Hanfacker 10, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Maike Boxriker

7 出願公表の年月日 平成30年3月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27859号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. PLANOV010

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈は中、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の周縁の切れ込みの深さは中、葉の斑の有無は無、葉の緑色の濃淡は濃、開花初期の頭花の舌状花の主な色は8C、副花冠の有無は無、舌状花の数はやや多、頭花の直径はやや小、花盤の型はアネモネ型、優勢な管状花の型（花盤がアネモネ型の品種に限る。）は漏斗状、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は広、舌状花の先端の形は円形、舌状花の横断面の内巻きの有無はすべての頭花に無、舌状花の下部の主な色は155B、舌状花の中央部の主な色は8C、舌状花の上部の主な色は8C、舌状花の裏面の色の区分2は黄に褐の条である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PLANOV010」は、対照品種「SAKOST026」と比較して、草丈が中であること、舌状花の上部の主な色が8Cであること等で区別性が認められる。対照品種「PLANOV007」と比較して、草丈が中であること、漏斗状の管状花の花筒の外側の主な色が13Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Klemm+Sohn GmbH & Co. KG
Hanfacker 10, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Maike Boxriker

7 出願公表の年月日 平成30年3月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27860号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. ブリリアントシンフォニー

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張、草丈は高、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の周縁の切れ込みの深さはかなり浅、葉の斑の有無は無、葉の緑色の濃淡は中、開花初期の頭花の舌状花の主な色はN25B、副花冠の有無は無、舌状花の数はやや少、頭花の直径はやや小、花盤の型はデイジー型、花盤の色（花盤がデイジー型の品種に限る。）2は黒、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は中、舌状花の先端の形は鈍形、舌状花の横断面の内巻きの有無はすべての頭花に無、舌状花の基部の目の幅（花盤がデイジー型の品種に限る。）は中、舌状花の基部の目の色は94A;N155B(上部)、舌状花の下部の主な色はN25B、舌状花の中央部の主な色はN25B、舌状花の上部の主な色はN25B、舌状花の裏面の色の区分は橙に褐の条である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ブリリアントシンフォニー」は、対照品種「シスターシンフォニー」と比較して、舌状花の長さ／幅が中であること、舌状花の中央部の主な色がN25Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社はなせきぐち
群馬県前橋市北代田町497番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

関口雄二

7 出願公表の年月日 平成30年3月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

「グランドチャイルドシンフォニー」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27861号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. ゆかりシンフォニー

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈は中、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の周縁の切れ込みの深さはやや深、葉の斑の有無は無、葉の緑色の濃淡は中、開花初期の頭花の舌状花の主な色はNN155C、副花冠の有無は無、舌状花の数は中、頭花の直径は極大、花盤の型はデイジー型、花盤の色（花盤がデイジー型の品種に限る。）は暗灰緑、舌状花の長さは極長、舌状花の幅は広、舌状花の先端の形は鈍形、舌状花の横断面の内巻きの有無はすべての頭花に無、舌状花の基部の目の幅（花盤がデイジー型の品種に限る。）は広、舌状花の基部の目の色はN75A、舌状花の下部の主な色はN75A、舌状花の中央部の主な色はN75D、舌状花の上部の主な色はN78B、舌状花の裏面の色の区分2は黄に褐の条である。

（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「ゆかりシンフォニー」は、対照品種「はるかシンフォニー」と比較して、葉の周縁の切れ込みの深さがやや深であること、頭花の直径が極大であること等で区別性が認められる。対照品種「はるなシンフォニー」と比較して、花盤の色（花盤がデイジー型の品種に限る。）が暗灰緑であること、舌状花の裏面の色の区分2が黄に褐の条であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社はなせきぐち
群馬県前橋市北代田町497番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

関口雄二

7 出願公表の年月日 平成30年3月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の自然交雑実生株から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27862号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. ハニーシンフォニー

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張、草丈は中、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の周縁の切れ込みの深さはかなり浅、葉の斑の有無は無、葉の緑色の濃淡はやや淡、開花初期の頭花の舌状花の主な色は11C、副花冠の有無は無、舌状花の数はやや多、頭花の直径はやや小、花盤の型はデイジー型、花盤の色（花盤がデイジー型の品種に限る。）2は黒、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の先端の形は鈍形、舌状花の横断面の内巻きの有無はすべての頭花に無、舌状花の基部の目の幅（花盤がデイジー型の品種に限る。）は中、舌状花の基部の目の色は79B、舌状花の下部の主な色は11C、舌状花の中央部の主な色は11C、舌状花の上部の主な色は11C、舌状花の裏面の色の区分2は黄に緑の条である。
（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ハニーシンフォニー」は、対照品種「ヴィエントフラミンゴ」と比較して、舌状花の中央部の主な色が11Cであること、舌状花の裏面の色の区分2が黄に緑の条であること等で区別性が認められる。対照品種「クリーム」と比較して、舌状花の裏面の色の区分2が黄に緑の条であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社はなせきぐち
群馬県前橋市北代田町497番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

関口雄二

7 出願公表の年月日 平成30年3月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ヴィエントフラミンゴ」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27863号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. スターパラソル

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、葉身の長さはかなり短、葉身の幅は狭、葉身の基部の重なりは大きく開く、葉身の切れ込みは中、葉身の斑の有無は無、花の幅は極狭、がく片の長さは極短、小花柄のアントシアニンの着色は強、上部花弁の周縁部の波打ちは無又は極弱、上部花弁の周縁部の主な色はN75A、上部花弁の周縁部と中間部の間の主な色は71B、上部花弁の中間部の主な色は187B、上部花弁の中央の模様は中、上部花弁の基部の複色部は大、下部花弁の周縁部の主な色は84B、下部花弁の周縁部と中間部の間の主な色は84B、下部花弁の中間部の主な色は72A、下部花弁の中央の模様は中、下部花弁の基部の複色部は大である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「スターパラソル」は、対照品種「SAKPEL004」と比較して、花の長さが極短であること、上部花弁の周縁部の主な色がN75Aであること等で区別性が認められる。対照品種「パクヴィオラ」と比較して、花の長さが極短であること、上部花弁の中間部の主な色が187Bであること、下部花弁の基部の複色部が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鈴木清次
神奈川県茅ヶ崎市中島1097番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木清次

7 出願公表の年月日 平成29年10月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27864号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd.

グランパソプラス バーガンディ

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の基部の重なりは大きく開く、葉身の切れ込みはやや深、葉身の斑の有無は無、花の幅は狭、がく片の長さは短、小花柄のアントシアニンの着色は無又は弱、上部花弁の周縁部の波打ちは弱、上部花弁の周縁部の主な色は72A、上部花弁の周縁部と中間部の間の主な色は187B、上部花弁の中間部の主な色は187B、上部花弁の中央の模様は無又は極小、上部花弁の基部の複色部は無又は極小、下部花弁の周縁部の主な色は69D、下部花弁の周縁部と中間部の間の主な色は72A、下部花弁の中間部の主な色は187B、下部花弁の中央の模様は大、下部花弁の基部の複色部は小である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「グランパソプラス バーガンディ」は、対照品種「パクブルグ」と比較して、葉身の切れ込みがやや深であること、下部花弁の中間部の主な色が187Bであること等で区別性が認められる。対照品種「KUEGRAPIMER」と比較して、小花柄のアントシアニンの着色が無又は弱であること、下部花弁の周縁部の主な色が69Dであること等で区別性が認められる。対照品種「REGLABE」と比較して、花の長さが短であること、上部花弁の周縁部の波打ちが弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鈴木清次

神奈川県茅ヶ崎市中島1097 番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木清次

7 出願公表の年月日 平成29年10月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27865号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pholiota nameko (T. Ito) S. Ito et Imai 森N11号 (㊦N11㊦)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は中、菌さん断面の形は丸山形、菌さんのりん皮の有無は無、菌さん表面の粘着物は中、菌さんの大きさは中、菌さんの色は褐色、菌さんの厚さは中、菌さんの肉質は中、菌柄の形は円筒形、菌柄の長さは長、菌柄の太さは中、菌柄の色は黄白色、菌柄の肉質は中、菌柄のりん皮の多少は中、菌柄の断面の状態は中実、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率は小、子実体の生重量は多、子実体の乾燥重量はかなり多、有効茎数は中である。

出願品種「森N11号」は、対照品種「福島N1号」と比較して、子実体の生重量が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

森産業株式会社
群馬県桐生市西久方町一丁目2番23号

6 登録品種の育成をした者の氏名

牧野純 中澤武

7 出願公表の年月日 平成27年1月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

「北研N108号」に「福島N1号」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27866号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus avium (L.) L. 山形C12号 (ヤマガタC12ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹姿は開張、節間長は短、枝の太さはやや太、葉身の長さは中、葉身の長さ／幅は中、葉身の長さ／葉柄の長さはやや小、花の直径は中、花卉の形は広倒卵形、果実の大きさはかなり大、果実の形は腎臓形、果頂部の形は平、果実の縫合線の明瞭度は不明瞭、果柄の長さはやや長、果皮の色は赤、果肉の色はクリーム、果実の硬さは硬、果実の酸味は低、果実の甘味は中、果汁の多少は中、核の大きさは中、核の形は広楕円形、開花始期は中、収穫始期はやや晩である。

出願品種「山形C12号」は、対照品種「紅秀峰」と比較して、果実の甘味が中であること等で区別性が認められる。対照品種「佐藤錦」と比較して、果実の大きさがかなり大であること、果実の大きさ／核の大きさが大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山形県
山形県山形市松波二丁目8番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒亮 西村幸一 八重垣英明 安達栄介 本間禎明 高橋由信 丸川崇 新野清
安孫子裕樹 阿部和幸 多田史人 黒田博 佐藤孝宣 野口協一 矢野和男 黒田
潤 佐藤裕則 明石秀也 鴨田一作 工藤信 佐々木泰子 阿部芳幸 佐藤康一
米野智弥 小野寺玲子

7 出願公表の年月日 平成29年12月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

「紅秀峰」に出願者所有の育成系統「C-47-70」（「レーニア」×「紅さやか」）を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27867号 令和2年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum tuberosum L. ジョージナ

3 登録品種の特性の概要

幼芽の大きさは中、幼芽の形は球形、幼芽の基部のアントシアニン着色の強弱は中、幼芽の頂部の基部に対する大きさは小、幼芽の頂部の型は中間、幼芽の頂部のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、幼芽の根端の数はやや少、植物体の草姿はやや直立、小葉の重なりは中間、複葉の緑色の濃淡は濃、第二側小葉の長幅比はやや狭、植物体の草高は高、花の数は少、花冠の大きさは中、花冠内面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、やくの色は淡黄、枯ちよう期は中、塊茎の形は短卵形、塊茎の目の数はかなり少、塊茎の皮色は淡ベージュ、塊茎の目の基部の色は白、塊茎の表皮のネットはかなり少、塊茎の肉色は黄、上いも重はやや重、上いも数はやや多、上いもの平均重は中である。

出願品種「ジョージナ」は、対照品種「リラチップ」と比較して、幼芽の頂部のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、塊茎の肉色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「さんじゅう丸」と比較して、幼芽の形が球形であること、塊茎の肉色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「十勝こがね」と比較して、植物体の草高が高であること、塊茎の肉色が黄であること、上いも重がやや重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH
Wulf-Werum-Strasse 1, D-21337 Lüneburg, GERMANY

6 登録品種の育成をした者の氏名

Heinrich BOHM

7 出願公表の年月日 平成27年7月27日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統同士を交配し、選抜したものである。