1 品種登録の番号及び年月日 第27937号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Antirrhinum L. オレンジらんちゅう

3 登録品種の特性の概要

草型は上位節型、茎の長さはやや短、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡（葉に斑の無い品種に限る）は中、葉の裏面のアントシアニン着色の有無は無、花の形はペンステモン咲き（ベル咲き）、花型は八重、花の長さはやや長、花の幅は広、花筒の長さはやや短、上唇弁の幅はかなり広、上唇弁の表面の主な色は26B、下唇弁の裂片の表面の主な色は26B、下唇弁の基部の表面の主な色は26A、下唇弁のスポットの有無は有、下唇弁のスポットの大きさは大、下唇弁のスポットの色は68B、花筒の外側の色はNN155Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「オレンジらんちゅう」は、対照品種「トゥイニー ピーチ」と比較して、上唇弁の表面の主な色が26Bであること、花筒の外側の色がNN155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「トゥイニー ブロンズシェード」と比較して、上唇弁の表面の主な色が26Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長崎県
長崎県長崎市尾上町3番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山口雅生 馬場重博

7 出願公表の年月日 平成29年7月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27938号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Antirrhinum L. ピンクラんちゅう

3 登録品種の特性の概要

草型は上位節型、茎の長さはやや長、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡（葉に斑の無い品種に限る）は中、葉の裏面のアントシアニン着色の有無は無、花の形はペンステモン咲き（ベル咲き）、花型は八重、花の長さはやや長、花の幅は広、花筒の長さはやや短、上唇弁の幅はかなり広、上唇弁の表面の主な色はN57D、下唇弁の裂片の表面の主な色はN57D、下唇弁の基部の表面の主な色はN57D、下唇弁のスポットの有無は有、下唇弁のスポットの大きさは小、下唇弁のスポットの色は10D、花筒の外側の色はNN155Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ピンクラんちゅう」は、対照品種「トゥイニー ローズ」と比較して、上唇弁の表面の主な色がN57Dであること、上唇弁の裏面の主な色が62Cであること等で区別性が認められる。対照品種「オレンジらんちゅう」と比較して、茎の長さがやや長であること、上唇弁の表面の主な色がN57Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長崎県
長崎県長崎市尾上町3番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山口雅生 馬場重博

7 出願公表の年月日 平成29年7月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27939号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 兵庫花14号 (ヒョウゴハナ14ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は極高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいたもの）はやや大、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや多、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はかなり斜下、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはかなり長、舌状花の幅は広、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は69D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色はNN155C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は極多である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「兵庫花14号」は、対照品種「兵庫花13号」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや浅であること、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）がやや多であること、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）がかなり斜下であること等で区別性が認められる。対照品種「兵庫花10号」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること、舌状花の表面の主な色が69Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

兵庫県
兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
原 哲明
兵庫県淡路市斗ノ内645

6 登録品種の育成をした者の氏名

玉木克知 山中正仁 竹中善之 平岡正彦 森泰男

7 出願公表の年月日 平成28年12月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

「南ノ空」と「岸の天守閣」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27940号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 兵庫花15号 (ヒョウゴハナ15ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいたもの）はやや大、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはかなり長、舌状花の幅はかなり広、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN74C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は75C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はやや少である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「兵庫花15号」は、対照品種「玉光院」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、頭花の舌状花の主要な形が舌状であること、舌状花の表面の色数が1であること等で区別性が認められる。対照品種「岸の清涼殿」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、葉の長さがやや短であること、舌状花の表面の色数が1であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

兵庫県
兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
原 哲明
兵庫県淡路市斗ノ内645

6 登録品種の育成をした者の氏名

玉木克知 山中正仁 竹中善之 平岡正彦 森泰男

7 出願公表の年月日 平成28年12月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

「泰-2」と「桂昌殿」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27941号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 兵庫花16号 (ヒョウコハ16ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は半八重、花盤の型(八重及び露心する八重品種を除く)はデイジー、頭花の直径(摘らいしたもの)はやや大、頭花の舌状花数(一重及び半八重品種に限る)はやや少、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き(一重及び半八重品種に限る)は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形(管状でない舌状花)はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはかなり長、舌状花の幅は広、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は179A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性(ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む)は類似する、舌状花の裏面の色はN167C;3B(基部)、花盤の頭花に対する直径の大きさ(一重及び半八重品種に限る)は小、花盤の開やく前の色の区分(デイジー型の品種に限る)は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無(デイジー型の品種に限る)は無、日長感応グループ(正確な日長制御での栽培)は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き(秋)、側枝の多少(切り花用一輪ギク品種に限る)は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「兵庫花16号」は、対照品種「岸の新世界」と比較して、舌状花の表面の色数が1であること、舌状花の表面の主な色が179Aであること、日長感応グループ(正確な日長制御での栽培)が7.5週間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

兵庫県
兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
原 哲明
兵庫県淡路市斗ノ内645

6 登録品種の育成をした者の氏名

玉木克知 山中正仁 竹中善之 平岡正彦 森泰男

7 出願公表の年月日 平成28年12月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

「芳園の光」と「王家の印」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27942号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFROSS5

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は2、頭花の舌状花の主要な形は舌状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は75D、舌状花の表面の二次色は151C、舌状花の表面の二次色の分布は先端部1/4、舌状花の表面の二次色の型はぼかし、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色はN155B;144C(先端部1/4)、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は中、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFROSS5」は、対照品種「DELIROSSANO」と比較して、舌状花の裏面の色がN155B;144C(先端部1/4)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS, Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成28年12月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Delirossano」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27943号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFSARD5

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は145D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は145C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はやや多、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFSARD5」は、対照品種「シューテッラ」と比較して、葉の長さが長であること、頭花の直径（摘らいしたもの）が小であること、舌状花の縦断面の形状が外反であること等で区別性が認められる。対照品種「DELIRUBINO」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること、舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）がかなり強であること、舌状花の先端の形が尖るであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS, Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成28年12月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27944号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFANA7

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は187C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は59C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はやや少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFANA7」は、対照品種「DLFESCAM」と比較して、葉柄の葉長に対する長さが短であること、舌状花の縦断面の形状が外反であること等で区別性が認められる。対照品種「DELIARAGON」と比較して、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がわずかに凹であること、舌状花の縦断面の形状が外反であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が7.5週間であること等で区別性が認められる。対照品種「フィロリポップ パープル」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、舌状花の縦断面の形状が外反であること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）が斜下であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS, Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成28年12月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27945号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFLAMB1

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたしたもの）はやや大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはかなり長、舌状花の幅はかなり広、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は中、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFLAMB1」は、対照品種「CHAMPAGNE」と比較して、葉の長さがやや短であること、舌状花の長さがかなり長であること、舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）がNN155Dであること等で区別性が認められる。対照品種「DELIBALTICA」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが接するであること、頭花の高さ（摘らいたしたもの）がかなり高であること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）が斜下であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS, Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成29年2月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27946号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. きゅらメーレ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は69D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN155B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「きゅらメーレ」は、対照品種「プリティララ」と比較して、たく葉の大きさが小であること、花序の側枝の頭花の向き（叢生でない品種に限る）が斜上であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鹿児島県
鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

西真司 橋口健一郎 桑鶴紀充

7 出願公表の年月日 平成28年12月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統に出願者所有の育成品種・系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27947号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFMSTA2

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は2、頭花の舌状花の主要な形は舌状、頭花の舌状花の二次的な形は船底状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは長、舌状花の幅は広、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は5C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は中、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFMSTA2」は、対照品種「CHAMPAGNE GOLDEN」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さがやや長であること、舌状花の表面の主な色が3Aであること等で区別性が認められる。対照品種「寄の映月」と比較して、葉の長さ／幅がやや高であること、葉の先端裂片の相対的な長さがやや長であること、葉の基部の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS, Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成29年1月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27948号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイガンザ

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは長、舌状花の幅はやや広、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はやや多、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイガンザ」は、対照品種「DELIBALTICA」と比較して、草丈が中であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が7週間であること等で区別性が認められる。対照品種「DELITENCEL」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数がやや少であること、舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成29年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

「精興砕心」に白色系の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27949号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 寄の琉石 (キリュウコク)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）は大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は3以上、頭花の舌状花の主要な形は船底状、頭花の舌状花の二次的な形は管状、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはかなり長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は6B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は中、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「寄の琉石」は、対照品種「精興雄黄」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、葉の長さ／幅がやや低であること等で区別性が認められる。対照品種「精興光玉」と比較して、頭花の直径（摘らいしたもの）が大であること、舌状花の先端の形が切型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

寄能節雄
広島県福山市新市町常1598番地2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

寄能節雄

7 出願公表の年月日 平成29年3月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

「寄の天」と「寄の映月」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27950号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 大銀城 (ダイギンジョウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は2、頭花の舌状花の主要な形は船底状、頭花の舌状花の二次的な形は管状、舌状花の花筒の長さは長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はかなり少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「大銀城」は、対照品種「精興飛翔」と比較して、葉の基部の形が鈍形であること、舌状花の花筒の長さが長であること等で区別性が認められる。対照品種「神馬」と比較して、舌状花の花筒の長さが長であること、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）がかなり少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中村秀晃
静岡県浜松市西区和地町240

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村秀晃

7 出願公表の年月日 平成29年4月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「神馬」に白色系の育成系統を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27951号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 銀勝 (ギンショウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はやや多、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「銀勝」は、対照品種「新神」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さが浅であること、舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「神馬」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること、葉の周縁の二次欠刻の深さが浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中村秀晃
静岡県浜松市西区和地町240

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村秀晃

7 出願公表の年月日 平成29年3月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統に白色系の育成系統を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27952号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 豊温の誉 (トヨウノホメ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形は舌状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は2A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は3B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「豊温の誉」は、対照品種「とよおんうんぜん」と比較して、葉の長さがやや短であること、葉の表面の緑色の濃淡が濃であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がわずかに凹であること等で区別性が認められる。対照品種「フォーカス」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がわずかに凹であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

豊橋温室園芸農業協同組合
愛知県豊橋市高洲町字小島103番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

山本浩司

7 出願公表の年月日 平成29年3月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

「涼風」と「とよおんうんぜん」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27953号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ザンム14521

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の直径（摘らいしたもの）は極小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは極短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は145D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は145C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ザンム14521」は、対照品種「デリマリモ」と比較して、舌状花の先端の形が歯状であること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）が斜下であること等で区別性が認められる。対照品種「ザンムパント」と比較して、葉柄の葉長に対する長さがやや長であること、葉の先端裂片の相対的な長さがやや短であること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）が斜下であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Van Zanten Breeding B. V.
Zonneveldslaan 15, 2235SC Valkenburg, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Henricus Cornelius Maria Jacobs

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27954号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ザンムビスク

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の直径（摘らいしたもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、舌状花の花筒の長さは中、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN74D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ザンムビスク」は、対照品種「ハウノモデコ」と比較して、頭花の舌状花の主要な形がさじ状であること、舌状花の表面の主な色が75Bであること等で区別性が認められる。対照品種「太陽の華菜」と比較して、葉柄の葉長に対する長さがやや短であること、頭花の舌状花の主要な形がさじ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Van Zanten Breeding B. V.
Zonneveldslaan 15, 2235SC Valkenburg, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Henricus Cornelius Maria Jacobs

7 出願公表の年月日 平成29年7月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27955号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ザンムスカイファパープル

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり低、草型は叢生、草姿（叢生品種に限る）は半球、たく葉の大きさは小、葉の長さは極短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはかなり浅、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は粗、頭花の舌状花の形の数は2、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形は舌状、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は70A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN74C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性はやや晩、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ザンムスカイファパープル」は、対照品種「ギトリタラン トニリン」と比較して、頭花の舌状花の主要な形がさじ状であること、舌状花の裏面の色がNN74Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ラングファイン」と比較して、草丈がかなり低であること、たく葉の大きさが小であること、頭花の舌状花の主要な形がさじ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Van Zanten Breeding B.V.
Zonneveldslaan 15, 2235SC Valkenburg, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Henricus Cornelius Maria Jacobs

7 出願公表の年月日 平成29年7月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27956号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイショールレッド

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや大、頭花の直径（摘らいしたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは長、舌状花の幅はやや広、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は31C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は158A、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は中、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイショールレッド」は、対照品種「スフェラ オレンジ」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、頭花の直径（摘らいしたもの）が中であること、舌状花の表面の主な色が31Cであること等で区別性が認められる。対照品種「Flora Salmon」と比較して、頭花の舌状花の形の数1であること、舌状花の縦断面の形状が平であること、舌状花の表面の主な色が31Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「セイショール」に放射線を照射して得られた変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27957号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイリワインドサン

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや大、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は大、頭花の直径（摘らいしたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は2、頭花の舌状花の主要な形は舌状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状はよじれ、舌状花の長さは極長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は高、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は21B、舌状花の表面の二次色は5B、舌状花の表面の二次色の分布は先端部1/4、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は20A;N163D(中央部の縦線)、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は6.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は多、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイリワインドサン」は、対照品種「セイブラント」と比較して、頭花の舌状花の主要な形が舌状であること、舌状花の縦断面の形状がよじれであること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が6.5週間であること等で区別性が認められる。対照品種「ザンムサフィー」と比較して、頭花の舌状花の主要な形が舌状であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が6.5週間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鶉飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の紅桃色系の管物八重咲き育成系統にポンポン咲き系統とデコラ咲き系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27958号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイロルカ

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の直径（摘らいしたもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイロルカ」は、対照品種「DELIFORTUNE」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さが中であること、葉の一次欠刻の深さがやや深であること、葉の周縁の二次欠刻の深さがやや深であること等で区別性が認められる。対照品種「ザンムボーマン」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さがやや深であること、舌状花の先端の形が歯状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鶉飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「セイジャポン」にポンポン咲き系統とデコラ咲き系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27959号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイネルヴァ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の直径（摘らいしたもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は75D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイネルヴァ」は、対照品種「太陽の華菜」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること、舌状花の先端の形が丸であること等で区別性が認められる。対照品種「ザンムビスク」と比較して、草丈がやや高であること、たく葉の大きさがやや大であること、頭花の舌状花の主要な形が舌状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鶉飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の赤色系デコラ咲き育成系統にポンポン咲き系統とデコラ咲き系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27960号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DEKALJONKA

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）は大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数は2、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形は船底状、舌状花の花筒の長さは中、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはかなり長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は69C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN155B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はやや少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DEKALJONKA」は、対照品種「DELIROSSANO」と比較して、草丈がかなり高であること、頭花の直径（摘らいしたもの）が大であること等で区別性が認められる。対照品種「セイショール」と比較して、葉の一次欠刻の深さが中であること、頭花の舌状花の主要な形がさじ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ジャパンアグリバイオ株式会社
静岡県浜松市中区板屋町110番地の5

6 登録品種の育成をした者の氏名

C. W. Dekker

7 出願公表の年月日 平成29年7月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27961号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイカミンダーク

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の直径（摘らいしたもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN74D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は75B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイカミンダーク」は、対照品種「セイカミン」と比較して、舌状花の表面の主な色がN74Dであること等で区別性が認められる。対照品種「カンデラティエラ」と比較して、草丈が中であること、葉の長さがやや短であること、葉の表面の緑色の濃淡が濃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「セイカミン」に放射線を照射して得られた変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27962号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイカミンオレンジ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の直径（摘らいしたもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は22B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は11C;181D(中央部の縦線)、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイカミンオレンジ」は、対照品種「セイフェレロ」と比較して、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がわずかに凹であること、舌状花の表面の主な色が22Bであること等で区別性が認められる。対照品種「DELIETNAD YELLOW」と比較して、葉の長さが中であること、葉の先端裂片の相対的な長さが短であること、舌状花の表面の主な色が22Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鶴飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「セイカミン」に放射線を照射して得られた変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27963号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイピンチョ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや大、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の直径（摘らいしたもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形は舌状、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は69C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイピンチョ」は、対照品種「DELIIMAZA」と比較して、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）がやや大であること、頭花の舌状花の形の数2であること等で区別性が認められる。対照品種「DELIDIANTHA」と比較して、葉の長さ／幅が中であること、頭花の舌状花の形の数2であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がやや凹であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育種系統と「セイトリニティー」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27964号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFQUAR5

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は管状、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは長、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅は極高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は145C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN144D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はやや少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFQUAR5」は、対照品種「ANASTASIA DARK GREEN」と比較して、草丈がかなり高であること、葉の周縁の二次欠刻の深さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS, Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成29年7月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27965号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFLOS2

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）は大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は2、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形は管状、舌状花の花筒の長さは中、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはかなり長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は5C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は中、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFLOS2」は、対照品種「精興光玉」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること、葉の基部の形が鈍形であること、頭花の舌状花の主要な形がさじ状であること等で区別性が認められる。対照品種「DLFMSTA2」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さがやや短であること、頭花の舌状花の主要な形がさじ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS, Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成29年7月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27966号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dracaena Vand. ex L. Dradorco

3 登録品種の特性の概要

樹高は矮性、茎の分枝性は無、葉の展開状態は斜上、茎の太さは中、節間は密、茎の色は145C、葉の全体の形は披針形、葉の先端の形は鋭尖形、葉縁の波打ちは有、葉身の反りはIV型、葉身のねじれは有、葉身の長さは11~20cm、葉身の幅は5.1~7.0cm、葉形指数は3.1~5.0、葉脈の型は平行脈、葉脈の明瞭度は不明瞭、葉の厚さは厚、幼葉の地色はNN137A、成葉の表面の地色はNN137A、成葉の裏面の地色は137B、成葉の斑の有無は有、成葉の斑の鮮明度は鮮明、成葉の斑の型は単純、葉の基本斑の様子は覆輪、成葉の斑の基本色はN144A、成葉の光沢は強である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Dradorco」は、対照品種「Drag2004027J」と比較して、節間が密であること、葉の厚さが厚であること等で区別性が認められる。対照品種「レモンサプライズ」と比較して、葉の展開状態が斜上であること、成葉の斑の型が単純であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dragontree Beheer B.V.

Plaats 9, 2675 CK Honselersdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rudolf Scheffers

7 出願公表の年月日 平成28年12月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

「2004031C」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27967号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Flammulina velutipes (Fr.) Sing. チクマッシュT-033

3 登録品種の特性の概要

菌さん断面の形は丸山形、菌さん縁の巻き込みは有、菌さんの大きさは小、菌さんの高さは中、菌さんの色（暗所の生育）は淡黄白色、菌さんの色（明所の生育）は淡黄白色、菌柄の断面の形は楕円形、菌柄の長さは中、菌柄の太さはやや細、菌柄の色（暗所の生育）は淡黄白色、菌柄の色（明所の生育）は淡黄白色、菌柄基部の色（暗所の生育）は淡黄白色、菌柄基部の色（明所の生育）は淡黄白色、株の接着程度は弱、発生最盛期までの期間は中、子実体収量はやや多、有効茎本数は中、有効茎数と子実体収量との比率は茎重型である。

出願品種「チクマッシュT-033」は、対照品種「チクマッシュT-011」と比較して、有効茎本数が中であること、有効茎数と子実体収量との比率が茎重型であること等で区別性が認められる。対照品種「チクマッシュT-022」と比較して、10℃の場合の菌糸体の生長速度が中であること、子実体収量がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種「TR19」と比較して、30℃の場合の菌糸体の生長速度が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社千曲化成
長野県千曲市大字内川1101番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

池田忠夫

7 出願公表の年月日 平成28年5月31日

8 登録品種の育成の経過の概要

「チクマッシュT-011」に「チクマッシュT-022」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27968号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Flammulina velutipes (Fr.) Sing. Veluty M-99

3 登録品種の特性の概要

菌さん断面の形は丸山形、菌さん縁の巻き込みは有、菌さんの大きさは小、菌さんの高さはやや小、菌さんの色（暗所の生育）は淡黄白色、菌柄の断面の形は円形、菌柄の長さはやや短、菌柄の太さはやや細、菌柄の色（暗所の生育）は白色、菌柄基部の色（暗所の生育）は淡黄白色、株の接着程度は中、発生最盛期までの期間はやや短、子実体収量は極多、有効茎本数は多、有効茎数と子実体収量との比率は茎重型である。

出願品種「Veluty M-99」は、対照品種「長野農工研G-6号」と比較して、菌糸生長最適温度が26℃であること、10℃の場合の菌糸体の生長速度がやや早であること、15℃の場合の菌糸体の生長速度が早であること、株の接着程度が中であること、菌かきから子実体発生までの期間が中であること、発生最盛期までの期間がやや短であること、有効茎本数が多であること、有効茎数と子実体収量との比率が茎重型であること等で区別性が認められる。対照品種「SR12」と比較して、菌糸生長最適温度が26℃であること、15℃の場合の菌糸体の生長速度が早であること、菌かきから子実体発生までの期間が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ホクト株式会社
長野県長野市南堀138番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

相澤桃子 作田元気

7 出願公表の年月日 平成29年3月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

自社保有株どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27969号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. イルボミンディ

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は極高、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長はやや長、葉身幅はやや広、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は円錐形、花序の花型は中間型、花序の直径はやや小、両性花の色は白、装飾花の数はやや少、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度はやや強、装飾花の直径はやや小、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は155C、装飾花のがく片の形は卵形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は3から7、花色の変化性は無、開花の開始時期は極晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「イルボミンディ」は、対照品種「RENDIA」と比較して、装飾花のがく片の重なり程度がやや強であること、開花の開始時期が極晩であること等で区別性が認められる。対照品種「DVPPinky」と比較して、葉身全体の形が卵形であること、葉身基部の形が丸形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Ave. Grand Haven, Michigan, 49417, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Johan Van Huylenbroeck

7 出願公表の年月日 平成26年2月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

Hydrangea paniculata 「Pink Diamond」の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27970号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Kalanchoe blossfeldiana Poelln. FIKALPITONPI

3 登録品種の特性の概要

草丈（花序を含む。）は低、株幅は狭、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面のアントシアニン着色の強弱は強、葉の周縁の鋸歯の数はかなり多、葉の周縁の鋸歯の深さは浅、開花枝の最頂部の多散花序の花数はやや多、開花枝の最頂部の多散花序の幅は中、開花初期の花冠裂片の表面の主な色は53C、開花初期の花冠表面の二次色は62C、花型は一重、花冠裂片の数（一重品種に限る。）は4のみ、花の直径は中、花冠裂片の向き（一重品種に限る。）は上向き、花冠裂片の長さ（一重品種に限る。）はやや長、花冠裂片の幅（一重品種に限る。）は広、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は53C、花冠裂片の表面の二次色は62C、花冠裂片の二次色の分布位置は先端部、開花始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FIKALPITONPI」は、対照品種「Fikalpiton」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が53Cであること、花冠裂片の表面の二次色が62Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B. V.
Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ike Vlieland

7 出願公表の年月日 平成28年12月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27971号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Kalanchoe blossfeldiana Poelln. ABZEVEN

3 登録品種の特性の概要

草丈（花序を含む。）は低、株幅は狭、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は卵形、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面のアントシアニン着色の強弱は弱、葉の周縁の鋸歯の数はやや多、葉の周縁の鋸歯の深さはやや深、開花枝の最頂部の多散花序の花数は少、開花枝の最頂部の多散花序の幅は狭、開花初期の花冠裂片の表面の主な色は45A、花型は八重、花冠裂片の数（八重品種に限る。）はやや少、花の直径は大、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は45B、外側花冠裂片の表面の色数（八重品種に限る。）は2、外側花冠裂片の表面の主な色（八重品種に限る。）はN45A、外側花冠裂片の表面の二次色（八重品種に限る。）は49C、外側花冠裂片の表面の二次色の分布位置（八重品種に限る。）は先端部、開花始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ABZEVEN」は、対照品種「フェスティバローズ」と比較して、葉の形が卵形であること、花冠裂片の数（八重品種に限る。）がやや少であること、花冠裂片の表面の主な色が45Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ドンジュアン」と比較して、葉の周縁の鋸歯の深さがやや深であること、花冠裂片の表面の主な色が45Bであること等で区別性が認められる。対照品種「カランディーバ ティロ」と比較して、葉の周縁の鋸歯の深さがやや深であること、花の直径が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

AB Breeding B. V.

Achterweg 58 a, 1424PR De Kwakel, The Netherlands

A & P Lankhaar Holding B. V.

Groendalseweg 74, 2665MG Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andreas Smaal Antonie H. Lankhaar

7 出願公表の年月日 平成29年1月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27972号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Kalanchoe blossfeldiana Poelln. ABZESTIEN

3 登録品種の特性の概要

草丈（花序を含む。）はやや低、株幅はやや狭、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉の周縁の鋸歯の数は多、葉の周縁の鋸歯の深さはやや浅、開花枝の最頂部の多散花序の花数は少、開花枝の最頂部の多散花序の幅は狭、開花初期の花冠裂片の表面の主な色は58C、花型は八重、花冠裂片の数（八重品種に限る。）はやや少、花の直径は中、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は72D、外側花冠裂片の表面の色数（八重品種に限る。）は1、外側花冠裂片の表面の主な色（八重品種に限る。）は67A、開花始期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ABZESTIEN」は、対照品種「ラ デューズ」と比較して、葉の周縁の鋸歯の深さがやや浅であること、花冠裂片の表面の主な色が72Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ミドラー」と比較して、開花初期の花冠裂片の表面の主な色が58Cであること、外側花冠裂片の表面の色数（八重品種に限る。）が1であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

AB Breeding B. V.

Achterweg 58 a, 1424PR De Kwakel, The Netherlands

A & P Lankhaar Holding B. V.

Groendalseweg 74, 2665MG Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andreas Smaal Antonie H. Lankhaar

7 出願公表の年月日 平成29年1月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27973号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Kalanchoe blossfeldiana Poelln. ABTIEN

3 登録品種の特性の概要

草丈（花序を含む。）は低、株幅はやや狭、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面のアントシアニン着色の強弱は強、葉の周縁の鋸歯の数はやや多、葉の周縁の鋸歯の深さはかなり浅、開花枝の最頂部の多散花序の花数は少、開花枝の最頂部の多散花序の幅は狭、開花初期の花冠裂片の表面の主な色はN30B、花型は八重、花冠裂片の数（八重品種に限る。）は中、花の直径はやや小、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN30B、外側花冠裂片の表面の色数（八重品種に限る。）は1、外側花冠裂片の表面の主な色（八重品種に限る。）はN30A、開花始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ABTIEN」は、対照品種「FICALANHAWN」と比較して、葉の周縁の鋸歯の深さがかなり浅であること、花冠裂片の数（八重品種に限る。）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

AB Breeding B. V.

Achterweg 58 a, 1424PR De Kwakel, The Netherlands

A & P Lankhaar Holding B. V.

Groendalseweg 74, 2665MG Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andreas Smaal Antonie H. Lankhaar

7 出願公表の年月日 平成29年1月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27974号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Kalanchoe blossfeldiana Poelln. ABNEGEN

3 登録品種の特性の概要

草丈（花序を含む。）は低、株幅はやや狭、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の形は卵形、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉の周縁の鋸歯の数はかなり多、葉の周縁の鋸歯の深さはやや浅、開花枝の最頂部の多散花序の花数は少、開花枝の最頂部の多散花序の幅はやや狭、開花初期の花冠裂片の表面の主な色は5B、花型は八重、花冠裂片の数（八重品種に限る。）は中、花の直径は中、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は12B、外側花冠裂片の表面の色数（八重品種に限る。）は2、外側花冠裂片の表面の主な色（八重品種に限る。）は15B、外側花冠裂片の表面の二次色（八重品種に限る。）はN167A、外側花冠裂片の表面の二次色の分布位置（八重品種に限る。）は先端部、開花始期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ABNEGEN」は、対照品種「ドンフレデリコ」と比較して、花の直径が中であること、外側花冠裂片の表面の二次色の分布位置（八重品種に限る。）が先端部であること等で区別性が認められる。対照品種「FICALANTHERON」と比較して、外側花冠裂片の表面の主な色（八重品種に限る。）が15Bであること、外側花冠裂片の表面の二次色の分布位置（八重品種に限る。）が先端部であること等で区別性が認められる。対照品種「カランディーバ ジャマイカ」と比較して、葉の形が卵形であること、花冠裂片の表面の主な色が12Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

AB Breeding B. V.

Achterweg 58 a, 1424PR De Kwakel, The Netherlands

A & P Lankhaar Holding B. V.

Groendalseweg 74, 2665MG Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andreas Smaal Antonie H. Lankhaar

7 出願公表の年月日 平成29年1月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27975号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Kalanchoe blossfeldiana Poelln. FI09 3243-03

3 登録品種の特性の概要

草丈（花序を含む。）はやや低、株幅は広、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は卵形、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面のアントシアニン着色の強弱はかなり弱、葉の周縁の鋸歯の数は多、葉の周縁の鋸歯の深さはかなり浅、開花枝の最頂部の多散花序の花数はかなり少、開花枝の最頂部の多散花序の幅はやや狭、開花初期の花冠裂片の表面の主な色は38B、開花初期の花冠表面の二次色は39A、花型は八重、花冠裂片の数（八重品種に限る。）は中、花の直径は大、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は63C、花冠裂片の表面の二次色は58B、花冠裂片の二次色の分布位置は基部、外側花冠裂片の表面の色数（八重品種に限る。）は1、外側花冠裂片の表面の主な色（八重品種に限る。）は67B、開花始期はやや早である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FI09 3243-03」は、対照品種「Ficalanauger」と比較して、花冠裂片の数（八重品種に限る。）が中であること、外側花冠裂片の表面の主な色（八重品種に限る。）が67Bであること、開花始期がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「ミドラー」と比較して、開花初期の花冠表面の二次色が39Aであること、花冠裂片の表面の二次色が58Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B.V.
Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ike Vlieland

7 出願公表の年月日 平成29年1月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

「SWAN」に出願者所有の育成系統を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27976号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Kalanchoe blossfeldiana Poelln. CARMENQ2

3 登録品種の特性の概要

草丈（花序を含む。）はやや低、株幅はやや狭、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の形は卵形、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉の周縁の鋸歯の数は多、葉の周縁の鋸歯の深さは中、開花枝の最頂部の多散花序の花数は中、開花枝の最頂部の多散花序の幅は狭、開花初期の花冠裂片の表面の主な色はN25A、花型は一重、花冠裂片の数（一重品種に限る。）は4のみ、花の直径はやや大、花冠裂片の向き（一重品種に限る。）は平、花冠裂片の長さ（一重品種に限る。）は長、花冠裂片の幅（一重品種に限る。）は広、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN30C、開花始期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「CARMENQ2」は、対照品種「ペテロ」と比較して、花冠裂片の幅（一重品種に限る。）が広であること、花冠裂片の表面の主な色がN30Cであること等で区別性が認められる。対照品種「サラ」と比較して、花の直径がやや大であること、花冠裂片の表面の主な色がN30Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

A/S KNUD JEPSEN

Skanderborgvej 193, Norring, 8382 Hinnerup, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Knud Jepsen

7 出願公表の年月日 平成29年6月8日

8 登録品種の育成の経過の概要

「REESEQ2」に出願者所有の育成系統を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27977号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Kalanchoe blossfeldiana Poelln. Maika

3 登録品種の特性の概要

草丈（花序を含む。）はやや低、株幅は狭、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の形は円形、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉の周縁の鋸歯の数は中、葉の周縁の鋸歯の深さはかなり浅、開花枝の最頂部の多散花序の花数は中、開花枝の最頂部の多散花序の幅は狭、開花初期の花冠裂片の表面の主な色は157C、花型は一重、花冠裂片の数（一重品種に限る。）は4のみ、花の直径はやや大、花冠裂片の向き（一重品種に限る。）は上向き、花冠裂片の長さ（一重品種に限る。）は長、花冠裂片の幅（一重品種に限る。）は広、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN155B、開花始期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Maika」は、対照品種「スノードン」と比較して、開花初期の花冠裂片の表面の主な色が157Cであること、花の直径がやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

A/S KNUD JEPSEN

Skanderborgvej 193, Norring, 8382 Hinnerup, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Knud Jepsen

7 出願公表の年月日 平成29年7月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

「MercedesQ2」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第27978号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Kalanchoe blossfeldiana Poelln. Tender White Meadow

3 登録品種の特性の概要

草丈（花序を含む。）は中、株幅は広、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は卵形、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉の周縁の鋸歯の数は中、葉の周縁の鋸歯の深さは中、開花枝の最頂部の多散花序の花数はかなり少、開花枝の最頂部の多散花序の幅はやや狭、開花初期の花冠裂片の表面の主な色は2D、花型は八重、花冠裂片の数（八重品種に限る。）は中、花の直径は極大、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はNN155A、外側花冠裂片の表面の色数（八重品種に限る。）は1、外側花冠裂片の表面の主な色（八重品種に限る。）はNN155B、開花始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Tender White Meadow」は、対照品種「エルサ」と比較して、花冠裂片の数（八重品種に限る。）が中であること、花の直径が極大であること等で区別性が認められる。対照品種「PARISSA」と比較して、草丈（花序を含む。）が中であること、葉の周縁の鋸歯の深さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

A/S KNUD JEPSEN

Skanderborgvej 193, Norrning, 8382 Hinnerup, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Knud Jepsen

7 出願公表の年月日 平成29年7月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

- 1 品種登録の番号及び年月日 第27979号 令和2年6月15日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lolium multiflorum Lam. ssp. italicum (A. Br.) Volkart クワトロ-TK5

3 登録品種の特性の概要

春化前の草姿は半直立、葉の長さはやや長、葉の幅はかなり広、葉の緑色の濃淡は濃、春化後の草姿は半直立～中間、春化後の草高は中、春化前の出穂性は強、春化後の出穂期はかなり早、出穂期の草高はやや高、止め葉の長さはやや短、止め葉の幅はやや広、最長稈の長さは中、穂の長さはやや短、穂の小穂の数はやや少、けい光反応性は極多、雄性不稔性は無、硝酸態窒素の濃度はやや低である。

出願品種「クワトロ-TK5」は、対照品種「きららワセ」と比較して、止め葉の長さ／幅がやや小であること、硝酸態窒素の濃度がやや低であること等で区別性が認められる。対照品種「ワセアオバ」と比較して、種子の千粒重がかなり大であること、止め葉の長さ／幅がやや小であること、穂の粗密がやや粗であること等で区別性が認められる。

- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
久保田明人 上山泰史 藤森雅博 米丸淳一 秋山征夫
- 7 出願公表の年月日 平成28年8月29日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「東北2号」から8母系を選抜し、多交配したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27980号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 石川酒68号（イカワカ68コウ）

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は淡、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立～半立、出穂期は晩、柱頭の色は白、稈の太さはやや細、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は長、穂の主軸の長さは中、穂数は多、芒の有無は無、外穎の毛じは中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は晩、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾の千粒重はやや大、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重はやや大、玄米の長さはやや長、玄米の幅はやや広、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性はやや強、穂発芽性は易、脱粒性は難、精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）は21～40%、着粒密度はやや粗である。

出願品種「石川酒68号」は、対照品種「さけ武蔵」と比較して、穂数が多いこと、芒の有無が無であること、精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）が21～40%であること等で区別性が認められる。対照品種「越淡麗」と比較して、穂数が多いこと、芒の有無が無であること、着粒密度がやや粗であること等で区別性が認められる。対照品種「日本晴」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が長いこと、穂数が多いこと、芒の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

石川県
石川県金沢市鞍月1丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村啓二 武田康一 猪野雅哉 松谷瑛 野村央文 小林大樹 廣田実央
笹倉康弘 中道晶子 小牧正子 黒田晃 橋本良一

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「山田錦」に育成者所有の育成系統（ひとはな/越淡麗のF4）を交配し、選抜したものである。

- 1 品種登録の番号及び年月日 第27981号 令和2年6月15日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Phlox paniculata L. NOIL DNILB
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はやや高、茎の太さは中、節間長は中、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の最大幅の位置は中間部、葉の先端の形は鋭尖形～鋭形、葉の斑の有無は無、小花柄の長さは極短、花の直径は極小である。
出願品種「NOIL DNILB」は、対照品種「グリーンレディ」と比較して、がくのアントシアニン着色の強弱が強であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Van Leeuwen Bloemen B.V.
Denenweg 21, 5962NC Melderslo, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
J.C.P. van Leeuwen
- 7 出願公表の年月日 平成28年3月29日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27982号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch Soomee

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさは中、樹勢は中、樹姿は開張、枝の太さはやや細、着花枝のアントシアニン着色の強弱は中、着花枝の花芽の粗密は中、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は緑黄、花冠の表面の色は桃、花卉の大きさは中、雄ずいの花弁に対する位置は同位、柱頭のやくに対する位置は同位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は無、新しょうのたく葉の長さは中、葉身の長さはかなり短、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は凹、葉身の先端の反りの有無は有、葉身の基部の形はほぼ直角、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は2、果実の大きさはやや大、果実の形は円形、果頂部の形は広浅凹、果実の対称性は対称、縫合線の強弱は中、梗あの幅は中、果実の地色は乳白、果実の着色の型は斑状、果実の着色面積は中、果実の毛じの粗密はやや粗、果皮の厚さは中、果皮の付着性は中、果肉の硬さはやや硬、果肉の地色は乳白、果肉のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は弱、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味はかなり高、核の大きさは中、核の横面の形は楕円形、核の褐色の濃淡は中、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少は無又は極低、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は強、収穫期は晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Soomee」は、対照品種「ゆうぞら」と比較して、着花枝の花芽の粗密が中であること、葉身の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「川中島白桃」と比較して、花粉の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Rural Development Administration

300, Nongsaeungmyeong-ro, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do 560-500, Republic of Korea

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jun, Ji Hae Chung, Kyeong Ho Kang, Sang Jo Kwack, Yong Bum Kim, Sung Jong Yoon Ik Koo

7 出願公表の年月日 平成27年4月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Yumyeong」に「ちよまる」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27983号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch 妙月 (ミョウゲツ)

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさは大、樹勢はやや強、樹姿は開張、枝の太さは中、着花枝のアントシアニン着色の強弱は中、着花枝の花芽の粗密はやや密、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は橙、花冠の表面の色は桃、花卉の大きさはやや小、雄ずいの花弁に対する位置は同位、柱頭のやくに対する位置は上位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、新しょうのたく葉の長さはやや長、葉身の長さはやや長、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は凹、葉身の先端の反りの有無は有、葉身の基部の形はほぼ直角、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は円形、蜜腺の数は3以上、果実の大きさはやや大、果実の形は扁円形、果頂部の形は広浅凹、果実の対称性は対称、縫合線の強弱は中、梗あの幅はやや広、果実の地色は緑黄、果実の着色の型はぼかし状、果実の着色面積は中、果実の毛じの粗密は粗、果皮の厚さは中、果皮の付着性は中、果肉の硬さは硬、果肉の地色は黄、果肉のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は強、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味はかなり高、核の大きさは中、核の横面の形は楕円形、核の褐色の濃淡は中、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少は無又は極低、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱はやや弱、収穫期はかなり晩である。

出願品種「妙月」は、対照品種「黄ららのきわみ」と比較して、花粉の有無が有であること、核割れの多少が無又は極低であること等で区別性が認められる。対照品種「光月」と比較して、核の周辺のアントシアニン着色の強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長倉徳治
福島県福島市飯坂町湯野字沢11

6 登録品種の育成をした者の氏名

長倉徳治

7 出願公表の年月日 平成27年12月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

「川中島白桃」に「長沢白鳳」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27984号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus salicina Lindl. N-HOPE

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、枝の色の濃淡は中、短果枝の長さは短、葉身の形は楕円形、葉柄の長さは中、花の大きさは小、花弁の大きさは小、花弁の形は倒卵形、果実の大きさは小、果実の形は円形、果頂部の形は平、梗あいの深さは中、果皮の地色は黄、果皮を覆う色は無、果肉の色は黄、果肉の硬さは中、果汁の多少は少、果実の酸味はやや高、果実の甘味はやや高、核の粘離は粘性、核の大きさは中、核の横面の形は楕円形、開花始期は早、成熟期は晩である。

出願品種「N-HOPE」は、対照品種「太陽」と比較して、果実の大きさが小であること、果皮を覆う色が無であること等で区別性が認められる。対照品種「秋姫」と比較して、果実の大きさが小であること、果皮を覆う色が無であること、成熟期が晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

農事組合法人野村園芸農場
青森県三戸郡五戸町字虫追塚前22-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

野村敏男

7 出願公表の年月日 平成27年10月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者が山中で発見した野生株の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27985号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum tuberosum L. ジュリンカ

3 登録品種の特性の概要

幼芽の大きさは中、幼芽の形は卵形、幼芽の基部のアントシアニン着色の強弱はやや弱、幼芽の頂部の基部に対する大きさは小、幼芽の頂部の型は中間、幼芽の頂部のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、幼芽の根端の数は中、植物体の草姿はやや直立、小葉の重なりは中間、複葉の緑色の濃淡は中、第二側小葉の長幅比はやや狭、植物体の草高はやや低、花の数はかなり少、花冠の大きさは中、花冠内面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、やくの色は黄、枯ちよう期は中、塊茎の形は卵形、塊茎の目の数は少、塊茎の皮色は淡ベージュ、塊茎の目の基部の色は白、塊茎の表皮のネットはかなり少、塊茎の肉色は黄、上いも重はやや重、上いも数は多、上いもの平均重はやや軽である。

出願品種「ジュリンカ」は、対照品種「シンシア」と比較して、塊茎の肉色が黄であること、上いも数が多いこと等で区別性が認められる。対照品種「デジマ」と比較して、枯ちよう期が中であること、塊茎の肉色が黄であること、上いも重がやや重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH
Wulf-Werum-Strasse 1, D-21337 Lüneburg, GERMANY

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jiri Fikar

7 出願公表の年月日 平成29年7月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

「E 94/577/35」に「DDR 6.063.029-87」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27986号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Triticum aestivum L. ニシハルカ

3 登録品種の特性の概要

草姿は半立～中、出穂期はやや早、穂の形は紡錘状、穂の長さは中、芒の有無は長芒有り、穂の先端の芒の長さはやや長、穂の色は白、原麦粒の色は赤、まき性は春まき型、稈の長さはやや短、ふの色は黄、粒の形は中、千粒重はやや小、うるち・もちの別はうるち、成熟期はやや早、粒質は粉質である。

出願品種「ニシハルカ」は、対照品種「シロガネコムギ」と比較して、子葉しょうのアントシアニン着色の強弱が中であること、Glu-A1遺伝子座にある対立遺伝子の発現がバンド2であること等で区別性が認められる。対照品種「チクゴイズミ」と比較して、子葉しょうのアントシアニン着色の強弱が中であること、千粒重がやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村和弘 塔野岡卓司 西尾善太 松中仁 杉田知彦 河田尚之 藤田雅也
八田浩一 久保堅司 小田俊介 波多野哲也 関昌子

7 出願公表の年月日 平成28年5月31日

8 登録品種の育成の経過の概要

「利根2号」に「シロガネコムギ」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第27987号 令和2年6月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Triticum aestivum L. くまきらり

3 登録品種の特性の概要

草姿は中、出穂期はやや早、穂の形は紡錘状、穂の長さはやや短、芒の有無は長芒有り、穂の先端の芒の長さはやや長、穂の色は着色、原麦粒の色は赤、まき性は中間型、稈の長さは中、ふの色は黄褐、粒の形は中、千粒重は中、うるち・もちの別はうるち、成熟期はやや早、粒質は硝子質である。

出願品種「くまきらり」は、対照品種「さちかおり」と比較して、穂の色が着色であること、Glu-A1遺伝子座にある対立遺伝子の発現がバンド2であること、Glu-B1遺伝子座にある対立遺伝子の発現がバンド7+8であること等で区別性が認められる。対照品種「ミナミノカオリ」と比較して、穂の白粉の強弱が弱であること、護穎の嘴の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村和弘 塔野岡卓司 平将人 松中仁 杉田知彦 西尾善太 河田尚之
藤田雅也 八田浩一 久保堅司 小田俊介 乙部千雅子 小島久代 高山敏之
藤田由美子 関昌子 石川直幸 高田兼則 渡邊美貴子 伴雄介 加藤啓太
池田達哉

7 出願公表の年月日 平成29年5月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統に「西海185号」を交配したのから倍化半数体系統を作出し、選抜したものである。