

1 品種登録の番号及び年月日 第28969号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. ザルサウイント

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、茎の太さはやや太、葉の長さはかなり長、葉の幅はやや狭、花序の分枝数は極多、花の主な色1は白、花の大きさは大、花の長さは長、花被片の展開度は中、外花被片の形は倒卵形、外花被の中央部の色はNN155D、外花被の先端部の色はNN155D、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は楕円形、側方内花被の色は地色:NN155D, 中央部:14D、側方内花被の条線分布部の大きさは大、側方内花被の条線部分の色は14D、側方内花被の条線の数はやや少、側方内花被の条線の長さは中、側方内花被の条線の幅は中、中央内花被の色はNN155D、中央内花被の条線の有無は有、中央内花被の条線の数はかなり少、中央内花被の条線の大きさは小、花糸の色は白である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ザルサウイント」は、対照品種「ざるさねい」と比較して、花序の分枝数が極多であること、外花被の大条線の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「KONESKIMO」と比較して、小花柄の長さが短であること、内花被の形が楕円形であること、花糸の色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Van Zanten Breeding B.V.

Lavendelweg 15, 1435EW Rijsenhout, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Aart van Voorst

7 出願公表の年月日 令和2年6月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28970号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. ザルサbd25

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、茎の太さはやや太、葉の長さは長、葉の幅は中、花序の分枝数は極多、花の主な色1は白、花の大きさは極小、花の長さは中、花被片の展開度は小、外花被片の形は倒卵形、外花被の中央部の色は192D、外花被の先端部の色は63C、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は倒卵形、側方内花被の色は地色:NN155C, 先端部:63C、中央内花被の色は地色:NN155C, 先端部:63C、中央内花被の条線の有無は無、花糸の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ザルサbd25」は、対照品種「KONWPEARLS」と比較して、花柄の長さがやや長であること、外花被片の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「ざるさちやむ」と比較して、小花柄の長さがかなり短であること、内花被の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Van Zanten Breeding B.V.

Lavendelweg 15, 1435EW Rijsenhout, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Aart van Voorst

7 出願公表の年月日 令和2年6月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28971号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Aster L. 雪もみじ (ユキモジ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は極高、分枝の向きは半直立、分枝の粗密は中、茎の節間のアントシアニン着色の有無は有、葉の形は線形、葉の長さはやや短、葉の幅（線形又は楕円形の葉に限る）はやや狭、葉の鋸歯の分布は無、葉の緑色の濃淡は緑、葉のアントシアニン着色の有無は無、頭花の分布は茎に沿って分布、舌状花の重ねは3以上、頭花の直径はやや小、舌状花の長さは短、舌状花の形は狭楕円形、舌状花の向きは水平、舌状花の縦断面の曲がり方は平、舌状花の頂部の曲がり方は平、舌状花の横断面の形は平、舌状花の先端の形は鋭形、舌状花の先端の鋸歯の有無は無、舌状花の表面の色はNN155C、舌状花の色の濃淡の分布は均一に分布、総ほうの形はロート形、総ほう片の付き方は離れる、総ほう片の重なり方の強弱は強、花盤の直径は無又は極小、開花始期は極晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「雪もみじ」は、対照品種「ホワイトプレスティッジ」と比較して、草丈が極高であること、茎の毛の粗密が密であること、開花始期が極晩であること等で区別性が認められる。対照品種「プリティウエンディ」と比較して、草丈が極高であること、茎の毛の粗密が密であること、開花始期が極晩であること等で区別性が認められる。対照品種「ムルキヤス」と比較して、茎の毛の粗密が密であること、舌状花の横断面の形が平であること、開花始期が極晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

永田城雄
愛知県名古屋市西區城町83番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

永田城雄

7 出願公表の年月日 令和元年5月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

白花在来系統に「早生シロクジャク」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28972号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brassica napus L. CRななしきぶ

3 登録品種の特性の概要

種子のエルシン酸含有の有無は無、葉の緑色の濃淡は中、葉の白粉の有無は有、小葉の有無は有、小葉の数は多、葉の鋸歯の多少は中、開花期は中、花卉の主な色は黄、花粉の有無は有、草丈は高、側枝を含む草丈は長、さやの長さは中、さやの嘴部の長さは中、春まき抽だい性はやや弱である。

出願品種「CRななしきぶ」は、対照品種「キタノキラメキ」と比較して、開花期が中であること、春まき抽だい性がやや弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ななしきぶ」と比較して、果柄の長さがやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

野中光代 畠山勝徳 小原隆由 石田正彦 柿崎智博

7 出願公表の年月日 令和2年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ななしきぶ」の戻し交配品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28973号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brassica napus L. ペノカのしずく

3 登録品種の特性の概要

種子のエルシン酸含有の有無は無、葉の緑色の濃淡は中、葉の白粉の有無は有、小葉の有無は有、小葉の数は中、葉の鋸歯の多少は多、開花期はやや晩、花卉の主な色は黄、花粉の有無は有、草丈は中、側枝を含む草丈は中、さやの長さは中、さやの嘴部の長さは短、春まき抽だい性は無又は極弱である。

出願品種「ペノカのしずく」は、対照品種「キタノキラメキ」と比較して、春まき抽だい性は無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「キザキノナタネ」と比較して、さやの長さが中であること、春まき抽だい性は無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

野中光代 本田裕 石黒浩二 大塚しおり 原尚資 根本英子

7 出願公表の年月日 令和2年8月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

「出願者保有株」と「キザキノナタネ」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28974号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brassica rapa L. MGX-503

3 登録品種の特性の概要

草姿は中、草丈は低、子葉の大きさはやや大、子葉の色は緑、胚軸の色は淡緑、分げつ性は無、葉数は極多、葉形はへら、葉長は長、葉縁の切れ込みは深裂、葉色は緑、葉面の着色は無、葉の光沢は少、葉のろう質は中、葉面の毛じは無、葉面の波うちは中、葉縁の波打ちは中、葉柄・中肋の形は半円状、葉柄・中肋の幅は狭、葉柄・中肋基部の幅は狭、葉柄・中肋の色は淡緑、種子の大きさはやや大、根こぶ病抵抗性は極強、抽だい性(花蕾)(花つぼみ(含茎)を利用するもの)は早、花茎の太さ(花つぼみ(含茎)を利用するもの)はかなり太、花茎の色(花つぼみ(含茎)を利用するもの)は緑、花蕾の大きさ(花つぼみ(含茎)を利用するもの)はやや大、花蕾の色(花つぼみ(含茎)を利用するもの)は濃緑である。

出願品種「MGX-503」は、対照品種「CR京晴」と比較して、葉数が極多であること、小葉の多少が中であること等で区別性が認められる。対照品種「江月」と比較して、葉面の波うちが中であること、小葉の多少が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

丸種株式会社

京都府京都市下京区七条通り新町西入ル夷之町693番地

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

千葉県

〒285-0851 千葉県千葉市中央区新大塚4-1-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

萬聡一郎 松元哲 畠山勝徳 石田正彦 小原隆由 水野真二 久保周子

7 出願公表の年月日 令和元年10月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 8 9 7 5 号 令和 4 年 3 月 1 5 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Brassica rapa L. subsp. chinensis (L.) Hanelt x Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.
香味菜 AADD (コマナ AADD)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は中、草丈は中、子葉の大きさは小、子葉の色は淡緑、胚軸の色は淡緑、分げつ性は無、葉数はやや多、葉形はへら、葉長はやや短、葉縁の切れ込みは中裂、葉色は緑、葉面の着色は無、葉の光沢は少、葉のろう質は少、葉の毛じは無、葉面の波うちは無、葉縁の波打ちは少、葉柄・中肋の形は中、葉柄・中肋の幅はやや狭、葉柄・中肋基部の幅は極狭、葉柄・中肋の色は白、種子の大きさはかなり小、早晩性はやや早である。
出願品種「香味菜 AADD」は、対照品種「雪白体菜」と比較して、葉縁の切れ込みが中裂であること、葉柄・中肋基部の幅が極狭であること等で区別性が認められる。対照品種「ビタミン菜」と比較して、葉縁の切れ込みが中裂であること、葉柄・中肋基部の幅が極狭であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立大学法人宇都宮大学
栃木県宇都宮市峰町350番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
房相佑 松澤康男 金子幸雄
- 7 出願公表の年月日 平成 2 8 年 8 月 2 9 日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有のチンゲンサイにワイルドルッコラを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 8 9 7 6 号 令和 4 年 3 月 1 5 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. KLECA16356

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈はやや低、茎の長さは中、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、小花柄の長さは中、がく片の長さは極短、がく片の幅は狭、花型は八重、花の幅はやや狭、花の切れ込みは中、花の脈は弱、花の主な色はNN74C、生育期間中の花色の変化は無又は弱、花冠裂片の先端の形は切形である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KLECA16356」は、対照品種「カリタスティックダブル フクシア」と比較して、葉の長さが短であること、花の脈が弱であること、花の主な色がNN74Cであること等で区別性が認められる。対照品種「Tifosi dPR 01」と比較して、花の幅がやや狭であること、花の主な色がNN74Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Klemm+Sohn GmbH & Co. KG
Hanfacker 10, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Anita Stover

7 出願公表の年月日 平成 3 0 年 1 2 月 1 8 日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28977号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. KLECA16364

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は低、茎の長さは中、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の先端の形は狭鋭形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は濃緑、小花柄の長さは短、がく片の長さは短、がく片の幅は中、花型は八重、花の幅は中、花の切れ込みは中、花の脈は中、花の主な色はN82C、生育期間中の花色の変化は無又は弱、花冠裂片の先端の形は切形である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KLECA16364」は、対照品種「カリタスティックダブル ブルー」と比較して、葉の長さがやや長であること、花の主な色がN82Cであること等で区別性が認められる。対照品種「Tifosi dLV 01」と比較して、花の切れ込みが中であること等で区別性が認められる。対照品種「カリビアーナ ダブルラベンダー」と比較して、花の切れ込みが中であること、花の主な色がN82Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Klemm+Sohn GmbH & Co. KG
Hanfacker 10, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Anita Stover

7 出願公表の年月日 平成30年12月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 8 9 7 8 号 令和 4 年 3 月 1 5 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. KLECA18085

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は低、茎の長さはやや短、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、小花柄の長さは中、がく片の長さは中、がく片の幅は中、花型は八重、花の幅はやや広、花の切れ込みは強、花の脈は中、花の主な色は69C、生育期間中の花色の変化は無又は弱、花冠裂片の先端の形は円形である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KLECA18085」は、対照品種「カリタスティックダブル ピンク」と比較して、花の切れ込みが強であること等で区別性が認められる。対照品種「Tifosi dBP 01」と比較して、花の幅がやや広であること、花の主な色が69Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Klemm+Sohn GmbH & Co. KG
Hanfacker 10, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Anita Stover

7 出願公表の年月日 平成 3 0 年 1 2 月 1 8 日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28979号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. Balcongcink

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は低、茎の長さはかなり短、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、小花柄の長さは短、がく片の長さは中、がく片の幅は中、花型は一重、花の幅は中、花の切れ込みは強、花の脈は弱、花の喉部の主な色はN74A、花の喉部の主な色の大きさはやや小、花の喉部の主な色の型は星形、花の喉部の斑紋は大、花の喉部の斑紋の色は黄、花の主な色は73A、生育期間中の花色の変化は無又は弱、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は12B、花筒の内面の脈は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Balcongcink」は、対照品種「Balcablinkim」と比較して、花の喉部の斑紋が大であること、花の喉部の斑紋の色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「カリタスティック ファンシーフクシア」と比較して、花の喉部の斑紋が大であること、花の主な色が73Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ball Horticultural Company
622 Town Road West Chicago, Illinois 60185, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Phuong N. Nguyen

7 出願公表の年月日 平成30年11月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28980号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. Balconglav

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈はかなり低、茎の長さはかなり短、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、小花柄の長さは短、がく片の長さは中、がく片の幅は中、花型は一重、花の幅は中、花の切れ込みは強、花の脈は中、花の喉部の主な色はN82A、花の喉部の主な色の大きさはやや小、花の喉部の主な色の型は円形、花の喉部の斑紋は小、花の喉部の斑紋の色は白、花の主な色はN82C、生育期間中の花色の変化は無又は弱、花冠裂片の先端の形は凹形、花筒の内面の主な色は12B、花筒の内面の脈は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Balconglav」は、対照品種「CALPRIBUL」と比較して、花の切れ込みが強いこと、花の主な色がN82Cであること等で区別性が認められる。対照品種「カリタスティック インディゴ」と比較して、花の主な色がN82Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ball Horticultural Company
622 Town Road West Chicago, Illinois 60185, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Phuong N. Nguyen

7 出願公表の年月日 平成30年12月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28981号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. Balcongraniss

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は低、茎の長さはかなり短、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、小花柄の長さは短、がく片の長さは中、がく片の幅は広、花型は一重、花の幅は中、花の切れ込みは強、花の脈は強、花の喉部の主な色は53A、花の喉部の主な色の大きさは大、花の喉部の主な色の型は円形、花の喉部の斑紋は無又は極小、花の主な色は41C、生育期間中の花色の変化は中、花冠裂片の先端の形は円形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈は中である。
(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Balcongraniss」は、対照品種「カリバスケッ ト コロナimp」と比較して、茎の長さがかなり短であること、花の主な色が41Cであること等で区別性が認められる。対照品種「セレブレーション オレンジサンセット」と比較して、茎の長さがかなり短であること、花の切れ込みが強であること、花の喉部の主な色が53Aであること等で区別性が認められる。対照品種「カリタスティック パンプキンスパイス」と比較して、茎の長さがかなり短であること、花の喉部の主な色が53Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ball Horticultural Company
622 Town Road West Chicago, Illinois 60185, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Phuong N. Nguyen

7 出願公表の年月日 平成30年11月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28982号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. Sunbel 789

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈はやや高、茎の長さは中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、小花柄の長さは中、がく片の長さは短、がく片の幅は中、花型は一重、花の幅は広、花の切れ込みは中、花の脈は無又は極弱、花の喉部の主な色の大きさは無又は極小、花の喉部の斑紋は無又は極小、花の主な色はNN155D、生育期間中の花色の変化は無又は弱、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は7B、花筒の内面の脈は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunbel 789」は、対照品種「tifosi WHIT 01」と比較して、葉の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「カリタスティック ホワイト」と比較して、がく片の長さが短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

金谷健至 宮崎潔 村上保之

7 出願公表の年月日 平成30年11月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28983号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. KLECA18067

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は中、茎の長さは中、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、小花柄の長さは短、がく片の長さは短、がく片の幅は狭、花型は八重、花の幅は中、花の切れ込みは弱、花の脈は弱、花の主な色は17D、花の二次色は26D、花の二次色の分布は花冠裂片の縁部、生育期間中の花色の変化は無又は弱、花冠裂片の先端の形は切形である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KLECA18067」は、対照品種「カリビアーナ ダブルオレンジ」と比較して、葉の長さがやや長であること、花の主な色が17Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Klemm+Sohn GmbH & Co. KG
Hanfacker 10, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Anita Stover

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28984号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. KLECA18420

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈はやや低、茎の長さは中、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、小花柄の長さは中、がく片の長さは短、がく片の幅は中、花型は八重、花の幅はやや狭、花の切れ込みは中、花の脈は中、花の主な色は64D、生育期間中の花色の変化は無又は弱、花冠裂片の先端の形は切形である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KLECA18420」は、対照品種「KLECA18085」と比較して、花の幅がやや狭であること、花の主な色が64Dであること等で区別性が認められる。対照品種「カリタスティックダブル フクシア」と比較して、花の主な色が64Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Klemm+Sohn GmbH & Co. KG
Hanfacker 10, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Anita Stover

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28985号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. KLECA18054

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈はやや低、茎の長さは中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は濃緑、小花柄の長さは中、がく片の長さは中、がく片の幅は狭、花型は八重、花の幅はやや広、花の切れ込みは中、花の脈は極強、花の主な色は36B、生育期間中の花色の変化は中、花冠裂片の先端の形は円形である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KLECA18054」は、対照品種「KLECA18420」と比較して、花の幅がやや広であること、花の脈が極強であること、花の主な色が36Bであること等で区別性が認められる。対照品種「カリタスティックダブル オレンジレッド」と比較して、花の主な色が36Bであること等で区別性が認められる。対照品種「KLECA18085」と比較して、花の脈が極強であること、花の主な色が36Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Klemm+Sohn GmbH & Co. KG
Hanfacker 10, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Anita Stover

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統に「Superbells Banana Chocolate」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28986号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. Duealkoyel

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈はやや低、茎の長さは短、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の先端の形は鈍形、葉の斑の有無は無、葉の主な色は緑、小花柄の長さは短、がく片の長さは中、がく片の幅は中、花型は一重、花の幅はやや狭、花の切れ込みは中、花の脈は弱、花の喉部の主な色の大きさは無又は極小、花の喉部の斑紋は無又は極小、花の主な色は9A、生育期間中の花色の変化は無又は弱、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は14B、花筒の内面の脈は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Duealkoyel」は、対照品種「PAS1020308」と比較して、茎の長さが短であること、花筒の内面の脈が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「セレブレーション バナナ」と比較して、茎の長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「カリタスティック ゴールド」と比較して、茎の長さが短であること、花の主な色が9Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B.V.

Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arjan Koot

7 出願公表の年月日 平成31年4月8日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28987号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia sinensis (L.) Kuntze かなえまる

3 登録品種の特性の概要

樹勢はやや強、樹姿は半直立～開張、ほう芽期（一番茶）は中、一心三葉期の第三葉の色は淡緑、一心三葉期の新芽長は中、摘採期（一番茶）はやや早、摘採期の茶芽の芽数はやや多、葉の着生角度は上向き～水平、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は狭楕円形、葉身の緑色の濃淡は中、葉身の表面のしわの強弱は平滑又は弱、葉身の先端の形は鋭形、葉の周縁部の波打ちの強弱は無又は弱、開花期はやや晩、花の直径は小、内花卉の色は白、子房の毛じの有無は有、子房の毛じの粗密は密、発酵性はやや弱、カフェイン含量は中である。

出願品種「かなえまる」は、対照品種「やぶきた」と比較して、樹姿が半直立～開張であること等で区別性が認められる。対照品種「さえみどり」と比較して、ほう芽期（一番茶）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐波哲次 根角厚司 松永明子 吉田克志 荻野暁子 谷口郁也 田中淳一
萬屋宏 山下修矢

7 出願公表の年月日 令和2年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「金F183」と「金谷13号」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28988号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl.

神奈川無花粉ヒ1号 (カガリムカフヒ1ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は単幹状、幹の完満性は円錐、心材の色は赤褐、辺材の色は帯黄、樹皮の色は赤褐、枝の太さは中、枝の長さは中、枝の岐出角は小、枝付き密度はやや密、鱗片葉の夏葉の色は濃緑、鱗片葉の冬葉の色は黄褐、球果の大きさはかなり小、球果の色は淡黄、雌花の色は淡黄、雄花の色は紫褐、雌花着生量の中、雄花着生量は少、さし木の発根性はやや易である。

出願品種「神奈川無花粉ヒ1号」は、対照品種「久慈6号」と比較して、枝の岐出角が小であること、球果の大きさがかなり小であること、雌花の色が淡黄であること等で区別性が認められる。対照品種「ナンゴウヒ」と比較して、球果の大きさがかなり小であること、雌花の色が淡黄であること、雌花着生量の中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

神奈川県

神奈川県横浜市中区日本大通1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

齋藤央嗣

7 出願公表の年月日 平成30年10月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

既存ヒノキから選抜し、検定・育種したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28989号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精あやにしき (セイヤニシキ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN74B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN74D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精あやにしき」は、対照品種「太陽のあさひ」と比較して、たく葉の大きさが小であること、舌状花の表面の主な色がN74Bであること等で区別性が認められる。対照品種「琉の彩姫」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや深であること、舌状花の縦断面の形状が外反であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成31年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の紅色系一重咲きの育成系統に同色系の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28990号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ザンムサフィーレッド

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや大、頭花の直径（摘らいしたもの）はやや大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は管状、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅はかなり高、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色はN172D、舌状花の表面の二次色は2B、舌状花の表面の二次色の分布は先端、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は174D;162D(基部);151D(先端)、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜上である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ザンムサフィーレッド」は、対照品種「ザンムサフィー」と比較して、舌状花の裏面の色が174D;162D(基部);151D(先端)であること等で区別性が認められる。対照品種「DLFCHIS13」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること等で区別性が認められる。対照品種「セイパイレーツロング」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、葉の先端裂片の相対的な長さがやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成31年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ザンムサフィー」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28991号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. とよおん秋宝 (トヨオンシュウホウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は2A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は7D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「とよおん秋宝」は、対照品種「フォーカス」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）が斜下であること等で区別性が認められる。対照品種「豊温の誉」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること等で区別性が認められる。対照品種「アイブルース」と比較して、葉の長さが短であること、葉の周縁の二次欠刻の深さが中であること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）が斜下であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

豊橋温室園芸農業協同組合
愛知県豊橋市高洲町字小島103番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

山本浩司

7 出願公表の年月日 令和元年6月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

「とよおんちぎり」と「豊の秋」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28992号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. Dochrypeb

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は5A、舌状花の表面の二次色は169A、舌状花の表面の二次色の分布2は至る所、舌状花の表面の二次色の型は斑点及び条、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は7D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はやや少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Dochrypeb」は、対照品種「セイクラーク」と比較して、舌状花の表面の状態がキールであること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がわずかに凹であること、舌状花の縦断面の形状が外反であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B.V.

Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jos Kester

7 出願公表の年月日 平成31年4月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28993号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイウィレット

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや大、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の直径（摘らいしたもの）は極小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は157B、舌状花の表面の二次色はN74C、舌状花の表面の二次色の分布2は横断（帯状）、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は145B;75B（横断）、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイウィレット」は、対照品種「Roratec」と比較して、頭花の直径（摘らいしていないもの）がかなり小であること等で区別性が認められる。対照品種「弓戸フーミン」と比較して、頭花の直径（摘らいしていないもの）がかなり小であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 令和元年5月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の緑色系ポンポン咲きの育成系統にポンポン咲き及びデコラ咲きの系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28994号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイラクロス

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の直径（摘らいしたもの）は極小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は145B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は145A、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はやや少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイラクロス」は、対照品種「デリマリモ」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、葉の周縁の二次欠刻の深さがやや深であること等で区別性が認められる。対照品種「DEKWALK」と比較して、草丈が中であること、たく葉の大きさがやや大であること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）が水平であること等で区別性が認められる。対照品種「Feeling Green Dark」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さがやや深であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が平（巻かない）であること、舌状花の先端の形が歯状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 令和元年5月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の緑色系ポンポン咲きの育成系統にポンポン咲き及びデコラ咲きの系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28995号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFBEEH6

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は13B、舌状花の表面の二次色は2A、舌状花の表面の二次色の分布は基部、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は11A、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFBEEH6」は、対照品種「セイカトラル」と比較して、葉の基部の形が鈍形であること、頭花の直径（摘らいたもの）がかなり小であること等で区別性が認められる。対照品種「セイキルシュ」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、葉の基部の形が鈍形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和元年6月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28996号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFABB12

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたしたもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色はN155B、舌状花の表面の二次色は76C、舌状花の表面の二次色の分布は先端、舌状花の表面の二次色の型はばかし、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN155B;N78D(先端部)、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はやや少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFABB12」は、対照品種「セイビルゴ」と比較して、たく葉の大きさが中であること、舌状花の裏面の色がN155B;N78D(先端部)であること等で区別性が認められる。対照品種「Amaltec」と比較して、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がやや凹であること、舌状花の先端の形が歯状であること等で区別性が認められる。対照品種「ポンポンマム ピンクアイ」と比較して、草丈が中であること、葉の長さ／幅がやや高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdiijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和元年5月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28997号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 首里の加那 (シュリカナ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはかなり長、舌状花の幅は広、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は72A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN75A、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は中、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「首里の加那」は、対照品種「太陽の紅珊瑚」と比較して、葉の表面の緑色の濃淡が中であること、舌状花の裏面の色がN75Aであること等で区別性が認められる。対照品種「弓戸の艶」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、頭花の直径（摘らいたもの）が中であること、舌状花の表面の主な色が72Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県
沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号
イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

田場奏美 座喜味利将 金城亜季 関塚史朗 亀山健太 玉城盛俊
渡邊武志 宮口徹

7 出願公表の年月日 令和元年8月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

「花秀芳」に紅色系の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28998号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精興一波（セイコウイッパ）

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数3以上、頭花の舌状花の主要な形は船底状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はやや多、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精興一波」は、対照品種「新神」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、葉の長さが短であること、頭花の舌状花の形の数3以上であること等で区別性が認められる。対照品種「精興の石」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さが中であること、頭花の舌状花の形の数3以上であること、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種「新神2」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、頭花の舌状花の形の数3以上であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 令和元年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の白色系八重咲きの育成系統に同色系の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28999号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ゆみの心 (ユミ/ココロ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度

(叢生でない品種に限る)は小、頭花の型は半八重、花盤の型(八重及び露心する八重品種を除く)はデイジー、頭花の直径(摘らいしていないもの)は小、頭花の舌状花数(一重及び半八重品種に限る)は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き(一重及び半八重品種に限る)は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形(管状でない舌状花)は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性(ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む)は類似する、舌状花の裏面の色はNN155D、花盤の頭花に対する直径の大きさ(一重及び半八重品種に限る)は中、花盤の開やく前の色の区分(デイジー型の品種に限る)は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無(デイジー型の品種に限る)は無、日長感応グループ(正確な日長制御での栽培)は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き(秋)である。
(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ゆみの心」は、対照品種「秀わだつみ」と比較して、舌状花の基部の向き(一重及び半八重品種に限る)が水平であること、花盤の開やく時の色(デイジー型の品種に限る)が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「ゆみの白さぎ」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが接するのであること、舌状花の基部の向き(一重及び半八重品種に限る)が水平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

弓戸春之
広島県福山市新市町常2-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

弓戸春之

7 出願公表の年月日 令和元年8月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ゆみの白さぎ」の自然交雑実生から、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29000号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ゆみの稀 (ユミノレ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度

(叢生でない品種に限る)はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型(八重及び露心する八重品種を除く)はデージー、頭花の直径(摘らいしていないもの)は小、頭花の舌状花数(一重及び半八重品種に限る)はかなり少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き(一重及び半八重品種に限る)はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形(管状でない舌状花)は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性(ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む)は類似する、舌状花の裏面の色は2D、花盤の頭花に対する直径の大きさ(一重及び半八重品種に限る)は中、花盤の開やく前の色の区分(デージー型の品種に限る)は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無(デージー型の品種に限る)は無、日長感応グループ(正確な日長制御での栽培)は8週間、開花習性は10月～11月咲き(秋)である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ゆみの稀」は、対照品種「秀いおり」と比較して、舌状花の表面の主な色が3Bであること、日長感応グループ(正確な日長制御での栽培)が8週間であること等で区別性が認められる。対照品種「ゆみまどか」と比較して、葉柄の葉長に対する長さが中であること、舌状花の表面の主な色が3Bであること等で区別性が認められる。対照品種「セイアニエス」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、花盤の断面の形(デージー型の品種に限る)が平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

弓戸春之

広島県福山市新市町常2-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

弓戸春之

7 出願公表の年月日 令和元年10月1日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ゆみまどか」の自然交雑実生から、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29001号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 弓戸の正 (ユミノマサ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたしたもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはかなり長、舌状花の幅は広、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は4A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は7D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はやや少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「弓戸の正」は、対照品種「秀芳の歩」と比較して、たく葉の大きさが小であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）が平であること、舌状花の縦断面の形状が外反であること等で区別性が認められる。対照品種「寄の映月」と比較して、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること、舌状花の表面の主な色が4Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

弓戸春之
広島県福山市新市町常2-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

弓戸春之

7 出願公表の年月日 令和元年8月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

「弓戸大山」の自然交雑実生から、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29002号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀の沖 (シュノキ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は5C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はかなり少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀の沖」は、対照品種「DLFRITU2」と比較して、草丈が低であること、頭花の花柄の長さが極短であること等で区別性が認められる。対照品種「みさきの里」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さが中であること、舌状花の表面の主な色が3Bであること等で区別性が認められる。対照品種「笑の稔」と比較して、舌状花の縦断面の形状が外反であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一

広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 令和元年7月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

「秀英」に黄色系輪ギクの混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29003号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀芳の江 (シュホウノゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は3以上、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形は船底状、舌状花の花筒の長さはやや長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は7B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き

（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は中、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀芳の江」は、対照品種「精興こうみょう」と比較して、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が9週間であること等で区別性が認められる。対照品種「精興金栄」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、花らいの外面の色が13Aであること等で区別性が認められる。対照品種「DELI AKARI」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること、花らいの外面の色が13Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一

広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 令和元年7月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の黄色系輪ギクの育成系統に同色系輪ギクの混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29004号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精興花洛（セイウカラク）

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはかなり長、舌状花の幅はやや広、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は72A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN75A、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は中、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精興花洛」は、対照品種「太陽の紅珊瑚」と比較して、葉の表面の緑色の濃淡が中であること、舌状花の裏面の色がN75Aであること等で区別性が認められる。対照品種「芳園の花」と比較して、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）がやや密であること、舌状花の表面の主な色が72Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 令和元年8月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の紅色系八重咲きの育成系統に同色系の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29005号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイハウエル

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは浅、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の直径（摘らいしたもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色はN45A、舌状花の表面の二次色は6B、舌状花の表面の二次色の分布は基部、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は180C;4B(基部)、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はやや多、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイハウエル」は、対照品種「フィロリポップ レッド」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、舌状花の縦断面の形状が外反であること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）がかなり斜下であること等で区別性が認められる。対照品種「セイマーレッタ」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、葉の周縁の二次欠刻の数がやや少であること等で区別性が認められる。対照品種「DLFMAGNA」と比較して、草丈が中であること、舌状花の長さがやや短であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が7週間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 令和元年8月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の赤色系ポンポン咲きの育成系統にポンポン咲き及びデコラ咲き系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29006号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイデュアル

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の直径（摘らいしたもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は縁が接する強い凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主色はN172A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は7D;166C（中央部の縦線）、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は中、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイデュアル」は、対照品種「DELICROS」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）が縁が接する強い凹であること等で区別性が認められる。対照品種「DLFPALA15」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）が縁が接する強い凹であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鶴飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 令和元年8月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の桃色系ポンポン咲きの育成系統にポンポン咲き及びデコラ咲きの系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29007号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイツィール

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや大、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の直径（摘らいしたもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN74D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は76C;145D(先端部)、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は中、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイツィール」は、対照品種「DELIBONBON DARK」と比較して、葉の長さ／幅がやや高であること、舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が69C;N74C(縁部);145A(先端)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 令和元年8月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の赤色系デコラ咲きの育成系統にポンポン咲き及びデコラ咲きの系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29008号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイフォリア

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の直径（摘らいしたもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅はやや広、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN155B;75B(中央部の縦線)、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き

（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は中、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイフォリア」は、対照品種「CHAMPAGNE」と比較して、葉の基部の形が円形であること、葉の周縁の二次欠刻の数がやや少であること、舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が65B;72C(先端)であること等で区別性が認められる。対照品種「DLFCHAG11」と比較して、舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が65B;72C(先端)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 令和元年8月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のページュ色系デコラ咲きの育成系統にピンク色系デコラ咲きの育成系統を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29009号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイヌーボ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155B;75C(中央部の縦線)、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイヌーボ」は、対照品種「DLFTISS1」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、舌状花の裏面の色がNN155B;75C(中央部の縦線)であること等で区別性が認められる。対照品種「DLFTISSE」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）が水平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 令和元年8月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のページュ色系デコラ咲きの育成系統にピンク色系デコラ咲きの育成系統を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29010号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFOLIV1

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面の二次色は145B、舌状花の表面の二次色の分布は先端、舌状花の表面の二次色の型はぼかし、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は155C;N144D(至る所)、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFOLIV1」は、対照品種「セイブルックス」と比較して、舌状花の裏面の色が155C;N144D(至る所)であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が8週間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和元年10月8日

8 登録品種の育成の経過の概要

「DELIOLIVE」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第29011号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFSAFF4

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅は高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は180A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は186D;155C(基部)、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFSAFF4」は、対照品種「セイバーニング」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、頭花の直径（摘らいしていないもの）がかなり小であること、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）が大であること等で区別性が認められる。対照品種「太陽のカーニバル」と比較して、葉の長さがやや短であること、舌状花の裏面の色が186D;155C(基部)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和元年10月8日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29012号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFABB13

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は7D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は5D;181C(先端部)、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は中、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFABB13」は、対照品種「フィロリポップ イエロー」と比較して、舌状花の裏面の色が5D;181C(先端部)であること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）が斜下であること等で区別性が認められる。対照品種「ケンペスティア」と比較して、たく葉の大きさが中であること、舌状花の表面の主な色が7Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和元年10月8日

8 登録品種の育成の経過の概要

「DLFABB12」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第29013号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFROSC10

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は3以上、舌状花の表面の主な色は164B、舌状花の表面の二次色は144C、舌状花の表面の二次色の分布は先端、舌状花の表面の二次色の型はぼかし、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は4D;144B(至る所)、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はやや少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFROSC10」は、対照品種「DELIROSSANO ORANGE」と比較して、舌状花の表面の主な色が164Bであること、舌状花の裏面の色が4D;144B(至る所)であること等で区別性が認められる。対照品種「DEKBARTOLI」と比較して、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が外巻きであること、舌状花の表面の主な色が164Bであること、舌状花の裏面の色が4D;144B(至る所)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 令和元年10月8日

8 登録品種の育成の経過の概要

「DELIROSSANO」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第29014号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. Fidchryveron

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや大、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は69B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は69D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜上である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Fidchryveron」は、対照品種「セイネルヴァ」と比較して、草丈がかなり高であること、葉の長さ／幅がやや高であること等で区別性が認められる。対照品種「DLFCARI3」と比較して、草丈がかなり高であること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）がやや斜上であること等で区別性が認められる。対照品種「DLFOSIT」と比較して、草丈がかなり高であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が8週間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B.V.

Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jos Kester

7 出願公表の年月日 令和元年11月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29015号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. *Dochrygaru*

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は2A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は3D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「*Dochrygaru*」は、対照品種「セイアニエス」と比較して、草丈がかなり高であること、花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）が黄緑であること等で区別性が認められる。対照品種「セイグレン」と比較して、草丈がかなり高であること、舌状花の先端の形が突起状であること、花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）が黄緑であること等で区別性が認められる。対照品種「レミダス」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さがやや短であること、舌状花の先端の形が突起状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B.V.

Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jos Kester

7 出願公表の年月日 令和元年11月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29016号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. Dochryanghear

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数値は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は69C、舌状花の表面の二次色はNN155C、舌状花の表面の二次色の分布は基部、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は69D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Dochryanghear」は、対照品種「太陽のブルーション」と比較して、舌状花の表面の主な色が69Cであること等で区別性が認められる。対照品種「太陽のキャバリア」と比較して、葉の長さがやや長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B.V.

Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jos Kester

7 出願公表の年月日 令和元年11月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29017号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. Dochryjopin

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は73D;75B(中央部の縦線)、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Dochryjopin」は、対照品種「セイオーマン」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、舌状花の表面の主な色が75Aであること等で区別性が認められる。対照品種「DELIROSSANO DARK」と比較して、草丈がかなり高であること、たく葉の大きさが無又は極小であること、舌状花の縦断面の形状が外反であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B.V.
Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jos Kester

7 出願公表の年月日 令和元年11月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Fitjourneyd」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第29018号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cosmos Cav. ゴールデンプライト

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はやや低、茎のアントシアニンの着色は中、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉の緑色の濃淡は中、葉の裂片の数は中、花盤の型はデイジー、副花弁の有無は無、頭花の舌状花数は少、頭花の直径はやや小、花盤の直径は小、花盤の頭花に対する直径の大きさは小、舌状花の形は舌状、舌状花の縦断面の形状はわずかに内曲、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は大、舌状花の表面の主な色は17A、舌状花の表面の二次色の分布は無、舌状花の裏面の主な色は17C、舌状花の先端部の切れ込みは浅、花盤の主な色は4Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ゴールドデンプライト」は、対照品種「サニーゴールド」と比較して、花柄の長さが長であること、舌状花の長さ／幅が大であること等で区別性が認められる。対照品種「サニーイエロー」と比較して、花柄の長さが長であること、舌状花の長さ／幅が大であること、舌状花の表面の主な色が17Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社札幌採種園

北海道札幌市白石区本通17丁目北17番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

望月正実 古林健吾

7 出願公表の年月日 平成31年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のキバナコスモス種のイエロー系統の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第29019号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cucumis melo L. メロン中間母本農5号 (メロンチュカンボホンノウ5ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

主づるの節間長はかなり長、葉身の大きさは中、葉身の形は丸、性表現型は両性花・雄花同株、幼果の果皮の緑色の濃淡は淡、果実の長さはやや短、果実の直径は中、果実の長さ／直径はかなり小、果実の縦断面の形は扁円、果皮の地色は緑、果皮の地色の濃淡は淡、果皮の地色の色相は緑色系、果実の模様の密度は無または極粗、果実のいぼの有無は無、果実基部の形は円形、果頂部の形は円形、花落ちの大きさはやや大、果実の溝の強弱は弱、果実のコルク質形成の有無は有、果実のコルク層の厚みは極薄、果実のコルク質形成のパターンは点と線、果実のコルク質形成の密度は極疎、果肉の厚さは中、果実の重量はやや軽、果肉の主な色は緑、種子の長さは中、種子の色は白系、成熟期はやや晩、日持ち性は短、つる割病抵抗性は有（レース0及びレース1）である。

出願品種「メロン中間母本農5号」は、対照品種「アールス フェボリット（春3）」と比較して、果実の溝の深さが中であること、果実のコルク質形成の密度が極疎であること、果肉の厚さが中であること、果実の可溶性固形分量が中であること、種子の色が白系であること等で区別性が認められる。対照品種「I-10」と比較して、果実の模様の大きさが極小であること、果肉の主な色が緑であること、果実の可溶性固形分量が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

杉山 充啓 川頭 洋一 下村 晃一郎 吉岡 洋輔 坂田 好輝 野口 裕司
奥田 充 上田 重文 大和 陽一 前田 昭一

7 出願公表の年月日 令和元年9月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

「アールス フェボリット（春3）」にインド原産の系統「I-10」を交配し、選抜した中間母本品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第29020号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cucurbita L. おいとけ栗たん (オイトケクリタン)

3 登録品種の特性の概要

種子の大きさはやや大、種皮の色は乳白、子葉の大きさは大、胚軸の長さは中、胚軸の太さはやや太、胚軸の空洞の大きさは中、草姿は中間、草勢は強、側枝の多少はかなり少、葉の欠刻は浅、葉の大きさは大、果実の形は扁円、果実先端の形は平、果実基部の形は平、果実の大きさはやや大、果面の状態は平、果面の地色（出荷期）は灰緑、果面の模様（出荷期）は淡緑条、果肉の色は濃黄、果肉の質は粉、は種～収穫まで日数は中、節成性は中である。

出願品種「おいとけ栗たん」は、対照品種「えびす」と比較して、草姿が中間であること、側枝の多少がかなり少であること、果面の地色（出荷期）が灰緑であること等で区別性が認められる。対照品種「雪化粧」と比較して、草姿が中間であること、側枝の多少がかなり少であること、果面の地色（出荷期）が灰緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
株式会社渡辺採種場
宮城県遠田郡美里町南小牛田字町屋敷109番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

杉山慶太 室崇人 嘉見大助 渡邊春彦 勝又雅彦

7 出願公表の年月日 平成30年4月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

「NH」を母系、「北海6号」を父系とする交雑品種である。

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 0 2 1 号 令和 4 年 3 月 1 5 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. 西のはるか (ニシハルカ)
- 3 登録品種の特性の概要
葉の形は中、葉の大きさはやや小、葉の色は中、花の色は緑黄、草型は直立・短枝型、草丈は極低、茎の長さは極短、主茎節数は多、茎の太さは細、茎の色は淡緑、脱粒の難易は中、粒の形は平滑形、粒の長幅比はやや小、完熟粒の果皮色は褐、千粒重は中、容積重は中、生態型は中間夏型、開花始はやや晩、開花期はやや晩、成熟期は晩、耐倒伏性は強である。
出願品種「西のはるか」は、対照品種「ダルマだったん」と比較して、容積重が中であること、生態型が中間夏型であること、開花始がやや晩であること、成熟期が晩であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
松井勝弘 手塚隆久 原貴洋 鈴木達郎
- 7 出願公表の年月日 平成 2 8 年 9 月 2 9 日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
親品種「Rotundatum」にガンマー線を照射した後代から選抜固定した系統である。

1 品種登録の番号及び年月日 第29022号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Flammulina velutipes (Fr.) Sing. MK-B-1

3 登録品種の特性の概要

菌さん断面の形は丸山形、菌さん縁の巻き込みは無、菌さんの大きさは小、菌さんの高さはやや大、菌さんの色（暗所の生育）はその他（濃褐色）、菌さんの色（明所の生育）はその他（濃褐色）、菌柄の断面の形は楕円形、菌柄の長さは短、菌柄の太さは中、菌柄の色（暗所の生育）は淡黄白色、菌柄の色（明所の生育）は淡黄白色、菌柄基部の色（暗所の生育）は淡黄白色、菌柄基部の色（明所の生育）は淡黄白色、株の接着程度は強、発生最盛期までの期間は短、子実体収量はかなり多、有効茎本数は中、有効茎数と子実体収量との比率は極茎重型である。

出願品種「MK-B-1」は、対照品種「018-3C」と比較して、菌糸生長最適温度が28℃であること、菌さんの色（暗所の生育）がその他（濃褐色）であること、子実体の生育期間がかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「EB赤1号」と比較して、菌糸生長最適温度が28℃であること、20℃の場合の菌糸体の生長速度がかなり早であること、菌さんの色（暗所の生育）がその他（濃褐色）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社丸金
長野県長野市篠ノ井小松原字前河原2367番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

金子満

7 出願公表の年月日 令和3年1月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

在来種から、変異株を選抜し育成したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29023号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Flammulina velutipes (Fr.) Sing. ME-09Ling

3 登録品種の特性の概要

菌さん断面の形は丸山形、菌さん縁の巻き込みは有、菌さんの大きさはやや小、菌さんの高さはやや大、菌さんの色（暗所の生育）は淡黄白色、菌柄の断面の形は楕円形、菌柄の長さは中、菌柄の太さは中、菌柄の色（暗所の生育）は淡黄白色、菌柄基部の色（暗所の生育）は淡黄白色、株の接着程度は弱、発生最盛期までの期間は短、子実体収量は極多、有効茎本数はやや多、有効茎数と子実体収量との比率はかなり茎重型である。

出願品種「ME-09Ling」は、対照品種「ME-07LaLa」と比較して、10℃の場合の菌糸体の生長速度が中であること、株の接着程度が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ME-08Haru」と比較して、10℃の場合の菌糸体の生長速度が中であること、株の接着程度が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社モールドラゴ
長野県千曲市大字戸倉1994番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名

角田茂幸

7 出願公表の年月日 令和2年12月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ME-07LaLa」と「ME-08Haru」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29024号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Flammulina velutipes (Fr.) Sing. ME-10Aki

3 登録品種の特性の概要

菌さん断面の形は丸山形、菌さん縁の巻き込みは有、菌さんの大きさは中、菌さんの高さは大、菌さんの色（暗所の生育）は淡黄白色、菌柄の断面の形は楕円形、菌柄の長さは中、菌柄の太さは中、菌柄の色（暗所の生育）は淡黄白色、菌柄基部の色（暗所の生育）は淡黄白色、株の接着程度は中、発生最盛期までの期間はかなり短、子実体収量は極多、有効基本数はやや多、有効茎数と子実体収量との比率は極茎重型である。

出願品種「ME-10Aki」は、対照品種「ME-07LaLa」と比較して、菌糸生長最適温度が22℃であること、20℃の場合の菌糸体の生長速度が遅であること、25℃の場合の菌糸体の生長速度がやや遅であること、30℃の場合の菌糸体の生長速度が中であること、株の接着程度が中であること、菌かきから子実体発生までの期間がやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「ME-09Ling」と比較して、菌糸生長最適温度が22℃であること、25℃の場合の菌糸体の生長速度がやや遅であること、30℃の場合の菌糸体の生長速度が中であること、株の接着程度が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社モールドラゴ
長野県千曲市大字戸倉1994番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名

角田茂幸

7 出願公表の年月日 令和2年12月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者保有株と「ME-08Haru」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29025号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Freesia Eckl. ex Klatt 石川f11号（イカwf11ゴウ）

3 登録品種の特性の概要

分枝の数は中、花茎の長さはかなり長、花茎の太さは太、葉の幅はやや広、花序の長さは長、花序の花の数は多、花型は一重、外花被の形は広楕円形、内花被の形は広卵形、側方外花被の表面の主な色はNN155C、中央外花被の表面の主な色はNN155C、中央外花被の表面の斑紋の大きさは無又は極小、喉部外側の主な色は157C、喉部内側の主な色はNN155C、喉部内側の条線の強弱は無又は極弱、花糸の主な色は白、やくの主な色は白、柱頭の色は同程度、開花期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「石川f11号」は、対照品種「アントス」と比較して、草丈が高であること等で区別性が認められる。対照品種「テレサ」と比較して、花茎の長さがかなり長であること、花型が一重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

石川県

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

浅野彩花 村濱稔 小牧正子

7 出願公表の年月日 令和元年10月1日

8 登録品種の育成の経過の概要

「アントス」に「スーパーエレガンス」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29026号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycyrrhiza glabra L. 新日本製薬GG01 (シニホンヤクGG01)

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は高、根の数はやや多、根の太さは細、根の表皮の色は赤褐、根の横断面の黄色系着色の強弱は強、茎数はやや多、茎のアントシアニン着色の強弱は中、茎の毛の粗密は無又は極粗、葉の長さは長、葉の幅は中、葉の波打ちの強弱は無又は極弱、小葉の数は中、小葉の葉身の長さは中、小葉の葉身の幅はやや狭、花序の数は極多、花序の長さはかなり長、小花の数はやや多、花の色は83D、乾燥根の重量はかなり重、グリチルリチン酸含量はやや少である。

出願品種「新日本製薬GG01」は、対照品種「富山医薬大系」と比較して、葉柄の長さがやや長であること、小葉の数が中であること、乾燥根の重量がかなり重であること等で区別性が認められる。対照品種「北農試系」と比較して、草丈が高であること、節数が多いこと、分枝の数がかなり多であること等で区別性が認められる。対照品種「oups031」と比較して、草丈が高であること、節数が多いこと、分枝の数がかなり多であること、枯れ上がりの早晩性が中であること、乾燥根の重量がかなり重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

新日本製薬株式会社
福岡県福岡市中央区大手門一丁目4番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉岡達文 末岡昭宣 藤田浩基

7 出願公表の年月日 平成28年4月27日

8 登録品種の育成の経過の概要

大阪薬科大学より入手した種子より、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29027号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Grifola frondosa (Fr.) S. F. Gray チクマッシュCM-5

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌叢表面の形状は平滑、菌糸体生長最適温度はやや低、子実体株の径はやや大、菌さんの大きさはやや小、菌さんの厚さは中、菌さんの形状は扇状、菌さんの縁部の切れ込みは無、菌さんの断面の形は下方45度、菌さんの表面の色は灰白色、菌さんの肉質は硬、菌さんの表面の環紋の形状は周縁部内側、管孔発達の部位は菌柄付近まで、子実体株の基部の形は細形、発生最盛期までの期間はかなり短、子実体の生育最適温度はやや低、収量性は多である。

出願品種「チクマッシュCM-5」は、対照品種「雪国舞11号」と比較して、菌糸体の温度別成長速度（10° C/日）が中であること、菌糸体の温度別成長速度（15° C/日）が速であること、培養菌床の表面被（皮）膜の形成が少であること等で区別性が認められる。対照品種「森51号」と比較して、菌糸体の温度別成長速度（15° C/日）が速であること、菌糸体の温度別成長速度（20° C/日）がかなり速であること、菌糸体の温度別成長速度（25° C/日）がやや遅であること、菌さんの断面の形が下方45度であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社千曲化成
長野県千曲市大字内川1101番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

本澤和人

7 出願公表の年月日 令和3年3月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

野生株に出願者保有株を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29028号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Grifola frondosa (Fr.) S. F. Gray チクマッシュCM-6

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌叢表面の形状は平滑、菌糸体生長最適温度は中、子実体株の径はやや大、菌さんの大きさはやや小、菌さんの厚さは中、菌さんの形状は扇状、菌さんの縁部の切れ込みは無、菌さんの断面の形は水平、菌さんの表面の色は灰白色、菌さんの肉質はやや硬、菌さんの表面の環紋の形状は周縁部、管孔発達の部位は菌さん全体、子実体株の基部の形は細形、発生最盛期までの期間はかなり短、子実体の生育最適温度はやや低、収量性は多である。

出願品種「チクマッシュCM-6」は、対照品種「チクマッシュCM-5」と比較して、菌糸体の温度別成長速度（10° C/日）が遅であること、菌糸体の温度別成長速度（15° C/日）がやや速であること、菌糸体の温度別成長速度（20° C/日）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「森51号」と比較して、菌糸体の温度別成長速度（25° C/日）が遅であること、菌さんの表面の色が灰白色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社千曲化成
長野県千曲市大字内川1101番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

本澤和人

7 出願公表の年月日 令和3年3月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

野生株を分離・固定し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29029号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. NCHA8

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高はやや高、枝の斑点の多少は無、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は粗、葉身長はやや長、葉身幅は広、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は白、装飾花の数はかなり多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度はかなり弱、装飾花の直径はかなり小、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は155C、装飾花のがく片の形は楕円形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は3から7、花色の変化性は無、開花の開始時期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「NCHA8」は、対照品種「アナベル」と比較して、樹高がやや高であること、花序の形が半球形であること、節間長がやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「Abetwo」と比較して、樹高がやや高であること、装飾花のがく片の重なり程度がかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Spring Meadow Nursery, Inc.

12601 120th Ave. Grand Haven, Michigan, 49417, U.S.A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

Thomas Green Ranney

7 出願公表の年月日 平成30年4月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者が所属する法人所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29030号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. SMNHALR

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は極高、枝の斑点の多少は無、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は心形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形はやや細、葉身長はかなり長、葉身幅は極広、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は大、両性花の色は白、装飾花の数は極多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度はかなり弱、装飾花の直径はかなり小、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は157D、装飾花のがく片の形は楕円形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は3と4、花色の変化性は無、開花の開始時期はやや晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「SMNHALR」は、対照品種「アナベル」と比較して、花序の形が半球形であること、花序の厚さがやや厚であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Spring Meadow Nursery, Inc.

12601 120th Ave. Grand Haven, Michigan, 49417, U.S.A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

Timothy D. Wood

7 出願公表の年月日 平成30年4月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のHydrangea arborescens subsp. radiataの系統に「Pink Pincushion」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29031号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. NCHA5

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は無、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形はやや粗、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径はやや小、両性花の色は白、装飾花の数は多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは無、装飾花の直径はかなり小、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は145D、装飾花のがく片の形は楕円形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は3から7、花色の変化性は無、開花の開始時期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「NCHA5」は、対照品種「Abetwo」と比較して、樹高が中であること、葉身長が中であること、葉身幅が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Spring Meadow Nursery, Inc.

12601 120th Ave. Grand Haven, Michigan, 49417, U.S.A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

Thomas Green Ranney

7 出願公表の年月日 平成30年4月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者が所属する法人所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29032号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Jamesbrittenia Kuntze JBP 1

3 登録品種の特性の概要

草型は斜上型、草丈は高、茎の長さはやや長、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、節間長はやや短、葉型は単葉、葉身の長さはやや短、葉身の幅はかなり狭、葉柄の長さは中、葉身の表面の主な色は緑、葉身の斑の有無は無、花型は一重、花の長さは長、花の幅はかなり広、花の主な色は67D、花の二次色は濃桃、花冠裂片の先端の形は凹形、花筒の長さは極長である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「JBP 1」は、対照品種「APRICOT DIVA」と比較して、茎の長さがやや長であること、花の主な色が67Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BG-BREEDING ApS

Anderupvej 68, Anderup, 5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jens Ingemann Pedersen

7 出願公表の年月日 平成29年7月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29033号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Jamesbrittenia Kuntze DJAMGOL

3 登録品種の特性の概要

草型は直立型、草丈は高、茎の長さはやや短、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、節間長はやや短、葉型は単葉、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉柄の長さは中、葉身の表面の主な色は淡緑、葉身の斑の有無は無、花型は一重、花の長さはやや長、花の幅は中、花の主な色は4D、花の二次色は黄、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の長さは長である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DJAMGOL」は、対照品種「APRICOT DIVA」と比較して、草型が直立型であること、花の主な色が4Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 5029700, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gavriel Danziger

7 出願公表の年月日 令和2年3月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29034号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinus edodes (Berk.) Sing. 森XR2号 (モリXR2ゴ`ウ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸体の生長最適温度は24℃、菌糸体の温度別成長速度(10℃C/日)はやや速、菌糸体の温度別成長速度(15℃C/日)は速、菌糸体の温度別成長速度(20℃C/日)はかなり速、菌糸体の温度別生長速度(25℃C/日)は速、菌糸体の温度別生長速度(30℃C/日)はやや速、菌さんの縦断面形は平形、菌さんの大きさは小、菌さん表面の地色は褐色、菌さんの厚さはやや厚、菌さんの硬さは硬、りん皮の付着部位は全面、りん皮の大きさはやや大、りん皮の着色の有無は有、ひだの形は離柄三角形、ひだの並び方は波状・ちぢれ、ひだの幅はかなり狭、ひだの密度は密、ひだの色は白色、菌柄の形は円柱、菌柄の長さは短、菌柄の太さは中、菌柄の表面の着色の有無は有、菌柄の毛羽の密度は密、菌柄の毛羽の着色の有無は有、菌柄の硬さはやや硬、菌柄の色は淡黄色、菌さんの直径／菌柄の長さは中、子実体の平均乾燥重量は軽、発生処理までの期間は短、発生処理から収穫最盛期までの期間はやや短である。

出願品種「森XR2号」は、対照品種「秋山A-950号」と比較して、ひだの並び方が波状・ちぢれであること、ひだのちぢれの割合が極多であること、ひだの幅がかなり狭であること等で区別性が認められる。対照品種「すその360号」と比較して、菌糸体の温度別成長速度(15℃C/日)が速であること、菌糸体の温度別成長速度(20℃C/日)がかなり速であること、菌糸体の温度別生長速度(25℃C/日)が速であること、菌さんの直径／菌さんの厚さがかなり小であること、ひだの並び方が波状・ちぢれであること、ひだのちぢれの割合が極多であること、ひだの幅がかなり狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

森産業株式会社
群馬県桐生市西久方町一丁目2番23号

6 登録品種の育成をした者の氏名

五十嵐祥友 岩本綾

7 出願公表の年月日 平成30年10月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

「JMS KV-92」に「自社保有株」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29035号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinus edodes (Berk.) Sing. 森Jh114号 (㊦Jh114㊦㊦)

3 登録品種の特性の概要

菌糸体の生長最適温度は24℃、菌糸体の温度別成長速度(10℃C/日)はやや速、菌糸体の温度別成長速度(15℃C/日)は中、菌糸体の温度別成長速度(20℃C/日)は中、菌糸体の温度別生長速度(25℃C/日)は中、菌糸体の温度別生長速度(30℃C/日)は速、菌さんの縦断面形は平形、菌さんの大きさはやや大、菌さん表面の地色は褐色、菌さんの厚さは中、菌さんの硬さは硬、りん皮の付着部位は全面、りん皮の大きさはかなり小、りん皮の着色の有無は有、ひだの形は着柄三角形、ひだの並び方は直、ひだの幅はやや狭、ひだの密度は密、ひだの色は白色、菌柄の形は基部に向かって太い、菌柄の長さは中、菌柄の太さは中、菌柄の表面の着色の有無は有、菌柄の毛羽の密度は粗、菌柄の毛羽の着色の有無は有、菌柄の硬さはやや硬、菌柄の色は淡黄色、菌さんの直径／菌柄の長さは中、子実体の平均乾燥重量はやや重、発生処理までの期間は短、発生処理から収穫最盛期までの期間は短である。

出願品種「森Jh114号」は、対照品種「KB-2030号」と比較して、菌さんの厚さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「森XR1号」と比較して、菌糸密度が中であること、菌糸体の温度別成長速度(15℃C/日)が中であること、ひだの並び方が直であること、ひだのちぢれの割合が極少であること、菌柄の長さが中であること、子実体の平均乾燥重量がやや重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

森産業株式会社
群馬県桐生市西久方町一丁目2番23号

6 登録品種の育成をした者の氏名

岩本綾

7 出願公表の年月日 平成30年12月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

自社保有株どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29036号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinus edodes (Berk.) Sing. 菌興N115号 (キノコN115ゴロ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は27℃、菌さんの形(平面)は円形、菌さんの形(側面)は凸形、菌さんの形(肉の形)は3型、菌さんの大きさ(自然栽培)は小、菌さんの色は褐色、菌さんの厚さ(自然栽培)はかなり厚、菌さんの肉質は中、りん皮の付着部位は全面、りん皮の大きさは小、りん皮の色は有、子実層たぐの形状は3型、子実層たぐの並び方は波状ちぢれ、子実層たぐの幅はやや狭、子実層たぐの密度は密、子実層たぐの色は白色、菌柄の形は3型、菌柄の長さは短、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率は大、菌柄の太さは太、菌さんの直径と菌柄の太さとの比率はやや小、菌柄の表面の色はいは有、菌柄の毛の色は有、菌柄の毛の有無は有、菌柄の肉質は硬、子実体の発生時期(自然栽培)は春、子実体の発生型は集中、収量性は少である。

出願品種「菌興N115号」は、対照品種「菌興115号」と比較して、菌さんの肉質が中であること、年別収量比率1が30～40%未満であること等で区別性が認められる。対照品種「菌興301号」と比較して、菌さんの大きさ(自然栽培)が小であること、菌さんの色が褐色であること、子実層たぐの幅がやや狭であること、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率が大であること、菌さんの直径と菌柄の太さとの比率がやや小であること、菌柄の肉質が硬であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

一般財団法人日本きのこセンター
鳥取県鳥取市富安1丁目84番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

寺島 和寿 黒田 誠 佐々木 明正 長谷部 公三郎

7 出願公表の年月日 平成31年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

自社保有株どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29037号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinus edodes (Berk.) Sing. もりの金太郎 (モリノキンタロウ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸体の生長最適温度は24℃、菌糸体の温度別成長速度(10℃C/日)は極速、菌糸体の温度別成長速度(15℃C/日)は速、菌糸体の温度別成長速度(20℃C/日)はやや遅、菌糸体の温度別生長速度(25℃C/日)は速、菌糸体の温度別生長速度(30℃C/日)は極速、菌さんの縦断面形は平形、菌さんの大きさはやや大、菌さん表面の地色は褐色、菌さんの厚さは中、菌さんの硬さは硬、りん皮の付着部位は全面、りん皮の大きさは大、りん皮の着色の有無は有、ひだの形は離柄三角形、ひだの並び方は直、ひだの幅はかなり狭、ひだの密度は中、ひだの色は白色、菌柄の形は基部に向かって太い、菌柄の長さは極短、菌柄の太さは中、菌柄の表面の着色の有無は有、菌柄の毛羽の密度は中、菌柄の毛羽の着色の有無は有、菌柄の硬さは中、菌柄の色は淡黄色、菌さんの直径／菌柄の長さは大、子実体の平均乾燥重量は重、発生処理までの期間はかなり短、発生処理から収穫最盛期までの期間は極長である。

出願品種「もりの金太郎」は、対照品種「もりの春太」と比較して、菌糸密度が密であること、菌さんの直径／菌さんの厚さがやや大であること、発生処理までの期間がかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「ゆう次郎」と比較して、菌さんの直径／菌柄の長さが大であること、子実体の平均乾燥重量が重であること、発生処理までの期間がかなり短であること、発生処理から収穫最盛期までの期間が極長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

森産業株式会社
群馬県桐生市西久方町一丁目2番23号

6 登録品種の育成をした者の氏名

田村 孝史 後田 牧洋

7 出願公表の年月日 平成31年4月8日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ゆう次郎」に自社保有株を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29038号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinus edodes (Berk.) Sing. 菌興301号 (キノコ301コリ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は27℃、菌さんの形(平面)は円形、菌さんの形(側面)は凸形、菌さんの形(肉の形)は3型、菌さんの大きさ(自然栽培)は中、菌さんの色はその他(橙褐色)、菌さんの厚さ(自然栽培)はかなり厚、菌さんの肉質は中、りん皮の付着部位は全面、りん皮の大きさはかなり小、りん皮の色は有、子実層たくの形状は3型、子実層たくの並び方は正常、子実層たくの幅は広、子実層たくの密度は中、子実層たく色はその他(N170D)、菌柄の形は3型、菌柄の長さはかなり短、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率は極大、菌柄の太さはやや太、菌さんの直径と菌柄の太さとの比率はやや大、菌柄の表面の色あいは有、菌柄の毛の色は有、菌柄の毛の有無は有、菌柄の肉質は中、子実体の発生時期(自然栽培)は春秋、子実体の発生型は散発、収量性は少である。

出願品種「菌興301号」は、対照品種「菌興368号」と比較して、子実層たくの幅が広であること等で区別性が認められる。対照品種「菌興115号」と比較して、菌叢表面の色が有であること、菌さんの色がその他(橙褐色)であること、子実層たくの幅が広であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

一般財団法人日本きのこセンター
鳥取県鳥取市富安1丁目84番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

寺島和寿 黒田誠 佐々木明正 長谷部公三郎

7 出願公表の年月日 令和2年1月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

「菌興368号」に自社保有株を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29039号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinus edodes (Berk.) Sing. HKLE12

3 登録品種の特性の概要

菌糸体の生長最適温度は23℃、菌糸体の温度別成長速度（10° C/日）は中、菌糸体の温度別成長速度（15° C/日）は中、菌糸体の温度別成長速度（20° C/日）は中、菌糸体の温度別生長速度（25℃/日）は中、菌糸体の温度別生長速度（30℃/日）はやや速、菌さんの縦断面形は平形、菌さんの大きさは中、菌さん表面の地色は黄褐色、菌さんの厚さはやや厚、菌さんの硬さは硬、りん皮の付着部位は周縁、りん皮の大きさは小、りん皮の着色の有無は無、ひだの形は離柄三角形、ひだの並び方は波状・ちぢれ、ひだの幅は極狭、ひだの密度は密、ひだの色は白色、菌柄の形は円柱、菌柄の長さは短、菌柄の太さはやや細、菌柄の表面の着色の有無は有、菌柄の毛羽の密度は密、菌柄の毛羽の着色の有無は有、菌柄の硬さは中、菌柄の色は淡橙色、菌さんの直径／菌柄の長さは中、子実体の平均乾燥重量は軽、発生処理までの期間は中、発生処理から収穫最盛期までの期間は中である。

出願品種「HKLE12」は、対照品種「HOKSY 8号菌」と比較して、菌柄の長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「森XR1号」と比較して、菌糸体の温度別生長速度（30℃/日）がやや速であること、菌さんの直径／菌さんの厚さがやや小であること、発生処理から収穫最盛期までの期間が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ホクト株式会社
長野県長野市南堀138番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

作田 元気 石川 真梨子

7 出願公表の年月日 令和2年5月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

「HOKSY8号菌」と「HOKSY11号菌」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29040号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinus edodes (Berk.) Sing. 森104号 (もり104ごう)

3 登録品種の特性の概要

菌糸体の生長最適温度は24℃、菌糸体の温度別成長速度（10℃ C/日）はやや速、菌糸体の温度別成長速度（15℃ C/日）はやや速、菌糸体の温度別成長速度（20℃ C/日）は速、菌糸体の温度別生長速度（25℃/日）はやや速、菌糸体の温度別生長速度（30℃/日）はやや速、菌さんの縦断面形は丸山形、菌さんの大きさはかなり大、菌さん表面の地色は黄褐色、菌さんの厚さはかなり厚、菌さんの硬さは硬、りん皮の付着部位は全面、りん皮の大きさは無または極小、りん皮の着色の有無は有、ひだの形は離柄三角形、ひだの並び方は直、ひだの幅はかなり狭、ひだの密度は中、ひだの色は白色、菌柄の形は基部に向かって太い、菌柄の長さは中、菌柄の太さは中、菌柄の表面の着色の有無は有、菌柄の毛羽の密度は中、菌柄の毛羽の着色の有無は有、菌柄の硬さはやや硬、菌柄の色は淡黄色、菌さんの直径／菌柄の長さはやや大、子実体の平均乾燥重量は極重、発生処理までの期間はやや短、発生処理から収穫最盛期までの期間は短である。

出願品種「森104号」は、対照品種「秋山A-711号」と比較して、菌さん表面の地色が黄褐色であること等で区別性が認められる。対照品種「森XR1号」と比較して、菌さんの大きさがかなり大であること、菌さんの厚さがかなり厚であること、りん皮の大きさが無または極小であること、ひだのちぢれの割合が極少であること、菌柄の長さが中であること、子実体の平均乾燥重量が極重であること、発生処理までの期間がやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

森産業株式会社
群馬県桐生市西久方町一丁目2番23号

6 登録品種の育成をした者の氏名

田村孝史 岩本綾 中村光順

7 出願公表の年月日 令和2年6月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

「もりの玉実」に自社保有株を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29041号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. やわ恋もち (ヤワレモチ)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期はやや早、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）はやや短、穂の主軸の長さはやや長、穂数は少、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さは短、外穎の毛じは中、外穎先端の色は褐、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は中、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、粳の千粒重は中、玄米の千粒重は中、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は白、胚乳の型は糯、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性は強、穂発芽性はやや難、脱粒性は難、葉いもちほ場抵抗性は極強、穂いもちほ場抵抗性はかなり強である。

出願品種「やわ恋もち」は、対照品種「きぬはなもち」と比較して、出穂期がやや早であること、障害型耐冷性が強であること、葉いもちほ場抵抗性が極強であること等で区別性が認められる。対照品種「モチミノリ」と比較して、出穂期がやや早であること、葉いもちほ場抵抗性が極強であること等で区別性が認められる。対照品種「ココノエモチ」と比較して、穂数が少であること、初期の芒の色が黄白であること、成熟期が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

愛知県
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村充 池田彰弘 鈴木太郎 野々山利博 吉田朋史 水上優子
加藤恭宏 中嶋泰則 梅本貴之 池ヶ谷智仁

7 出願公表の年月日 平成30年9月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

「中部糯130号」とF2（「こはるもち」*2/「早不知D」）のF1に「中部糯130号」と「こはるもち」のF1を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 0 4 2 号 令和 4 年 3 月 1 5 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium peltatum (L.) L'Her. x Pelargonium zonale Group PACPEIA

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色（アントシアニンを除く。）は緑、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は心臓形、葉身の切れ込みの深さはやや浅、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の基部の重なりはやや開く、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色（環状紋を除く。）は緑～濃緑、葉身の表面の環状紋の明瞭度は弱、花柄の長さは短、花序の幅はやや広、最大花の幅は中、小花柄の長さはやや長、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱は強、小花柄の突起の有無は有、花型は八重、花卉の数（八重品種に限る。）は少、上部花卉の幅は中、上部花卉の先端の形は全縁、上部花卉の表面の周縁部の色は53A、上部花卉の表面の中央部の色はN45A、上部花卉の模様の明瞭度は無又は極弱、上部花卉の基部の複色部の有無は無、下部花卉の表面の周縁部の色は53A、下部花卉の表面の中央部の色はN45A、下部花卉の裏面の色は53C、下部花卉の模様の明瞭度は無又は極弱、下部花卉の基部の複色部の有無は無、内部花卉の表面の中央部の色（八重品種に限る。）は53Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PACPEIA」は、対照品種「クリプ ダルベド」と比較して、花柄の長さが短であること、花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、小花柄の突起の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「カリオペ ダークレッド」と比較して、葉身の幅がやや狭であること、花柄の長さが短であること、小花柄の突起の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Str. 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Antonina Feindura

7 出願公表の年月日 平成 2 9 年 9 月 2 5 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29043号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium peltatum (L.) L'Her. x Pelargonium zonale Group PEQZ0013

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色（アントシアニンを除く。）は緑、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の形は円形、葉身の切れ込みの深さはかなり浅、葉身の周縁の波打ちの強弱はやや弱、葉身の基部の重なりは閉じる、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色（環状紋を除く。）は濃緑、葉身の表面の環状紋の明瞭度は無又は極弱、花柄の長さはやや短、花序の幅は広、最大花の幅はやや広、小花柄の長さはやや長、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱はやや弱、小花柄の突起の有無は有、花型は八重、花卉の数（八重品種に限る。）は少、上部花卉の幅は広、上部花卉の先端の形は全縁、上部花卉の表面の周縁部の色はNN155C、上部花卉の表面の中央部の色はNN155C、上部花卉の模様の明瞭度はやや強、上部花卉の模様の形は条のみ、上部花卉の基部の複色部の有無は無、下部花卉の表面の周縁部の色はNN155C、下部花卉の表面の中央部の色はNN155C、下部花卉の裏面の色はNN155C、下部花卉の模様の明瞭度は無又は極弱、下部花卉の基部の複色部の有無は無、内部花卉の表面の中央部の色（八重品種に限る。）はNN155Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PEQZ0013」は、対照品種「グラシス」と比較して、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱がやや弱であること、小花柄の突起の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「PACICEBERG」と比較して、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱がやや弱であること、小花柄の突起の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ronald Snijder

7 出願公表の年月日 平成31年2月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29044号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group PEQZ0015

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色（アントシアニンを除く。）は緑、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の形は腎臓形、葉身の切れ込みの深さはやや浅、葉身の周縁の波打ちの強弱はやや弱、葉身の基部の重なりはやや開く、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色（環状紋を除く。）は緑～濃緑、葉身の表面の環状紋の明瞭度は弱、花柄の長さは中、花序の幅はやや広、最大花の幅は中、小花柄の長さはやや短、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱は強、小花柄の突起の有無は無、花型は八重、花卉の数（八重品種に限る。）は少、上部花卉の幅はやや広、上部花卉の先端の形は全縁、上部花卉の表面の周縁部の色は53A、上部花卉の表面の中央部の色は53A、上部花卉の模様の明瞭度はかなり弱、上部花卉の模様の形は条のみ、上部花卉の基部の複色部の有無は無、下部花卉の表面の周縁部の色は53A、下部花卉の表面の中央部の色は53A、下部花卉の裏面の色は46A、下部花卉の模様の明瞭度は無又は極弱、下部花卉の基部の複色部の有無は無、内部花卉の表面の中央部の色（八重品種に限る。）は53Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PEQZ0015」は、対照品種「CHAM11273」と比較して、最大花の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「カリオペ ダークレッド」と比較して、葉身の表面の環状紋の明瞭度が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Mitch Hanes

7 出願公表の年月日 平成31年2月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 0 4 5 号 令和 4 年 3 月 1 5 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group KLEPZ17484

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、茎の色（アントシアニンを除く。）は緑、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は腎臓形、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の基部の重なりはやや開く、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色（環状紋を除く。）は濃緑、葉身の表面の環状紋の明瞭度は強、花柄の長さはやや長、花序の幅はやや広、最大花の幅は中、小花柄の長さはやや長、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱はかなり強、小花柄の突起の有無は無、花型は八重、花卉の数（八重品種に限る。）は少、上部花卉の幅はやや広、上部花卉の先端の形は全縁、上部花卉の表面の周縁部の色はN45B、上部花卉の表面の中央部の色はN45B、上部花卉の模様の明瞭度は無又は極弱、上部花卉の基部の複色部の有無は無、下部花卉の表面の周縁部の色はN45B、下部花卉の表面の中央部の色はN45B、下部花卉の裏面の色は45B、下部花卉の模様の明瞭度は無又は極弱、下部花卉の基部の複色部の有無は無、内部花卉の表面の中央部の色（八重品種に限る。）はN45Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KLEPZ17484」は、対照品種「SIL MAGNUS IMP」と比較して、葉身の表面の環状紋の明瞭度が強であること等で区別性が認められる。対照品種「クリプ ダルベド」と比較して、葉身の表面の環状紋の明瞭度が強であること、上部花卉の基部の複色部の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Klemm+Sohn GmbH & Co. KG
Hanfacker 10, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Glawe

7 出願公表の年月日 平成 3 0 年 1 2 月 2 5 日

8 登録品種の育成の経過の概要

「SIL Magnus」に「PAC Abelina」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29046号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pisum sativum L. 光丸うすい（ミツマルスイ）

3 登録品種の特性の概要

草姿・草丈はやや高性、分枝型は下位上位分枝型、分枝数は中、小葉の大きさは中、小葉の形状は偏楕円形、小葉先端の形状は丸味形、小葉数は3対、托葉の大きさは中、托葉の形状は不正楕円形、葉色は緑、茎の太さは中、茎葉の色素発生は無又は極少、花の大きさはやや大、花色は白、花房の花数は2花性、初花房の節位は低、莢の長さは中、莢の幅は中程度、莢のそりはそらない、莢の緑色度は緑、莢の重さ（青実用種に限る）はやや軽、青実の着粒密度（青実用種に限る）は中、青実の大きさ（青実用種に限る）は小、青実の形状（青実用種に限る）は偏球形、青実の緑色度（青実用種に限る）は緑、種子の大きさはやや大、種子の1000粒重はやや重、種子の形状は球形、種子の地色は黄白色、種子の目の色は黒、用途は青実用、収穫の早晚性はやや晩生である。

出願品種「光丸うすい」は、対照品種「きしゅううすい」と比較して、節間長が中であること等で区別性が認められる。対照品種「白虎うすい」と比較して、草姿・草丈がやや高性であること、節間長が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大野光男

和歌山県日高郡みなべ町東本庄227番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

大野光男

7 出願公表の年月日 平成31年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

「きしゅううすい」の変異株であり、青実用品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第29047号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus L. 春裾野 (ハルソノ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は箒状、樹高は低木性、樹幹の色は灰褐色、皮目の多少は少、枝の太さはかなり細、枝の色は褐色、分枝性は強、葉の全体の形は広倒卵形、葉の先端の形は鋭尖形、葉の基部の形は円形、葉縁の鋸歯の深さは浅、葉の鋸歯の形は単鋸歯、葉の鋸歯の先端の形は鋭形、葉の長さはやや長、葉の幅は広、葉の厚さは中、蜜腺の有無は無、花序の形は散形状、花序の花数はやや少、蕾の色は62B、花の向きは横向き、花の形は一重咲、花の開き方は平開形、花の大きさはかなり小輪、花の色は62D、花卉全体の形は楕円形、花卉の先端の形（切れ込みの多少）は少、花卉の基部の形は鈍形、花卉の脈の色は目立たない、花卉の数は約5、雌ずいと雄ずいの長さの比較は長、雄ずいの数はやや少、がく筒の形は盤状形以外、盤状形以外のがく筒の形は鐘形、がく筒の毛の多少はやや少、がく裂片の形は長卵状三角形、花柄の長さは極短、花の香りは少し有、通常開花期は早である。

出願品種「春裾野」は、対照品種「山形おぼこ」と比較して、蜜腺の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「ケイオウザクラ」と比較して、蜜腺の有無が無であること、花卉全体の形が楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

石井重久
静岡県富士市北松野767番地3

6 登録品種の育成をした者の氏名

石井重久

7 出願公表の年月日 平成27年11月27日

8 登録品種の育成の経過の概要

「初夢吹雪」に育成者所有のヤマザクラ系を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29048号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus L. 理恵 (リエ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は盃状、樹高は亜高木性、樹幹の色は灰褐色、皮目の多少は中、枝の太さは中、枝の色は灰褐色、分枝性は中、葉の全体の形は狭長楕円形、葉の先端の形は鋭尖形、葉の基部の形は鈍形、葉縁の鋸歯の深さは深、葉の鋸歯の形は単鋸歯、葉の鋸歯の先端の形は鋭形、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の厚さはやや薄、蜜腺の有無は有、蜜腺の位置は葉身基部、花序の形は散房状、花序の花数は中、花の向きは下垂、花の形は菊咲（段咲無）、花の開き方は広開形、花の大きさはやや大輪、花の色は69A、花弁全体の形は長楕円形、花弁の先端の形（切れ込みの多少）は少、花弁の基部の形は楔形、花弁の脈の色は目立つ、花弁の数は100以上、雌ずいと雄ずいの長さの比較はかなり長、雄ずいの数は中、がく筒の形は盤状形以外、盤状形以外のがく筒の形は漏斗形、がく筒の毛の多少は無、がく裂片の形は広卵状三角形、花柄の長さは中、花の香りは少し有、通常開花期は遅である。

出願品種「理恵」は、対照品種「大聖夢」と比較して、花弁の数が100以上であること等で区別性が認められる。対照品種「ソメイヨシノ」と比較して、花の形が菊咲（段咲無）であること、花弁の数が100以上であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社スピンドル

東京都千代田区神田司町二丁目2番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

石井重久

7 出願公表の年月日 平成29年4月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

「春月花」に「兼六園菊桜」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29049号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. 恵農12号 (エノ12ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は極弱、茎のとげの数は極多、とげの主な色は緑、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はかなり弱、先端小葉の葉身の形は狭楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は中、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は中、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒心臓形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はNN74D、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「恵農12号」は、対照品種「HANSA」と比較して、花卉の切れ込みの強弱が弱であること、花卉の表面の主な色がNN74Dであること等で区別性が認められる。対照品種「オスウェイ」と比較して、茎のとげの数が極多であること、葉の表面の緑色の濃淡が中であること、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が平形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Tang Hua

Shangdongsheng, Pingyinx, anfuqianjie 74 hao, China

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tang Hua

7 出願公表の年月日 平成30年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29050号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. 恵農11号 (エノ11ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は極弱、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は緑、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は無又は極弱、先端小葉の葉身の形は狭楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つばみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色はN74C、花弁の表面の二次色は71C、花弁の表面の二次色の分布は部分又は縞、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「恵農11号」は、対照品種「HANSA」と比較して、茎のとげの数がやや多であること、葉の表面の光沢の強弱が無又は極弱であること、花弁の表面の主な色がN74Cであること等で区別性が認められる。対照品種「恵農12号」と比較して、茎のとげの数がやや多であること、花弁の数が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Tang Hua

Shangdongsheng, Pingyinx, anfuqianjie 74 hao, China

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tang Hua

7 出願公表の年月日 平成30年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29051号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERRUFYDALRED

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱はやや弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN45A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは中、花卉の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERRUFYDALRED」は、対照品種「JACREPIN」と比較して、花卉の切れ込みの強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種「INTERRUFYDALPINK」と比較して、花卉の表面の主な色がN45Aであること、花卉の表面の基部の目の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B.V.
Broekweg 5, 3956NE Leersum, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 平成29年5月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29052号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. RNF CL クリーム 03

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は中、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は中、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は2D、花弁の表面の二次色は62C、花弁の表面の二次色の分布はぼかし、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「RNF CL クリーム 03」は、対照品種「ペネロープ」と比較して、葉の大きさがかなり大であること、花弁の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。対照品種「JACBEAU」と比較して、茎のとげの数が少であること、がくの変形の強弱が弱であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中島均
岐阜県安八郡輪之内町四郷323

6 登録品種の育成をした者の氏名

中島均

7 出願公表の年月日 平成29年7月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

「MEI violin」に育成者所有のRosa rugosa(在来系統)を交配し、選抜したものであ

1 品種登録の番号及び年月日 第29053号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. RNF CL クリーム 04

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つばみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は星形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はやや強、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は1D、花弁の表面の二次色は69C、花弁の表面の二次色の分布はぼかし、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはかなり小、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「RNF CL クリーム 04」は、対照品種「RNF クリーム 02」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱がやや強であること、花弁の波打ちの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中島均
岐阜県安八郡輪之内町四郷323

6 登録品種の育成をした者の氏名

中島均

7 出願公表の年月日 平成29年11月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

「MEI violin」に育成者所有のRosa rugosa(在来系統)を交配し、選抜したものであ

1 品種登録の番号及び年月日 第29054号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KIMwing

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は極少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色はN155D、花卉の表面の二次色は65C、花卉の表面の二次色の分布は縁部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KIMwing」は、対照品種「DORSERE」と比較して、新しょうのアントシアニン着色の強弱がやや強であること、花卉の数がやや少であること等で区別性が認められる。対照品種「RNF CL クリーム 03」と比較して、新しょうのアントシアニン着色の強弱がやや強であること、花卉の表面の二次色の分布が縁部であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社キムラ企画
埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根4425-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

木村卓功

7 出願公表の年月日 平成30年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「KORgrasotra」に「MEIbeausai」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29055号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. 2017カワモCHAR

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は広卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は強、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は75C、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「2017カワモCHAR」は、対照品種「DELGRAMAU」と比較して、花卉の数が多であること、花の直径がやや大であること等で区別性が認められる。対照品種「オステイジユス」と比較して、花の香りの強弱が強であること、花卉の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）が基部に向かって薄くなるであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社河本バラ園
岐阜県揖斐郡大野町大野775

6 登録品種の育成をした者の氏名

河本純子

7 出願公表の年月日 平成30年5月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29056号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DORFELI

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は無又は極少、とげの主な色は紫、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は半八重、花弁の数はかなり少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はN155B、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは極小、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DORFELI」は、対照品種「デルロリ」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、がくの変形の強弱がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「ペネロプ」と比較して、葉の表面の光沢の強弱がやや強であること、がくの変形の強弱がやや強であること、花弁の波打ちの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Roseaies DORIEUX EARL
Montagny 42840 Montagny, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Georges DORIEUX

7 出願公表の年月日 平成30年5月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

「SEMIS INEDIT」に「SOURIER D'ORUCHIDEE」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29057号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DORELA

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は紫、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡はかなり濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はN155B、花弁の表面の基部の目の有無は無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は62Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DORELA」は、対照品種「KIMcoeur」と比較して、葉の表面の緑色の濃淡がかなり濃であること、花弁の数がやや少であること等で区別性が認められる。対照品種「MEIGIDEON」と比較して、葉の表面の緑色の濃淡がかなり濃であること、葉の表面の光沢の強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Roseraies DORIEUX EARL
Montagny 42840 Montagny, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Georges DORIEUX

7 出願公表の年月日 平成30年4月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

「DORBLAN」に「MEIBDEROS」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29058号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DELJAUPAR

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は中、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は5C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELJAUPAR」は、対照品種「グラハム トーマス」と比較して、葉の表面の光沢の強弱がやや強であること、花弁の数がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種「VISgomaju」と比較して、茎のとげの数が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

SOCIETE NOUVELLE PEPINIERES ET ROSERAIES GEORGES DELBARD SAS
9, route de Commentry, 03600 MALICORNE, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arnaud DELBARD

7 出願公表の年月日 平成30年4月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

「DELSAR」に「DELGRARO」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29059号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DELCREOR

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は中、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色はN155C、花卉の表面の二次色は2D、花卉の表面の二次色の分布はばかし、花卉の表面の基部の目の有無は無である。
（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELCREOR」は、対照品種「TAN96201」と比較して、先端小葉の葉身の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「レディ ヒリンドン」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱がかなり弱であること、葉の表面の光沢の強弱が強であること、花卉の表面の主な色がN155Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

SOCIETE NOUVELLE PEPINIERES ET ROSERAIES GEORGES DELBARD SAS
9, route de Commentry, 03600 MALICORNE, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arnaud DELBARD

7 出願公表の年月日 平成30年4月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Kororbe」に出願者が所有する無名実生種を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29060号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DELFLUOROS

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は多、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はN57C、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは極大、花弁の表面の基部の目の色は黄、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は3Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELFLUOROS」は、対照品種「KEIHAHANAYA」と比較して、茎のとげの数が多であること、葉の表面の光沢の強弱がやや強であること、花弁の数が少であること等で区別性が認められる。対照品種「MEIBIHARS」と比較して、がくの変形の強弱がやや弱であること、花弁の表面の主な色がN57Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

SOCIETE NOUVELLE PEPINIERES ET ROSERAIES GEORGES DELBARD SAS
9, route de Commentry, 03600 MALICORNE, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arnaud DELBARD

7 出願公表の年月日 平成30年4月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

「デルスタヴォ」に「ADHARMAN」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29061号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DICOMMATAC

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はつる性、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鈍形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はやや少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はやや弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は60A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはかなり小、花卉の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DICOMMATAC」は、対照品種「ポールズ スカーレット クライマー」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花卉の表面の主な色が60Aであること等で区別性が認められる。対照品種「コモドーレ」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱がかなり弱であること、花卉の表面の主な色が60Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
千葉県八千代市大和田新田755番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Colin Dickson

7 出願公表の年月日 平成30年3月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の無名実生種に「ラドラズ」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29062号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERCOMERSEY

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は中、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は広卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色はN155B、花弁の表面の二次色はN57B、花弁の表面の二次色の分布は斑点、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は黄、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は155Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERCOMERSEY」は、対照品種「SAUCABOU」と比較して、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）が中であること、花の直径がやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B.V.

Hugo de Vriesweg 4, 3481JA Harmelen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 平成30年9月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29063号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORMAHENSI

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はつる性、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は円形、先端小葉の葉身先端の形は円形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は楕円形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は62C、花卉の表面の二次色は158C、花卉の表面の二次色の分布は基部、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は橙黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORMAHENSI」は、対照品種「KORTEKCHO」と比較して、先端小葉の葉身先端の形が円形であること、花卉の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。対照品種「TAN08998」と比較して、がくの変形の強弱が無又は極弱であること、花卉の表面の基部の目の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. Kordes' Soehne Rosenschulen GmbH & Co KG
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Ernst Kordes Tim-Hermann Peter Kordes Margarita Kordes

7 出願公表の年月日 平成30年7月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

「オスハム」に出願者が所有する無名実生種を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29064号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORFLOCI62

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当たりの花の数

（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は楕円形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや多、花の直径はやや小、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はやや弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は3以上、花卉の表面の主な色は155C、花卉の表面の二次色はN66B、花卉の表面の三次色は赤、花卉の表面の二次色の分布はぼかし、花卉の表面の三次色の分布は先端部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORFLOCI62」は、対照品種「聖火」と比較して、花卉の数がやや多であること、花の直径がやや小であること等で区別性が認められる。対照品種

「KORSTEFALI」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱がかなり弱であること、花の直径がやや小であること等で区別性が認められる。対照品種

「Selsoulmusic」と比較して、花卉の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）が密であること、花卉の表面の主な色が155Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. Kordes' Soehne Rosenschulen GmbH & Co KG
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm-Alexander Kordes

7 出願公表の年月日 平成30年7月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

「KORLUTMAG」に「KORCHIAKI」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 0 6 5 号 令和 4 年 3 月 1 5 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORFIZZLEM

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は極弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はやや少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は半八重、花弁の数はかなり少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒心臓形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の表面の色数は 1、花弁の表面の主な色は 9C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「KORFIZZLEM」は、対照品種「MEIJECYCKA」と比較して、葉の表面の緑色の濃淡が中であること、花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）がやや凸形であること等で区別性が認められる。対照品種「RADSUNNY」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が極弱であること、葉の表面の光沢の強弱がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. Kordes' Soehne Rosenschulen GmbH & Co KG
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm-Alexander Kordes

7 出願公表の年月日 平成 3 0 年 9 月 1 9 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する無名実生種に「NOANES」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29066号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. ARURU

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）は中、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さは中、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはかなり小、果径比（縦／横）は小、縦断面の果形は球形、果肩部のひだは無又は極弱、こうあ部のくぼみは弱、へた落ちの大きさはかなり小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさは小、果肉の厚さはやや薄、子室数は2のみ、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色は赤、果実の硬さは硬、開花の早晩はやや早、成熟の早晩はかなり早である。

出願品種「ARURU」は、対照品種「Cf小鈴」と比較して、棚持ちの良さ（日持ち性、生食用品種に限る）が中であること、開花の早晩がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「TTM043」と比較して、縦断面の果形が球形であること、糖度（可溶性固形物含量）が極高であること等で区別性が認められる。対照品種「サンチェリーピュア」と比較して、こうあ部のくぼみが弱であることで区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.

Burgemeester Crezeelaan 40, 2678KX De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

K. Reinink

7 出願公表の年月日 平成30年10月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第29067号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. スパイク-ネオ

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）は中、葉長は中、葉幅はやや狭、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さは中、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはやや小、果径比（縦／横）はやや小、縦断面の果形はハート形、果肩部のひだはかなり弱、こうあ部のくぼみは弱、へた落ちの大きさは小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は突出、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさは小、果肉の厚さは中、子室数は2又は3、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色は赤、果実の硬さはやや硬、開花の早晩はやや早、成熟の早晩はやや早である。

出願品種「スパイク-ネオ」は、対照品種「スパイクセブン」と比較して、果実の大きさがやや小であること、こうあ部のくぼみが弱であること、子室数が2又は3であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

愛三種苗株式会社
愛知県清須市助七東山中93

6 登録品種の育成をした者の氏名

河本恵一

7 出願公表の年月日 平成31年2月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする台木用の交雑品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第29068号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. KGM182

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）は中、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さはやや濃、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはかなり小、果径比（縦／横）は小、縦断面の果形はやや扁平、果肩部のひだは無又は極弱、こうあ部のくぼみは弱、へた落ちの大きさはかなり小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は無色、果実の心の大きさは小、果肉の厚さはやや薄、子室数は2のみ、幼果期の果肩部の緑色は無、幼果期の果色はやや濃、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色は赤、果実の硬さは硬、開花の早晩は中、成熟の早晩は早である。

出願品種「KGM182」は、対照品種「KGM152」と比較して、葉幅がやや狭であること、開花の早晩が中であること等で区別性が認められる。対照品種「KGM091」と比較して、葉の着生角度がやや下垂であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カゴメ株式会社

愛知県名古屋市中区錦三丁目14番15号

6 登録品種の育成をした者の氏名

ト 滋慶 市川 雅敏 今森 久弥

7 出願公表の年月日 平成30年11月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第29069号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. MKS-T833

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）はやや短、葉長は中、葉幅は中、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さはやや濃、花房の形は単一、花弁の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはかなり小、果径比（縦／横）は小、縦断面の果形は球形、果肩部のひだは無又は極弱、こうあ部のくぼみは弱、へた落ちの大きさはかなり小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさは小、果肉の厚さは薄、子室数は2のみ、幼果期の果肩部の緑色是有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色は赤、果実の硬さは硬、開花の早晩はやや早、成熟の早晩は早である。

出願品種「MKS-T833」は、対照品種「サンチェリーピュア」と比較して、こうあ部のくぼみが弱であることで区別性が認められる。対照品種「BELIDO」と比較して、幼果期の果肩部の緑色の大きさが中であること、幼果期の果肩部の緑色の強さがやや濃であること、棚持ちの良さ（日持ち性、生食用品種に限る）がやや長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ヴィルモランみかど株式会社
千葉県千葉市緑区大野台1丁目4番11号

6 登録品種の育成をした者の氏名

森口克己 久保隆洋

7 出願公表の年月日 平成31年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第29070号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. ルキナ

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）は中、葉長は中、葉幅はやや狭、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさはやや小、葉の緑色の強さは中、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはかなり小、果径比（縦／横）はやや小、縦断面の果形は球形、果肩部のひだは無又は極弱、こうあ部のくぼみはかなり弱、へた落ちの大きさはかなり小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさは小、果肉の厚さはやや薄、子室数は2のみ、幼果期の果肩部の緑色は無、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色は赤、果実の硬さはやや硬である。

出願品種「ルキナ」は、対照品種「華の鈴」と比較して、花落ちの大きさが極小であること、糖度（可溶性固形物含量）がかなり高であること等で区別性が認められる。対照品種「KGM131」と比較して、縦断面の果形が球形であること、糖度（可溶性固形物含量）がかなり高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

公益財団法人若狭湾エネルギー研究センター
福井県敦賀市長谷64号52番地1
福井シード株式会社
福井県福井市開発5丁目2004番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

畑下昌範 前田博和 大野泰希 高城啓一

7 出願公表の年月日 令和元年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

「華の鈴」に「タンミニ」を交配し、選抜した栄養繁殖性品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第29071号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. KGM192

3 登録品種の特性の概要

草姿は心止まり、茎のアントシアニンの着色は中、葉長は短、葉幅はかなり狭、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは小、葉の緑色の強さは中、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはかなり小、果径比（縦／横）は中、縦断面の果形はプラム形、果肩部のひだは無又は極弱、こうあ部のくぼみはかなり弱、へた落ちの大きさはかなり小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさは小、果肉の厚さはやや薄、子室数は2のみ、幼果期の果肩部の緑色是有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色は赤、果実の硬さはやや軟、開花の早晩は極早、成熟の早晩は極早である。

出願品種「KGM192」は、対照品種「レジナ」と比較して、縦断面の果形がプラム形であること、葉の上面の膨らみが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カゴメ株式会社

愛知県名古屋市中区錦三丁目14番15号

6 登録品種の育成をした者の氏名

浅野 聖 ト 滋慶

7 出願公表の年月日 令和元年8月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第29072号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. KGM194

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）は短、葉長は短、葉幅は狭、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは小、葉の緑色の強さは淡、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはかなり小、果径比（縦／横）は小、縦断面の果形はハート形、果肩部のひだは無又は極弱、こうあ部のくぼみはやや弱、へた落ちの大きさはかなり小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は無色、果実の心の大きさは小、果肉の厚さは薄、子室数は2又は3、幼果期の果肩部の緑色是有、幼果期の果色は中、完熟期の果色はオレンジ、完熟期の果肉色はオレンジ、果実の硬さは軟、開花の早晩はやや早、成熟の早晩はやや早である

出願品種「KGM194」は、対照品種「TTM059」と比較して、葉の緑色の強さが淡であること、果実表皮の色が無色であること、幼果期の果肩部の緑色の強さが極淡であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カゴメ株式会社

愛知県名古屋市中区錦三丁目14番15号

6 登録品種の育成をした者の氏名

ト 滋慶 市川 雅敏

7 出願公表の年月日 令和元年8月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29073号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Sutera Roth SUTZ0006

3 登録品種の特性の概要

草型は斜上型、草丈はやや高、茎の長さは短、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、節間長はやや短、葉型は単葉、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉柄の長さは短、葉身の表面の主な色は緑、葉身の斑の有無は無、花型は一重、花の長さは長、花の幅は広、花の主な色はNN155D、花冠裂片の先端の形は円形、花筒の長さは中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SUTZ0006」は、対照品種「ダングル14」と比較して、葉柄の長さが短であること、葉身の最大幅の位置が中央部と基部の間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Dick van Kleinwee

7 出願公表の年月日 平成31年2月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29074号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vaccinium L. 安曇野ブルー (アズミブルー)

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の大きさは中、樹姿は斜上、前年枝の色は赤褐、前年枝の長さはやや短、前年枝の節間長は中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の形は楕円、葉の先端部の形は鋭、葉の表面の色は緑、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る）は中、葉の周縁の型は全縁、花芽のアントシアニン着色の強弱は中、花序の長さはやや短、花冠の形はつぼ、花冠の色は白、花筒の大きさは中、花筒のアントシアニン着色の強弱は弱、花筒の稜の有無は有、果房の着生密度は中、未熟果の緑色の濃淡は中、果実の大きさは大、果実の縦断面の形は扁円、果柄痕の大きさは中、がくあいの形は円、がく片の向きは斜上、がく片の反り方は内曲、がくあいの直径はやや小、がくあいの深さは中、果粉の程度は強、果皮の色は濃青、果実の硬さは中、果肉の色は淡緑、糖度は高、酸度はやや高、着果習性は前年枝のみ、裂果性は少、ほう芽期は中、前年枝の開花始期は中、前年枝の果実の成熟期は中、収穫期間は長である。

出願品種「安曇野ブルー」は、対照品種「チャンドラー」と比較して、前年枝の色が赤褐であること、葉の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「Bluecrop」と比較して、がくあいの深さが中であること、果肉の色が淡緑であること等で区別性が認められる。対照品種「Coville」と比較して、果粉の程度が強であること、収穫期間が長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

布山満
長野県安曇野市三郷小倉3876-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

布山満

7 出願公表の年月日 平成31年1月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

「チャンドラー」の自然交雑実生である。

1 品種登録の番号及び年月日 第29075号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vicia faba L. 清水一寸 媛の房 (シミス イッスン ヒメノサ)

3 登録品種の特性の概要

伸育型は中間型、草丈は中、茎の数は中、茎のアントシアニンの着色の有無は有、葉の緑色の濃淡は中、小葉の長さは中、小葉の幅は中、小葉の最大幅の位置は中央部、花序の花の数はやや多、開花期は中、翼弁のメラニン斑点の有無は有、翼弁のメラニン斑点の色は黒、旗弁のアントシアニン着色の有無は有、さやの数は少、さやの長さはやや長、さやの幅は広、さやの緑色の濃淡はやや淡、さやの胚珠数はやや多、乾燥種子の重量は中、乾燥種子の種皮の色はベージュである。

出願品種「清水一寸 媛の房」は、対照品種「愛のそら」と比較して、さやの胚珠数がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種「清水一寸」と比較して、さやの長さがやや長であること、さやの胚珠数がやや多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山本文則

愛媛県松山市志津川町365番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

山本文則

7 出願公表の年月日 平成31年3月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

「清水一寸」の自殖後代系統から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第29076号 令和4年3月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Zantedeschia Spreng. 千葉C2号 (チバC2ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

落葉性は常緑性、草丈は高、葉柄の長さはやや長、葉柄の下部の色は黄緑、葉身の向きは斜上、葉身の長さはやや長、葉身の幅は狭～中、葉身の最大幅の位置は下位、葉身の裂片の有無は有、葉身の裂片の長さは極短、葉身の先端の形は鋭、葉身の緑色の濃淡は中、葉身の斑点の有無は無、葉の周縁の波打ちの強弱は弱、花茎の太さはやや細、花茎の赤色の強弱は無又は極弱、花茎の基部の斑点の明瞭度は無又は不明瞭、仏炎苞の高さは中、仏炎苞の長さは短～中、仏炎苞の幅は狭～中、仏炎苞の重なり部分の高さはかなり低、仏炎苞の先端の形は鋭形、仏炎苞の内面の主な色はNN155A、仏炎苞の基部から先端部へかけての色の変化は無又は極弱、仏炎苞ののど部の斑点の有無は無、仏炎苞の外面の主な色は白、肉穂花序の長さはかなり短、肉穂花序の幅はかなり狭、肉穂花序の主な色は黄橙である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「千葉C2号」は、対照品種「ウェディングマーチ」と比較して、葉身の幅が狭～中であること、仏炎苞の重なり部分の高さがかなり低であること等で区別性が認められる。対照品種「アクアホワイต์」と比較して、葉身の緑色の濃淡が中であること、仏炎苞の幅が狭～中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千葉県
千葉県千葉市中央区市場町1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

海老原克介 大坂龍

7 出願公表の年月日 令和元年10月1日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ウェディングマーチ」に「マジョリーホワイต์」を交配し、選抜したものである。