

2014 年 5 月

セドウム ブリト

Sedum Burrito

(*Sedum burrito* Moran)

(*Sedum morganianum* Walth.)

セドゥム ブリト審査基準

I. 審査基準の対象 (Subject of these Guidelines)

この審査基準は、ベンケイソウ科 (Crassulaceae) マンネングサ属 (*Sedum* L.) のブリト種 (*S. burrito* Moran) 及びモルガニアヌム種 (*S. morganianum* Walth.) の全ての品種に適用する。

II. 提出種苗 (Material Required)

- i) 種苗の形態 発根苗 (天芽挿し)
- ii) 提出時期 審査当局が指定する時期
- iii) 数量 30 個体
- iv) 提出する種苗は、重要な病害虫に汚染されていない十分に健全なものであること。
- v) 提出種苗は審査当局が指示した場合を除き薬剤、その他の処理をしていないものであること。もし、処理が行われている場合はその処理の詳細について記載すること。

III. 試験の実施 (Conduct of Tests)

- i) 栽培条件 特性の確認が十分にできる正常な生育が可能な条件下で実施する。
施設鉢栽培 (4 月挿し、無摘心)。
- ii) 最低供試個体数 20 個体
- iii) 栽培期間 1 生育周期 (挿し木後、8 ヶ月程度経過した時期までとする。)
- iv) 調査方法
調査個体数 特に指示がない限り、植物体 10 個体又は各個体から採取した部分 10 個とする。
均一性は供試した全ての個体で判定する。
調査時期等 特に指示がない限り、挿し木後、8 ヶ月程度経過した時期に一斉に行う。
- v) 特別な試験 特別な条件下でのみ発現する特性があり、出願者が申告し、方法等が十分に提示され、審査当局が合意した場合は特別な栽培試験を実施することがある。

IV. 判定基準 (Standards for Decisions)

判定は、登録出願品種審査要領の区別性、均一性及び安定性(DUS) 審査のための一般基準に基づくものとする。

供試個体数が 20 の場合、許容される異型個体数は 1 である。

V. グループ分けに使用する形質 (Grouping of Varieties)

- i) 葉の先端の形 (形質 8)

VI. 特性表で使用する記号の説明 (Legend)

G : グループ分けに使用する形質

QL : 質的形質

QN：量的形質

PQ：擬似の質的形質

(+)：Ⅷに特性表の説明図等を示す

MG：植物体あるいは植物体の一部を集団として測定記録

MS：植物体あるいは植物体の一部の個々の測定記録

VG：植物体あるいは植物体の一部を集団として観察記録

VS：植物体あるいは植物体の一部の個々の観察記録

網掛け（特性表のピンク色の部分）：願書に添付する説明書（種苗法施行規則第7条、別記様式第2号）に出願者が記載する特性及び階級値

状態区分

質的形質及び擬似の質的形質の場合、すべての状態が特性表に記載してある。しかし、5階級以上の状態がある量的形質の場合、省略した状態が用いられることがある。例えば、9階級の状態による量的形質の場合、審査基準の状態は、以下のとおりに略されることがある。

状態 (State)		階級 (Note)
(日本語)	(English)	
小	small	3
中	medium	5
大	large	7

しかし、以下の9階級の状態を品種の記述として使用できるが、その場合には適切に使用するよう留意する。

状態 (State)		階級 (Note)
(日本語)	(English)	
極小	very small	1
かなり小	very small to small	2
小	small	3
やや小	small to medium	4
中	medium	5
やや大	medium to large	6
大	large	7
かなり大	large to very large	8
極大	very large	9


VII. 特性表 (Table of Characteristics)

形質 番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
1		QN	茎の長さ	Stem: length	主茎の地際部から生長点 までの長さ	測定 cm MS	3 5 7	短 中 長	short medium long		
2		QN	茎の太さ	Stem: thickness	主茎の中間部の長径	測定 mm MS	3 5 7	細 中 太	thin medium thick	セドウム ブリト	
3		QN	葉の数	Stem: number of leaves	主茎の中間部 3cm 間の葉 数	測定 MS	3 5 7	少 中 多	few medium many	セドウム ブリト	
4		QN	葉の長さ	Leaf: length	主茎に着生する最大葉の 長さ	測定 mm MS	3 5 7	短 中 長	short medium long		
5		QN	葉の幅	Leaf: width	主茎に着生する最大葉の 幅	測定 mm MS	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad	セドウム ブリト	
6		QN	葉の厚さ	Leaf: thickness	主茎に着生する最大葉の 厚さ	測定 mm MS	3 5 7	薄 中 厚	thin medium thick	セドウム ブリト	
7		PQ	葉の形	Leaf: shape	主茎中間部に着生する成 葉の典型的な形	観察 VG	1 2 3	卵形 披針形 楕円形	ovate lanceolate elliptic	セドウム モルガ ニアヌム セドウム ブリト	


形質番号	UPOV No.	記号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査方法	階級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
8		PQ (+) G	葉の先端の形	Leaf: shape of apex	主茎中間部に着生する成葉先端の形	観察 VG	1 2 3	鋭形 鈍形 円形	acute obtuse rounded	セドウム モルガニアム セドウム ブリト	
9		PQ (+)	新葉の表面の色	Leaf: color on upper side of young leaf (immature leaf)	主茎上部に着生する新葉（展開葉）の表面の色	観察 VG	1 2 3 4 5	緑黄 黄緑 緑 濃緑 灰緑	green yellow yellow green medium green dark green gray green	セドウム ブリト	
10		PQ (+)	葉の表面の色	Leaf: color on upper side	主茎に着生する成葉の表面の色	観察 VG	1 2 3 4 5	緑黄 黄緑 緑 濃緑 灰緑	green yellow yellow green medium green dark green gray green	セドウム ブリト	

VIII. 特性表の説明 (Explanations on the Table of Characteristics)


形質 8 葉の先端の形 Char.8 Leaf: shape of apex



1
鋭形
acute



2
鈍形
obtuse



3
円形
rounded

形質 9 新葉の表面の色 Char.9 Leaf: color on upper side of young leaf

形質 10 葉の表面の色 Char.10 Leaf: color on upper side



新葉の表面の色

(主茎上部のある程度展開した新葉を表面の白粉を付けたまま観察)

葉の表面の色

(主茎中間部の成葉の代表的な色を表面の白粉を付けたまま観察)

状態区分の「灰緑」は、「緑」及び「濃緑」の葉が表面の白粉によって濁色となり、灰色がかって見えるもの。