

2017 年 3 月

TG/263/1 2010-03-24+2015-03-25 に準拠

フジウツギ属

Buddleja

(*Buddleja* L.)

フジウツギ属審査基準

I. 審査基準の対象 (Subject of these Guidelines)

この審査基準は、フジウツギ科 (Buddlejaceae) フジウツギ属 (*Buddleja* L.) の全ての品種に適用する。

II. 提出種苗 (Material Required)

- i) 種苗の形態 発根苗 (節挿し)
- ii) 提出時期 審査当局が指定する時期
- iii) 数量 10 個体
- iv) 提出する種苗は、重要な病害虫に汚染されていない十分に健全なものであること。
- v) 提出種苗は審査当局が指示した場合を除き薬剤、その他の処理をしていないものであること。もし、処理が行われている場合はその処理の詳細について記載すること。

III. 試験の実施 (Conduct of Tests)

- i) 栽培条件 特性の確認が十分にできる正常な生育が可能な条件下で実施する。
- ii) 最低供試個体数 7 個体
- iii) 栽培期間 1 生育周期 (定植後、翌年の開花盛期が終了する時期までとする)
- iv) 調査方法
 - 調査個体数 特に指示がない限り、植物体 6 個体又は各個体から採取した部分 6 個とする。
 - 均一性は供試した全ての個体で判定する。
 - 調査時期等 特に指示がない限り、開花盛期に行う。葉に関する形質の調査は、当年枝中間部に着生する最大葉について行う。
- v) 特別な試験 特別な条件下でのみ発現する特性があり、出願者が申告し、方法等が十分に提示され、審査当局が合意した場合は実施することがある。

IV. 判定基準 (Standards for Decisions)

判定は、登録出願品種審査要領の区別性、均一性及び安定性 (DUS) 審査のための一般基準に基づくものとする。

均一性については、栄養繁殖性品種の場合、供試個体数が 7 のとき、許容される異型個体数は 1 である。

V. グループ分けに使用する形質 (Grouping of Varieties)

- i) 葉身の斑の有無 (形質14)
- ii) 花序の形 (形質20)
- iii) 花冠裂片の表面の色 (形質32)

以下の区分による。

Gr.1: 白

Gr.2: 黄

Gr.3: 桃

Gr.4: 紫

Gr.5: 青

VI. 特性表で使用する記号の説明 (Legend)

G : グループ分けに使用する形質

(*) : 品種記載の国際調和のための必須調査形質

QL : 質的形質

QN : 量的形質

PQ : 擬似の質的形質

(+) : VIIIに特性表の説明図等を示す

MG : 植物体あるいは植物体の一部を集団として測定記録

MS : 植物体あるいは植物体の一部の個々の測定記録

VG : 植物体あるいは植物体の一部を集団として観察記録

VS : 植物体あるいは植物体の一部の個々の観察記録

網掛け (特性表のピンク色の部分) : 願書に添付する説明書 (種苗法施行規則第7条、別記様式第2号) に出願者が記載する特性及び階級値

状態区分

質的形質及び擬似の質的形質の場合、すべての状態が特性表に記載してある。しかし、5階級以上の状態がある量的形質の場合、省略した状態が用いられることがある。例えば、9階級の状態による量的形質の場合、審査基準の状態は、以下のとおりに略されることがある。

状態 (State)		階級 (Note)
(日本語)	(English)	
小	small	3
中	medium	5
大	large	7

しかし、以下の9階級の状態を品種の記述として使用できるが、その場合には適切に使用するよう留意する。

状態 (State)		階級 (Note)
(日本語)	(English)	
極小	very small	1
かなり小	very small to small	2
小	small	3
やや小	small to medium	4
中	medium	5
やや大	medium to large	6
大	large	7
かなり大	large to very large	8
極大	very large	9

VII. 特性表 (Table of Characteristics)

形質番号	UPOV No.	記号	形質 (Characteristics)		定義	調査方法	階級	状態 (State)		標準品種 (Ex. Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
1	1	PQ (*) (+)	樹姿	Plant: growth habit	株全体を側面からみた形状	観察 VG	1 2 3 4	直立 半直立 開張 下垂	upright semi upright spreading drooping		
2	2	QN (*)	樹高	Plant: height	株の地際から最頂部までの高さ	測定 cm MS	1 3 5 7 9	極低 低 中 高 極高	very short short medium tall very tall	ピンクデライト ホワイトプロフェーション	
3		QN	樹幅	Plant: width	株の最大幅	測定 cm MS	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad	ロイヤルレット	
4	3	QN	樹幅に対する樹高	Plant: height in relation to width	樹幅と比較した樹高	観察 VG	1 2 3	樹幅より高い 同等 樹幅より低い	taller than broad as tall as broad broader than tall		
5		QN	枝の長さ	Shoot: length	最長の当年枝の長さ(花序を除く。)	測定 cm MS	3 5 7	短 中 長	short medium long	ロイヤルレット	
6		QN	枝の太さ	Shoot: thickness	最長の当年枝の中間部の太さ	測定 mm MS	1 2 3	細 中 太	thin medium thick	ブラックナイト	

形質 番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
7	4	PQ (*)	枝の色	Shoot: color (pubescence excluded)	当年枝基部の色(毛の色を 除く。)	観察 VG	1 2 3	緑 褐 赤	green brownish reddish		
8	5	PQ	枝の横断面の形	Stem: shape in cross section	当年枝中間部の横断面の 形	観察 VG	1 2 3	円形又は弱い 角形 角形 強い角形	round or slightly angular moderately angular strongly angular		
9	6	QN (*)	枝の毛の粗密	Stem: pubescence	当年枝中間部の毛の粗密	観察 VG	1 3 5 7 9	無又は極粗 粗 中 密 極密	absent or very sparse sparse medium dense very dense	ナシホーブル ホワイトホーブル	
10	7	PQ (*) (+)	葉身の形	Leaf blade: shape	最大葉の葉身の形	観察 VG	1 2 3 4	披針形 狭卵形 卵形 心臓形	lanceolate narrow ovate medium ovate cordate		
11	8	QN	葉身の長さ	Leaf blade: length	最大葉の葉身の長さ	測定 cm MS	3 5 7	短 中 長	short medium long	ロイヤルレッド	
12	9	QN	葉身の幅	Leaf blade: width	最大葉の葉身の幅	測定 cm MS	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad	バタフライヘブン	

形質 番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
13	11	PQ (*)	葉身の表面の色	Leaf blade: color on upper side (excluding color of variegation)	葉身の表面の色(斑の色を除く。)	観察 VG		RHS カラーチャート色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
14	10	QL (*) (+) G	葉身の斑の有無	Leaf blade: variegation	葉身の表面の斑の有無	観察 VG	1 9	無 有	absent present	ブラックナイト ハーレクイン	
15	12	PQ (*)	葉身の斑の色	Leaf blade: color of variegation	葉身の表面の斑の主な色	観察 VG		RHS カラーチャート色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
16	13	PQ (*) (+)	葉身の周縁部の形	Leaf blade: margin	葉身の周縁部の形	観察 VG	1 2 3	全縁 歯状 波状	entire dentate sinuate	ブラックナイト	
17	14	QN	葉身の表面の毛の多少	Leaf blade: pubescence on upper side	葉身の表面の毛の多少	観察 VG	1 3 5 7 9	無又は極少 少 中 多 極多	absent or very weak weak medium strong very strong	ホワイトボール	
18	15	QL	葉身の裏面の毛の有無	Leaf blade: pubescence on lower side	葉身の裏面の毛の有無	観察 VG	1 9	無 有	absent present	ブラックナイト	

形質 番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
19	16	QN (*) (+)	葉身の葉脈間の 凹凸の強弱	Leaf blade: bulging between veins	葉身の葉脈間の凹凸(ふくれ)の強弱	観察 VG	1 3 5	無又は弱 中 強	absent or weak medium strong		
20	17	PQ (*) (+) G	花序の形	Inflorescence: shape	開花盛期(花序基部の小花がしおれ始めた時期)の花序の形	観察 VG	1 2 3	円錐形 円筒形 球形	conical cylindrical globular		
21	18	QN (*) (+)	花序の長さ	Inflorescence: length (excluding peduncle)	開花盛期における花序の長さ(花柄を除く。)	測定 cm MS	3 5 7	短 中 長	short medium long	バタフライヘブン ホワイトフロ ーション	
22	19	QN (*) (+)	花序の幅	Inflorescence: width	開花盛期における花序の最大幅	測定 cm MS	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad	バタフライヘブン	
23	20	QN (*) (+)	小花の粗密	Inflorescence: density of flowers	開花盛期における花序の小花の密度	観察 VG	3 5 7	粗 中 密	sparse medium dense		
24		QN (+)	がくの長さ	Calyx: length	がくの長さ	測定 mm MS	1 2 3	短 中 長	short medium long	ブラックナイト	
25	21	QN	がくの毛の多少	Calyx: pubescence	がくの毛の多少	観察 VG	1 2 3 4 5	無又は極少 少 中 多 極多	absent or very weak weak medium strong very strong	バタフライヘブン	

形質 番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
26	22	QN (+)	花筒の長さ	Corolla tube: length	花筒の長さ	測定 mm MS	1 2 3	短 中 長	short medium long	ブラックナイト ホワイトボール	
27		PQ (+)	花筒の外面の主な色	Corolla tube: main color of outer side	花筒の外面の主な色	観察 VG		RHS カラーチャート色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
28		QN (+)	花冠の直径	Corolla: diameter	花冠の直径	測定 mm MS	1 2 3	小 中 大	small medium large	ロイヤルレット [®]	
29	23	QN (+)	花冠裂片の向き	Corolla lobe: attitude at full flowering	小花の満開時の花冠裂片の向き	観察 VG	1 2 3	直立 半直立 水平	erect semi erect horizontal		
30	24	QN (+)	花冠裂片の重なり	Corolla lobe: arrangement	花冠裂片の重なり	観察 VG	1 2 3	離れる 接する 重なる	free touching overlapping		
31	25	QN (+)	花冠裂片の周縁部の切れ込みの深さ	Corolla lobe: incisions of margin	花冠裂片の周縁部の切れ込みの深さ	観察 VG	1 2 3	無又は浅 中 深	absent or shallow medium deep	ブラックナイト	
32	26	PQ (*) (+) G	花冠裂片の表面の色	Corolla lobe: color of inner side	花冠裂片の表面の色	観察 VG		RHS カラーチャート色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		

形質 番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
33	27	QL (*) (+)	花冠の目の有無	Corolla: presence of eye	花冠の目の有無(花筒部から花冠裂片の曲がりまで色があり、裂片の色と異なる場合を有りとする。)	観察 VG	1 9	無 有	absent present		
34	28	PQ (*) (+)	花冠の目の色	Corolla: color of eye	花冠の目の色(目が有る品種に限る。)	観察 VG	1 2 3	黄 橙 赤	yellow orange reddish		
35	29	QN (*)	開花始期	Time of beginning of flowering	花序基部のいくつかの小花が咲き始めた花序を持つ株が供試株の 50%を越えた時期の早晩	観察 月日 MG	3 5 7	早 中 晩	early medium late	バタフライヘブン	

VIII. 特性表の説明 (Explanations on the Table of Characteristics)

形質 1 樹姿 Char.1 Plant: growth habit



1
直立
upright



2
半直立
semi upright



3
開張
spreading



4
下垂
drooping

形質 10 葉身の形 Char.10 Leaf blade: shape



1
披針形
lanceolate



2
狭卵形
narrow ovate



3
卵形
medium ovate



4
心臟形
cordate

形質 14 葉身の斑の有無 Char.14 Leaf blade: variegation



1
無
absent



9
有
present

形質 16 葉身の周縁部の形 Char.16 Leaf blade: margin



1
全縁
entire



2
齒状
dentate



3
波状
sinuate

形質 19 葉身の葉脈間の凹凸の強弱 Char.19 Leaf blade: bulging between veins



1
無又は弱
absent or weak



3
中
medium



5
強
strong

形質 20 花序の形 Char.20 Inflorescence: shape



1
円錐形
conical




2
円筒形
cylindrical



3
球形
globular

形質 21 花序の長さ Char.21 Inflorescence: length (excluding peduncle)

形質 22 花序の幅 Char.22 Inflorescence: width



花序の長さ
Inflorescence: length

花序の下に第2花序が発生する場合があるが、
これは含まずに測定する。

花序の幅
Inflorescence: width

形質 23 小花の粗密 Char.23 Inflorescence: density of flowers



3
粗
sparse



5
中
medium




7
密
dense

形質 24 がくの長さ Char.24 Calyx: length


形質 28 花冠の直径 Char.28 Corolla: diameter

形質 31 花冠裂片の周縁部の切れ込みの深さ Char.31 Corolla lobe: incisions of margin



形質 26 花筒の長さ Char.26 Corolla tube: length

形質 27 花筒の外面の主な色 Char.27 Corolla tube: main color of outer side



形質 29 花冠裂片の向き

Char.29 Corolla lobe: attitude at full flowering



1
直立
erect




2
半直立
semi erect




3
水平
horizontal

形質 30 花冠裂片の重なり


Char.30 Corolla lobe: arrangement



1
離れる
free



2
接する
touching




3
重なる
overlapping

形質 32 花冠裂片の表面の色 Char.32 Corolla lobe: color of inner side

形質 33 花冠の目の有無 Char.33 Corolla: presence of eye

形質 34 花冠の目の色 Char.34 Corolla: color of eye



花冠の目
Corolla: eye

花冠裂片の表面の色
Corolla lobe: color of inner side

