

1 品種登録の番号及び年月日 第28707号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ananas comosus (L.) Merr. RED GOLD

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、着葉数は中、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉のとげの粗密は粗、塊茎芽の発生数は無又は極少、吸芽の発生数の中、えい芽の発生数は無又は極少、果実の形は卵形、果実の色は赤、果実の大きさは中、果肉の色は淡黄、果肉の硬さはやや硬、果汁の多少は中、果肉の酸味はやや低、果肉の甘味は中である。

出願品種「RED GOLD」は、対照品種「ハニーブライト」と比較して、葉のとげの有無が有であること、果実の色が赤であること等で区別性が認められる。対照品種「ジュリオスター」と比較して、葉のアントシアニンの着色が強であること、葉のとげの有無が有であること、果実の色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

DMPL MANAGEMENT SERVICES PTE LTD
17 Bukit Pasoh Road, Singapore

6 登録品種の育成をした者の氏名

Reynold B. Pimentel Arturo T. Aquino Dennis D. Gamutan

7 出願公表の年月日 平成26年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

「MD2」に「Morada」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28708号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ananas comosus (L.) Merr. RED DRAGON

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、着葉数は中、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉のとげの粗密は粗、塊茎芽の発生数は無又は極少、吸芽の発生数は中、えい芽の発生数はかなり少、果実の形は長円形、果実の色は赤、果実の大きさは小、果肉の色は淡黄、果肉の硬さはやや硬、果汁の多少は中、果肉の酸味は低、果肉の甘味は中である。

出願品種「RED DRAGON」は、対照品種「ハニーブライト」と比較して、葉のとげの有無が有であること、果実の色が赤であること等で区別性が認められる。対照品種「ジュリオスター」と比較して、葉のアントシアニンの着色が強であること、葉のとげの有無が有であること、果実の色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

DMPL MANAGEMENT SERVICES PTE LTD
17 Bukit Pasoh Road, Singapore

6 登録品種の育成をした者の氏名

Reynold B. Pimentel Arturo T. Aquino Dennis D. Gamutan

7 出願公表の年月日 平成26年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

「MD2」に「Morada」を交配し、選抜したものである

1 品種登録の番号及び年月日 第28709号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ananas comosus (L.) Merr. 沖農P19 (杧ノP19)

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、着葉数は中、葉の長さは長、葉の幅は中、葉のとげの粗密は粗、塊茎芽の発生数は無又は極少、吸芽の発生数は少、えい芽の発生数は多、果実の形は卵形、果実の色は黄、果実の大きさは中、果肉の色は黄白、果肉の硬さは軟、果汁の多少は中、果肉の酸味はやや低、果肉の甘味は高である。

出願品種「沖農P19」は、対照品種「N67-10」と比較して、えい芽の発生数が多いこと、果肉の色が黄白であること等で区別性が認められる。対照品種「沖農P17」と比較して、葉の長さが長であること、葉のとげの有無が有であること、えい芽の発生数が多いこと、果肉の色が黄白であること等で区別性が認められる。対照品種「サマーゴールド」と比較して、葉のとげの有無が有であること、果肉の色が黄白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県
沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

竹内誠人 正田守幸 諸見里知絵 大嶺悠太 與那覇至 栗國佳史 仲村昌剛
出花幸之介 武末翔馬 崎山澄寿

7 出願公表の年月日 令和2年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ゆがふ」に「ソフトタッチ」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28710号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. INARGLOLLY

3 登録品種の特性の概要

草型は丸型、草丈はかなり低、分枝の粗密はかなり密、茎のアントシアニン着色の有無は無、葉の長さはかなり短、葉の幅は狭、葉の形はⅢ型、葉の周縁の鋸歯の形は深鈍鋸歯、葉の周縁の鋸歯の粗密は粗、葉の表面の色は緑、葉片の長さは短、葉片の幅はかなり狭、花型は半八重、頭花の直径はかなり小、舌状花の数（一重品種を除く。）はかなり少、舌状花の形は広線形、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の色数は2、舌状花の表面の色の分布状態は斑点状（吹きかけ、砂子、かすり）、舌状花の表面の主な色は69D、舌状花の表面の複色の色（複色品種に限る。）は75C、花盤の直径（一重品種、半八重品種及び丁字状品種に限る。）はやや小、花盤の主な色（一重品種及び半八重品種に限る。）は黄茶、開花期（秋植）は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INARGLOLLY」は、対照品種「コブシング」と比較して、葉片の欠刻の深さがやや深であること、舌状花の表面の主な色が69Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ruth Elsen

7 出願公表の年月日 平成30年11月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者が所属する法人所有の育成系統に「Molimba S white」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28711号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. Bonmad 1498

3 登録品種の特性の概要

草型は丸型、草丈はやや低、分枝の粗密は中、茎のアントシアニン着色の有無は無、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の形はⅢ型、葉の周縁の鋸歯の形は深鈍鋸歯、葉の周縁の鋸歯の粗密はやや粗、葉の表面の色は緑、葉片の長さはやや短、葉片の幅はやや狭、花型は半八重、頭花の直径は小、舌状花の数（一重品種を除く。）はかなり少、舌状花の形は広線形、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の色数は2、舌状花の表面の色の分布状態は斑点状（吹きかけ、砂子、かすり）、舌状花の表面の主な色は2C、舌状花の表面の複色の色（複色品種に限る。）は51C、花盤の直径（一重品種、半八重品種及び丁字状品種に限る。）は中、花盤の主な色（一重品種及び半八重品種に限る。）は黄、開花期（秋植）はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Bonmad 1498」は、対照品種「H24-018レ」と比較して、舌状花の表面の主な色が2Cであること、花盤の複色の有無（一重品種及び半八重品種に限る。）が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bonza Botanicals Pty Limited

244 Singles Ridge Road, Yellow Rock, NSW 2777, Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andrew Bernuetz

7 出願公表の年月日 令和元年6月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしの放任受粉による自然交雑実生から、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28712号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Asparagus officinalis L. さぬきのめざめビオレッタ

3 登録品種の特性の概要

倍数性は四倍体、茎の数は中、ぎ葉の粗密は密、茎の長さは長、茎の第一分枝の着生節までの長さはやや長、茎の太さはやや太、若茎の頭部のアントシアニン着色の有無は有、萌芽始期はやや早、若茎の頭部のクロロフィル発現の強弱は弱、若茎の頭部の形は三角、若茎の中央径と比較した頭基部の大きさは同程度、若茎のりん片葉の着き方は密着、若茎のりん片葉の長さはかなり長、若茎のりん片葉の幅は中、開花始期はやや早、開花型は雌花・雄花開花株である。

出願品種「さぬきのめざめビオレッタ」は、対照品種「はるむらさきエフ」と比較して、ぎ葉の粗密が密であること、若茎のりん片葉の長さがかなり長であること等で区別性が認められる。対照品種「パープルタワー」と比較して、若茎のりん片葉の長さがかなり長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

香川県

香川県高松市番町四丁目1番10号

6 登録品種の育成をした者の氏名

池内隆夫

7 出願公表の年月日 平成29年9月12日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28713号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Auricularia polytricha (Mont.) Sacc. 青AK1号 (アオAK1ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸生長最適温度は26～28℃、菌叢裏面の色はかなり淡い、発生型は集中型、発生状態は孤生、子実体の乾燥歩留りは9～11%、菌さんの形態は盤状、縁の状態は褶曲形、菌さんの大きさは5～7cm、子実層面の生時の色は紫褐色、しわの有無は有、しわの量はかなり少、しわの形是不規則、しわの深さは2～3mm、子実層面の乾燥時の状態の色は紫褐色、非子実層面の生時の毛の有無は有、毛の色は灰白色、毛の密度は密、毛の質は繊毛状、子実体の肉質は硬である。

出願品種「青AK1号」は、対照品種「KX-AK12号」と比較して、生長速度30度がやや遅であること、菌叢表面の色がかなり淡いであること、菌叢裏面の色がかなり淡いであること等で区別性が認められる。対照品種「森89号」と比較して、生長速度30度がやや遅であること、菌叢の状態が綿毛状であること、非子実層面の生時のその他の特性が淡褐色であること、子実体の肉質が硬であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

地方独立行政法人青森県産業技術センター
青森県黒石市田中82番地9

6 登録品種の育成をした者の氏名

土屋慧

7 出願公表の年月日 令和2年6月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者保有の野生株どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28714号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. NNS-C-91

3 登録品種の特性の概要

茎の長さは極短、外葉の大きさ（ホワイトキャベツ品種に限る。）は中、外葉の形は円形、外葉の凸凹の強弱（ホワイトキャベツ及びレッドキャベツ品種に限る。）は中、外葉の色は緑、外葉の色の濃淡はやや濃、外葉のろう質の多少は中、外葉の周縁の波打ちの強弱はやや弱、球の形は横狭楕円形、球の基部の形は平形、球の高さはやや低、球の直径は広、球の最大幅の位置は中央部、球のかぶりは完全、被覆葉の色は緑、球の内部の色は帯白、球のしまりは緩、球内の芯の長さは長、収穫期（ホワイトキャベツ品種に限る。）はかなり早、裂球の早晩は晩である。

出願品種「NNS-C-91」は、対照品種「さつき女王」と比較して、外葉の大きさ（ホワイトキャベツ品種に限る。）が中であること、外葉のろう質の多少が中であること等で区別性が認められる。対照品種「秋蒔中早生3号」と比較して、外葉の凸凹の強弱（ホワイトキャベツ及びレッドキャベツ品種に限る。）が中であること、被覆葉のアントシアニン着色の強弱（ホワイトキャベツ及びサボイキャベツ品種に限る。）が極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社日本農林社
東京都北区滝野川6丁目6番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

近藤友宏 高下新二 宮崎俊夫

7 出願公表の年月日 平成30年5月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28715号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell. MKB-599

3 登録品種の特性の概要

倍数性は二倍体、草姿は中、葉の先端の反りの強弱は強、葉の緑色の濃淡は中、葉の型は裂縁、葉の裂片の数（裂葉品種に限る。）は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の周縁の鋸歯の強弱は弱、葉の長さはやや長、葉の幅は中、先端裂片の長さ（裂葉品種に限る。）はやや短、先端裂片の幅（裂葉品種に限る。）は中、葉の表面の毛じの粗密は中、葉のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、根の土中への吸い込みの深さは極深、根のコルク層の有無は無、根の抽根部の表皮の色は黄、根の抽根部の表皮の色の濃淡は中、根の地下部の表皮の色は黄、根の表皮の粗滑は中、根の肉色は黄、根肉の黄色の濃淡は濃、根肉内部のアントシアニン着色の有無は無、根の縦断面の形は円形、根の長さは短、根の直径はやや小、根の最大径の位置は中央部、根の主軸の曲がりの有無は無、根の基部の形は平、根の端部の形は円、収穫期は中である。

出願品種「MKB-599」は、対照品種「ゴールド」と比較して、葉の長さがやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「Jaune Boule d'Or」と比較して、葉の周縁の波打ちの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

丸種株式会社

京都府京都市下京区七条通新町西入夷之町693番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

酒井一浩

7 出願公表の年月日 平成30年2月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者がヨーロッパから入手した品種名不詳の在来系統から集団選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28716号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. FICHRYAFTORA

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、草型は叢生、草姿（叢生品種に限る）は半球、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さは極短、葉の幅はかなり狭、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さは浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN172A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は163C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性は中、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FICHRYAFTORA」は、対照品種「ブラントロピック」と比較して、葉の一次欠刻の深さが浅であること、舌状花の表面の主な色がN172Aであること、各開花習性における早晩性が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ヨダトラ」と比較して、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がやや凹であること、舌状花の先端の形が歯状であること、舌状花の表面の主な色がN172Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B.V.
Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Wain

7 出願公表の年月日 平成30年5月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28717号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. FICHRYEVENWHI

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり低、草型は叢生、草姿（叢生品種に限る）は半球、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さは極短、葉の幅はかなり狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C;145D(基部)、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや晩、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FICHRYEVENWHI」は、対照品種「スノーボール」と比較して、草姿（叢生品種に限る）が半球であること、たく葉の大きさが無又は極小であること、葉の一次欠刻の深さが浅であること等で区別性が認められる。対照品種「BLFROSTY YOIGLOO」と比較して、葉の一次欠刻の深さが浅であること、株当たりの頭花の総数（叢生品種に限る）がやや多であること、各開花習性における早晚性がやや晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B.V.

Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Wain

7 出願公表の年月日 平成30年5月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28718号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精つきがさ (セイツカガサ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は4A、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精つきがさ」は、対照品種「ゆみまどか」と比較して、舌状花の縦断面の形状が外反であること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）が窪むであること等で区別性が認められる。対照品種「レミダス」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数が多いこと、舌状花の先端の形が丸であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成30年5月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の黄色系一重咲きの育成系統に同色系混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28719号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精あやすぎ (セイヤスキ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は71B、舌状花の表面の二次色はNN155B、舌状花の表面の二次色の分布は基部、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は75C;70B(中央部の縦線)、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精あやすぎ」は、対照品種「きのかりん」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さがやや深であること、舌状花の縦断面の形状が外反であること等で区別性が認められる。対照品種「精あさえ」と比較して、葉の基部の形が円形であること、葉の周縁の二次欠刻の深さがやや深であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成30年5月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の紅色系一重咲きの育成系統に同色系混合花粉を交配し、選抜したものであ

1 品種登録の番号及び年月日 第28720号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀芳一力 (シュウホウイチリキ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はやや多、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀芳一力」は、対照品種「精興飛翔」と比較して、葉柄の葉長に対する長さが長であること等で区別性が認められる。対照品種「秀芳の杜」と比較して、葉柄の葉長に対する長さが長であること、舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が強であること等で区別性が認められる。対照品種「みなみの望み」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さがやや短であること、葉の基部の形が平形であること、舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）が先端部から3/4までであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成30年6月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の白色系輪ギクの育成系統に同色系輪ギクの混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28721号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精興北雲2 (セイコウホクウン2)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は平行、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）はやや大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形は管状、舌状花の花筒の長さは長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは極長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はやや多、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精興北雲2」は、対照品種「精興北雲」と比較して、舌状花の長さが極長であること等で区別性が認められる。対照品種「秀芳一力」と比較して、頭花の舌状花の形の数2であること、舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成30年10月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

「精興北雲」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28722号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精興光陽 (セイコウヨウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形は船底状、頭花の舌状花の二次的な形は管状、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は6C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2は11週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は多、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精興光陽」は、対照品種「笑の杜」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、葉の表面の光沢の強弱が弱であること、舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「笑の輝」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、舌状花の花筒の長さが極長であること等で区別性が認められる。対照品種「精興金栄」と比較して、葉の表面の緑色の濃淡が中であること、舌状花の花筒の長さが極長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成30年10月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の黄色系八重咲きの育成系統に白色系の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28723号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精興鶴頂 (セイウカチョウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）はやや大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはかなり長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は無又は極少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精興鶴頂」は、対照品種「みなみの望み」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること、舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）が基部から1/2までであること等で区別性が認められる。対照品種「秀芳一力」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さがやや長であること、葉の基部の形が凹形であること、舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「精興飛翔」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さがやや長であること、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鶴飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成30年7月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の白色系八重咲きの育成系統に同色系の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28724号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイブルックス

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の直径（摘らいしたもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面の二次色は145D、舌状花の表面の二次色の分布は先端、舌状花の表面の二次色の型はぼかし、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155D;144D(先端)、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイブルックス」は、対照品種「フィーリング ホワイト」と比較して、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）がやや小であること、花序の側枝の頭花の向き（叢生でない品種に限る）が上であること、舌状花の裏面の色がNN155D;144D(先端)であること等で区別性が認められる。対照品種「DLFOLGNE」と比較して、頭花の花柄の長さがやや長であること、舌状花の裏面の色がNN155D;144D(先端)であること等で区別性が認められる。対照品種「セイミノザ」と比較して、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること、舌状花の裏面の色がNN155D;144D(先端)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成30年10月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の白色系デコラ咲きの育成系統にポンポン咲き系統とデコラ咲き系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28725号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイカーク

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の直径（摘らいしたもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は5B、舌状花の表面の二次色は144D、舌状花の表面の二次色の分布は先端、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は5C;144C（先端;基部）、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイカーク」は、対照品種「DELIPOP UP YELLOW」と比較して、頭花の舌状花の主要な形が舌状であること、舌状花の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。対照品種「DELOIR」と比較して、舌状花の先端の形が丸であること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）が斜下であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成30年10月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の白色系ポンポン咲きの育成系統にポンポン咲き系統とデコラ咲き系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28726号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイカブレラ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の直径（摘らいしたもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は75C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は中、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイカブレラ」は、対照品種「DLFBONB3」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が69Dであること、舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が75C;69D(中央部の縦線)であること等で区別性が認められる。対照品種「DLFSHAB3」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、葉の幅がやや広であること、舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が75C;69D(中央部の縦線)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成30年10月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の赤色系ポンポン咲きの育成系統にポンポン咲き系統とデコラ咲き系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28727号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイグレアム

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや大、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の直径（摘らいしたもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN45A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN34C;154D(基部)、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイグレアム」は、対照品種「DLFMAGNA」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること、葉の基部の形が鈍形であること、頭花の直径（摘らいしていないもの）が小であること等で区別性が認められる。対照品種「DELICROIX」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さが短であること、葉の周縁の二次欠刻の深さがやや浅であること、頭花の花柄の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鶴飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成30年10月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の赤色系ポンポン咲きの育成系統にポンポン咲き系統とデコラ咲き系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28728号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイレヴィ

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の直径（摘らいしたもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は145C、舌状花の表面の二次色は145A、舌状花の表面の二次色の分布は先端部1/4、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は145C;144C(先端部)、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイレヴィ」は、対照品種「Renzotec」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が外巻きであること等で区別性が認められる。対照品種「セイピアース」と比較して、葉の一次欠刻の深さが中であること、葉の基部の形が凹形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成30年10月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の白色系ポンポン咲きの育成系統にポンポン咲き系統とデコラ咲き系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28729号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイグリスター

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや大、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は大、頭花の直径（摘らいしたもの）はやや大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は管状、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは極長、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は極高、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は45C、舌状花の表面の二次色は2A、舌状花の表面の二次色の分布は基部、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は162D;179D(先端部)、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はやや少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜上である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイグリスター」は、対照品種「ザンムネロ」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、葉柄の葉長に対する長さがやや長であること、舌状花の裏面の色が162D;179D(先端部)であること等で区別性が認められる。対照品種「DLFCHIS13」と比較して、舌状花の裏面の色が162D;179D(先端部)であること、舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が160Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成30年10月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の茶色系管物八重咲きの育成系統にスパイダー咲きの混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28730号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DEKALJONKA DARK

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）は大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形は船底状、舌状花の花筒の長さは中、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは極長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は76C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は76D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DEKALJONKA DARK」は、対照品種「DEKALJONKA」と比較して、舌状花の表面の主な色が76Cであること等で区別性が認められる。対照品種「DELIROSSANO DARK」と比較して、頭花の直径（摘らいたもの）が大であること、舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）が先端部から1/2までであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デュメンオレンジジャパン株式会社
静岡県浜松市中区板屋町110番地の5

6 登録品種の育成をした者の氏名

C. W. Dekker

7 出願公表の年月日 平成30年9月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

「DEKALJONKA」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28731号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀そのか (シュウソカ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は71C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は75B;72B(中央部の縦線)、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀そのか」は、対照品種「精ちはる」と比較して、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）が小であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が10週間であること等で区別性が認められる。対照品種「太陽のあさひ」と比較して、花らしい外面の色がN79Cであること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が10週間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成30年9月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の赤色系スプレーギクの系統に同色系スプレーギクの混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28732号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. シューアロマ

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は60A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は70A、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シューアロマ」は、対照品種「DELIBISCARI」と比較して、花序の側枝の頭花の向き（叢生でない品種に限る）が斜上であること、花盤の開やく時の色（デージー型の品種に限る）が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「秀あずまや」と比較して、たく葉の大きさが中であること、葉柄の葉長に対する長さがやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一

広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成30年9月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の赤色系スプレーギクの系統に同色系スプレーギクの混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28733号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. シューファンシル

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度

（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は2C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は2D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シューファンシル」は、対照品種「レサイバーイエロー」と比較して、たく葉の大きさが小であること、頭花の直径（摘らいしていないもの）が中であること、舌状花の表面の主な色が2Cであること等で区別性が認められる。対照品種「太陽のレモンフリップ」と比較して、葉の長さがやや長であること、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）がやや斜上であること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）が強い円錐状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一

広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成30年10月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の黄色系スプレーギクの系統にスプレーギクの混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28734号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. シューエルフ

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シューエルフ」は、対照品種「Fitecyn」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さがやや深であること、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）が中であること、舌状花の表面の状態がキールであること等で区別性が認められる。対照品種「太陽のマライカ」と比較して、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）が中であること、舌状花の表面の状態がキールであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成30年10月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の白色系スプレーギクの系統に同色系スプレーギクの混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28735号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFTAZA12

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたしたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は管状、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは長、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はかなり高、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は84C、舌状花の表面の二次色はNN155B、舌状花の表面の二次色の分布は先端、基部、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN75A;150D(先端)、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は中、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFTAZA12」は、対照品種「DLFINN3」と比較して、たく葉の大きさが中であること、舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が75C;150D(先端部);186A(先端)であること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）が水平であること等で区別性が認められる。対照品種「DLFTAZA10」と比較して、舌状花の裏面の色がN75A;150D(先端)であること、舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が75C;150D(先端部);186A(先端)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成30年12月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

「DLFTAZA10」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28736号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFJAM3

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は69C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は69C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFJAM3」は、対照品種「DAPITEC」と比較して、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）が少であること、舌状花の表面の主な色が69Cであること等で区別性が認められる。対照品種「PICATEC」と比較して、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）が少であること、舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が69B;75B(先端部)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成30年12月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28737号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFHED3

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は管状、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは中、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅はかなり高、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は70B、舌状花の表面の二次色はNN155B、舌状花の表面の二次色の分布は先端部1/2、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は75B;155A(先端部);144D(先端)、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜上である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFHED3」は、対照品種「DLFINN3」と比較して、葉の長さが長であること、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、舌状花の裏面の色が75B;155A(先端部);144D(先端)であること等で区別性が認められる。対照品種「シズル」と比較して、たく葉の大きさが小であること、頭花の直径（摘らいしていないもの）が中であること、頭花の舌状花の主要な形が管状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成30年12月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28738号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFRITU2

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）はやや大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはかなり長、舌状花の幅はやや広、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は5C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は中、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFRITU2」は、対照品種「寄の映月」と比較して、草丈がかなり高であること、葉の基部の形が円形であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること等で区別性が認められる。対照品種「みさきの里」と比較して、草丈がかなり高であること、頭花の直径（摘らいたもの）がやや大であること、舌状花の長さ／幅がやや低であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成30年12月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28739号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFLUME1

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155D、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は中、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFLUME1」は、対照品種「セイプールボール」と比較して、葉の一次欠刻の深さが深であること、葉の周縁の二次欠刻の深さがやや深であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が外巻きであること等で区別性が認められる。対照品種「DELIMAGGI」と比較して、たく葉の大きさが中であること、葉の裂片縁部の重なりが接するであること、舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）が先端部から3/4までであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成30年12月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28740号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFVIBE2

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は3C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFVIBE2」は、対照品種「太陽のマイキ」と比較して、舌状花の長さが中であること、花盤の開やく時の色（デージー型の品種に限る）が黄緑であること等で区別性が認められる。対照品種「レミダス」と比較して、葉の一次欠刻の深さが中であること、花盤の開やく時の色（デージー型の品種に限る）が黄緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成30年12月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28741号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFSEDK10

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はアネモネ、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は75B、舌状花の表面の二次色は59A、舌状花の表面の二次色の分布2は至る所、舌状花の表面の二次色の型は斑点及び条、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN74D;75C(至る所)、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）は154C、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）は69C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFSEDK10」は、対照品種「DLFSERE10」と比較して、舌状花の表面の主な色が75Bであること、管状花の色（アネモネ型の品種に限る）が69D;59B(二次色)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成30年12月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

「DLFSERE10」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28742号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFROSL10

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は2、頭花の舌状花の主要な形は船底状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の花筒の長さは中、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色はNN155B、舌状花の表面の二次色は145B、舌状花の表面の二次色の分布は先端、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性

（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155B;145A(先端)、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はやや少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFROSL10」は、対照品種「ZEMBLA LIME」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること、舌状花の表面の二次色の分布が先端であること、舌状花の裏面の色がNN155B;145A(先端)であること等で区別性が認められる。対照品種

「DLFLAIK1」と比較して、草丈が中であること、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること、舌状花の縦断面の形状が内曲であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成30年12月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

「DELIROSSANO」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28743号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFVAN3

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は65D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は69C;157D(基部)、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFVAN3」は、対照品種「DLFOSIT」と比較して、葉の長さがやや短であること、花序の形（叢生でない品種に限る）が散房花序型であること等で区別性が認められる。対照品種「セイオーマン」と比較して、葉の長さがやや短であること、舌状花の先端の形が尖るであること、舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が73C;160D(先端)であること等で区別性が認められる。対照品種

「DELIBALTICA PINK」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がわずかに凹であること、舌状花の裏面の色が69C;157D(基部)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成30年12月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

「DLFVAN9」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28744号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFVAN2

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は2D;69C（縁部）、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFVAN2」は、対照品種「ユーロベル イエロー」と比較して、葉の長さがやや短であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がやや凹であること等で区別性が認められる。対照品種「DEKZEHNIA YELLOW」と比較して、葉の長さがやや短であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がやや凹であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成30年12月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

「DLFVAN9」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28745号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFCARA1

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFCARA1」は、対照品種「Fitecyn」と比較して、たく葉の大きさが小であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が強い円錐状であること等で区別性が認められる。対照品種「太陽のシャングリラ」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数が中であること、花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）が黄緑であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が10週間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成30年12月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28746号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFMIP7

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は60B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は70B;NN155C(基部)、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はやや少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFMIP7」は、対照品種「フィロリポップ パープル」と比較して、舌状花の縦断面の形状が外反であること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）が斜下であること等で区別性が認められる。対照品種「セイコーミラージュ」と比較して、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること、舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が60Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成30年12月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28747号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFCHL05

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は144C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は144C、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFCHL05」は、対照品種「Feeling Green Dark」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、葉の表面の緑色の濃淡がやや淡であること、葉の周縁の二次欠刻の深さがやや深であること等で区別性が認められる。対照品種「DELIOLIVE」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さが中であること、葉の表面の緑色の濃淡がやや淡であること、葉の周縁の二次欠刻の深さがやや深であること等で区別性が認められる。対照品種「FISCOUNTRY」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、葉の周縁の二次欠刻の深さがやや深であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成30年12月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28748号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFTONN2

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはかなり長、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は極多、頭花の舌状花の形の数はいくつかあり、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は5A、舌状花の表面の二次色は144C、舌状花の表面の二次色の分布は基部、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は4B;144B(基部)、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFTONN2」は、対照品種「Yes Holic」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、舌状花の幅がかなり狭であること、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）が大であること等で区別性が認められる。対照品種「DELIVICENTE」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）が極多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成30年12月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28749号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFBAMB3

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数はいくつか、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は76B、舌状花の表面の二次色はNN155B、舌状花の表面の二次色の分布は基部、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は76C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFBAMB3」は、対照品種「セイノトピンク」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）が緑であること等で区別性が認められる。対照品種「TMウリズン」と比較して、舌状花の表面の主な色が76Bであること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が7週間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成30年12月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28750号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DLFROSSD5

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形は船底状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は75C、舌状花の表面の二次色は145B、舌状花の表面の二次色の分布は先端、舌状花の表面の二次色の型はばかし、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は69C;144C(先端部)、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はやや少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DLFROSSD5」は、対照品種「DLFROSS5」と比較して、舌状花の表面の主な色が75Cであること等で区別性が認められる。対照品種「DELIROSSANO DARK」と比較して、舌状花の表面の色数が2であること、舌状花の裏面の色が69C;144C(先端部)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成30年12月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Delirossano」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28751号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ゆみの白つき (ユミノシロツキ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ゆみの白つき」は、対照品種「秀いかり」と比較して、たく葉の大きさが小であること、舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）が中であること、舌状花の先端の形が丸であること等で区別性が認められる。対照品種「シュースカッシュ」と比較して、たく葉の大きさが小であること、葉の一次欠刻の深さがやや深であること、葉の周縁の二次欠刻の深さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

弓戸春之
広島県福山市新市町常2-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

弓戸春之

7 出願公表の年月日 平成31年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ゆみの白さぎ」の自然交雑実生から、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28752号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. シューエレガント

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）はやや大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は管状、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは極長、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はやや少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜上である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シューエレガント」は、対照品種「渥美の渚」と比較して、たく葉の大きさが小であること、葉の長さがやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「アナスタシア」と比較して、舌状花の縦断面の形状が外反であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が7.5週間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一

広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成31年3月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

「翠心」に白色系輪ギクの混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28753号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀芳歓声 (シュホウカンセイ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）はやや大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形は船底状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはかなり長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は71B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は70B:NN155A(基部)、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性は早、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀芳歓声」は、対照品種「太陽の紅珊瑚」と比較して、葉の基部の形が円形であること、頭花の舌状花の形の数2であること等で区別性が認められる。対照品種「精興天狗」と比較して、葉の基部の形が円形であること、葉の周縁の二次欠刻の数が多いこと、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成31年3月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の赤色系輪ギク育成系統に赤色系輪ギクの混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28754号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀わだつみ (シュワダツミ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面の二次色は145B、舌状花の表面の二次色の分布は基部、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性

（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀わだつみ」は、対照品種「精しょうま」と比較して、葉の基部の形が円形であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がわずかに凹であること等で区別性が認められる。対照品種「ゆみの白さぎ」と比較して、葉の基部の形が円形であること、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）が8週間であること等で区別性が認められる。対照品種「秀いかり」と比較して、葉の基部の形が円形であること、舌状花の先端の形が丸であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成31年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「秀いずもり」に白色系小菊の混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28755号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DEKSOFTONE

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや広、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は69D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は69D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DEKSOFTONE」は、対照品種「太陽のレティシア」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数やや少であること、舌状花の先端の形が突起状であること等で区別性が認められる。対照品種「セイヨランダ」と比較して、葉の基部の形が鈍形であること、葉の表面の緑色の濃淡がやや淡であること、舌状花の先端の形が突起状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デュメンオレンジジャパン株式会社
静岡県浜松市中区板屋町110番地の5

6 登録品種の育成をした者の氏名

C. W. Dekker

7 出願公表の年月日 平成31年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者が所属する法人所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28756号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DEKWHATSAPP

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや大、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は144B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は144B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DEKWHATSAPP」は、対照品種「セイフーバー」と比較して、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）が強い凹であること等で区別性が認められる。対照品種「Feeling Green Dark」と比較して、たく葉の大きさが小であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）が強い凹であること等で区別性が認められる。対照品種「FISCOUNTRY」と比較して、たく葉の大きさが小であること、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）が強い凹であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デュメンオレンジジャパン株式会社
静岡県浜松市中区板屋町110番地の5

6 登録品種の育成をした者の氏名

C. W. Dekker

7 出願公表の年月日 平成31年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者が所属する法人所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28757号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精べにぞめ (セイベニゾメ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は71A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は70A、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晩性は極晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精べにぞめ」は、対照品種「精はやま」と比較して、葉の基部の形が円形であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い内巻きであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 平成31年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のピンク色系の一重咲き育成系統に同系色混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28758号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. SKE140-3145

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は76C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は69D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SKE140-3145」は、対照品種「シューフエアリー」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がやや凹であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が内巻きであること等で区別性が認められる。対照品種「セイエルチェ」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）がややドーム状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 令和元年6月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のピンク色系の一重咲き系統に同色系混合花粉を交配し、選抜したものであ

1 品種登録の番号及び年月日 第28759号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイダロカレモン

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや広、舌状花の長さ／幅はかなり低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は1D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は150D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイダロカレモン」は、対照品種「セイマンロー」と比較して、たく葉の大きさが中であること、葉の基部の形が凹形であること、花らしい外面の色が8Bであること等で区別性が認められる。対照品種「セイオプティ」と比較して、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること、舌状花の表面の主な色が1Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹 出口英二

7 出願公表の年月日 平成31年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

「セイダロカ」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28760号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイムーラホワイト

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは中、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイムーラホワイト」は、対照品種「セイエーゲ」と比較して、舌状花の幅が狭であること、舌状花の長さ／幅が中であること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）がややドーム状であること等で区別性が認められる。対照品種「セイイレルダ」と比較して、葉柄の葉長に対する長さがやや短であること、舌状花の幅が狭であること、舌状花の長さ／幅が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹 菅沼喜代彦

7 出願公表の年月日 平成31年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

「セイムーラ」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28761号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイフレイ

3 登録品種の特性の概要

草丈は極高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや大、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイフレイ」は、対照品種「セイパレット」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数が極多であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること、花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）が淡黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 令和元年5月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の白色系一重咲き育成系統に同色系混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28762号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀りりか (シュリリカ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形は2、頭花の舌状花の主要な形は舌状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はかなり斜上、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は71B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は77C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晩性はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀りりか」は、対照品種「精はやま」と比較して、葉の基部の形が円形であること、花らしい外面の色がN79Cであること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が外巻きであること等で区別性が認められる。対照品種「かれん」と比較して、舌状花の縦断面の形状が外反であること、舌状花の先端の形が丸であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 令和元年8月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の赤色系小ギクの育成系統に赤色系小ギクの混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28763号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀ふゆみ (シュフユミ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形は舌状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは中、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は70B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN74C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、開花習性は12月～2月咲き（冬）、各開花習性における早晩性は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀ふゆみ」は、対照品種「精紅いずみ」と比較して、頭花の舌状花の形の数2であること、舌状花の表面の主な色が70Bであること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）がやや円錐状であること等で区別性が認められる。対照品種「夢あかり」と比較して、頭花の舌状花の主要な形が舌状であること、舌状花の表面の主な色が70Bであること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）がやや円錐状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 令和元年10月1日

8 登録品種の育成の経過の概要

「夢くじゃく」に育成者所有の赤色系小ギクの混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28764号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. シューインパクト

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、開花習性は12月～2月咲き（冬）、各開花習性における早晩性はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シューインパクト」は、対照品種「セイビエール」と比較して、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）がかなり少であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がやや凹であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が平（巻かない）であること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）がやや円錐状であること等で区別性が認められる。対照品種「雪かもめ」と比較して、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）がかなり少であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がやや凹であること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）がやや円錐状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一

広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 令和元年10月1日

8 登録品種の育成の経過の概要

「パルム」に育成者所有のスプレーギクの混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28765号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精ふゆこだち (セイユコダチ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は5B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は12月～2月咲き（冬）、各開花習性における早晩性は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精ふゆこだち」は、対照品種「精冬こうしょう」と比較して、たく葉の大きさが中であること、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）が少であること、舌状花の先端の形が突起状であること等で区別性が認められる。対照品種「セイカルト」と比較して、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が平（巻かない）であること、舌状花の長さが短であること、舌状花の表面の主な色が6Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の黄色系一重咲き育成系統に同色系混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28766号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精はるまち (セイハルマチ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は6C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、開花習性は12月～2月咲き（冬）、各開花習性における早晚性は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精はるまち」は、対照品種「精かしわざ」と比較して、花らいの外面の色が12Aであること、舌状花の表面の主な色が6Aであること等で区別性が認められる。対照品種「精冬こうしょう」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数が多いこと、花らいの外面の色が12Aであること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）が強い円錐状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮口徹

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の黄色系の一重咲き育成系統に同色系混合花粉を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28767号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cornus L. SFCG1702

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立性、樹高は高、枝の太さは中、新梢の色は緑、枝の色は褐、分枝性は中、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は鋭尖形、葉基部の形は円形、葉縁の波打ちは有、葉身長はやや長、葉身幅は中、新葉の色は緑、紅（主な色：紅、先端側：緑）、成葉表面の色は緑、成葉裏面の色は灰緑、秋季の葉色は紅、斑の有無は無、葉表面の毛は中、葉裏面の毛は中、葉柄の長さは中、葉柄の色は緑、花序のタイプは頭状花序、花序の向きは上向き、花序の大きさは中、総苞を含む花序の大きさはかなり大、小花の大きさは中、小花の色は緑黄、総苞のタイプは一重咲、総苞の重なりは重ならない、総苞の開き方は水平、総苞の反り方は水平、総苞のねじれは無、総苞全体の形は倒卵形、総苞片の長さは長、総苞片の幅はやや広、総苞片の色は54A、模様の有無は有、模様のタイプは基部分別色、模様の色は155A、花柄の太さは中、花柄の長さは短、花の香りは有、到花樹令の早晩は早、花つきの多少は中、開花性は一季咲、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SFCG1702」は、対照品種「ジュニアミス」と比較して、総苞を含む花序の大きさがかなり大であること、総苞片の色が54Aであること等で区別性が認められる。対照品種「チェロキーチーフ」と比較して、総苞を含む花序の大きさがかなり大であること、模様の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「ホワイトラブ」と比較して、総苞片の色が54Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

住友林業株式会社
東京都千代田区大手町一丁目3番2号
株式会社角田園
愛知県稲沢市平和町下三宅郷内174番地
住友林業緑化株式会社
東京都中野区中央一丁目38番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

角田肇康

7 出願公表の年月日 平成30年1月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ホワイトラブ」の自然交雑実生から、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28768号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. ミヨダリインペHDK

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈は極高、茎の色は緑、葉の型は主に2回羽状複葉、葉軸の翼の強弱は無又は弱、葉の色は淡緑、小葉の形は楕円形、小葉の長さは短、小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）はやや多、花柄の長さはかなり長、頭花の向きは半直立、頭花の型は半八重、頭花の花盤の型（一重品種及び半八重品種に限る。）はデージー型、頭花の直径はやや小、頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）はやや少、舌状花の長さはやや短、舌状花の中間部の横断面の形は弱く内曲、舌状花の先端の形は歯状、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は155C、舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）はぼかしである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミヨダリインペHDK」は、対照品種「ミヨダリオレンジシャーベット」と比較して、頭花の型が半八重であること、舌状花の先端の形が歯状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

天野良紀 鹿毛哲郎

7 出願公表の年月日 令和元年6月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28769号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. ミヨダリインペHSL

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は高、茎の色は赤褐又は紫を帯びた緑、葉の型は主に2回羽状複葉、葉軸の翼の強弱は無又は弱、葉の色は緑、小葉の形は楕円形、小葉の長さはかなり短、小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）は少、花柄の長さは極長、頭花の向きは水平、頭花の型は一重、頭花の花盤の型（一重品種及び半八重品種に限る。）はデイジー型、頭花の直径はかなり大、頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）は極少、舌状花の長さはやや長、舌状花の中間部の横断面の形は弱く外曲、舌状花の先端の形は乳頭状、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色はN45A、舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）は不明瞭な条である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミヨダリインペHSL」は、対照品種「ミヨダリガーネット」と比較して、頭花の型が一重であること、舌状花の表面の主な色がN45Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ミヨダリインペKCA」と比較して、頭花の直径がかなり大であること、舌状花の表面の主な色がN45Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ

東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

天野良紀 鹿毛哲郎

7 出願公表の年月日 令和元年6月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28770号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Digitalis L. TAKFOROIV

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、株幅はやや広、花茎の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の形はへら形、葉縁の形は鋸歯状、花序の長さはかなり長、花序の幅は中、花序の花の粗密はやや粗、花柄の長さはやや短、花の向きは外向き、花の長さはやや短、花冠の縦径はかなり大、花冠の横径は中、花筒の縦径はやや大、花筒の横径は中、下唇弁の中央裂片の長さは長、花冠の外面上部の主な色は186C、花冠の内面下部の主な色はN155D、花冠の内面下部の二次色の模様は花冠先端部、花冠の内面下部の二次色は72C、花冠の内面下部の三次色の模様は斑点、花冠の内面下部の三次色は59A、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TAKFOROIV」は、対照品種「Berrycanary」と比較して、花冠の横径が中であること、花冠の内面下部の二次色が72Cであること等で区別性が認められる。対照品種「DG09-4」と比較して、葉の幅がやや広であること、下唇弁の中央裂片の長さが長であること、花冠の内面下部の二次色が72Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Takii Europe B.V.

Hoofdweg 19, 1424PC De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martinus Willem van der Sar

7 出願公表の年月日 平成31年2月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28771号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch EURZ0014

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数はやや少、樹高はやや低、茎の中間部の緑色の濃淡は中、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は中、葉身の表面の主脈の色は緑のみ、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さはやや短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、部分着色葉の数はやや少、完全着色葉の数は少、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数は中、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）はやや短、最大ほうの幅は中、最大ほうの形は楕円形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は150D、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は150D、ほうの主脈の巻き込みの有無は無、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は弱、集散花序の幅はやや狭、蜜腺の大きさはやや大、蜜腺の色は黄、開花の早晩は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「EURZ0014」は、対照品種「PER1373」と比較して、着色葉の切れ込みの強弱が無又は弱であること、ほうの表面の色（単色品種に限る。）が150Dであること等で区別性が認められる。対照品種「DUEPREMIMPOL」と比較して、葉身の切れ込みの数が中であること、ほうの表面の色（単色品種に限る。）が150Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstr. 67, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Silvan Kamstra

7 出願公表の年月日 令和元年10月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28772号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch WEL19375

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数は少、樹高は低、茎の中間部の緑色の濃淡は極淡、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は強、葉身の長さは長、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は中、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の切れ込みの深さはかなり浅、葉柄の長さはやや短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は強、部分着色葉の数はやや少、完全着色葉の数はやや少、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数はやや少、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）は短、最大ほうの幅はやや狭、最大ほうの形は楕円形、ほうの表面の色数は2色、ほうの表面の斑点の色は155A、ほうの裏面の斑点の色（斑点模様のある品種に限る。）は155A、ほうの主脈の巻き込みの有無は有、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は弱、集散花序の幅は狭、蜜腺の大きさは中、蜜腺の色は赤、開花の早晩はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「WEL19375」は、対照品種「NPCW14221」と比較して、ほうの表面の色数が2色であること、蜜腺の色が赤であること等で区別性が認められる。対照品種「CHRISTMAS FEELINGS GLITTER 16」と比較して、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱が強であること、蜜腺の色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Christian Welzel
Liebfrauenweg 4, 47647 Kerken, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christian Welzel

7 出願公表の年月日 令和2年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28773号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Eurya japonica Thunb. タカノハラ 221

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立性、樹高はやや高、枝の長さは中、枝の太さはやや太、枝の色は褐、枝の毛の多少は無又は極少、着葉数はやや少、葉形は楕円形、葉の横断面の形は平、葉の先端の形は尖形、葉縁の鋸歯の形は鋸歯状、葉身長はやや短、葉幅は中、新葉表面の色は赤茶、葉の表面の色は濃緑、葉の裏面の色は淡緑、葉の斑の有無は無、葉の光沢は中、葉柄長はやや長である。

出願品種「タカノハラ 221」は、対照品種「ヒサカキ在来系統（鹿児島系）」と比較して、樹姿が直立性であること、樹高がやや高であること等で区別性が認められる。対照品種「ヒサカキ在来系統（みくり系）」と比較して、葉の横断面の形が平であること、葉身長がやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高原六宏
佐賀県伊万里市東山代町里325番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

高原六宏

7 出願公表の年月日 平成30年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の在来系統どうしの自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28774号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fagopyrum esculentum Moench 長野S11号 (ナガノS11ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

伸育性は有限伸育、草丈は中、花卉の色は白、花房の数は少、分枝の数は中、茎の節数はやや少、子実の長幅比は中、子実の形は三角稜形、乳熟後期の果皮の色は白～淡緑、完熟粒の果皮の色は黒、千粒重は大、容積重はやや大、生態型は中間秋型、開花始期は中、開花最盛期はかなり早、成熟期は中、耐倒伏性はやや強、脱粒性は中、ルチン含量はやや低である。

出願品種「長野S11号」は、対照品種「長野S8号」と比較して、伸育性が有限伸育であること、茎の長さがやや短であること、開花最盛期がかなり早であること等で区別性が認められる。対照品種「信濃1号」と比較して、伸育性が有限伸育であること、丸抜きの色が緑であること、開花最盛期がかなり早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

谷口岳志 丸山秀幸 岡本潔

7 出願公表の年月日 令和元年8月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

「長野S8号」に「K0814」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28775号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. 西京の白露 (サイキョウノシラツユ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはかなり長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は無、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数は極少、茎の二節以上の側枝発生数はかなり少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の形は広披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）は中、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）はやや少、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径はやや小、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径はやや小、花冠の先端の反りはやや内曲、花冠裂片の表面の色は97C(地色)、96B(周縁部)、花冠の内面上部の色は97D、花冠の外面上部の色は97B(地色)、96B(先端部)、花冠裂片の表面の斑点の粗密はやや密、花冠の外面上部の斑点の粗密は密、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅は中、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は無、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径は小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「西京の白露」は、対照品種「マイファンタジー2」と比較して、花冠の外面上部の斑点の粗密が密であること、開花期がかなり晩であること等で区別性が認められる。対照品種「パステルベル2号」と比較して、花冠の外面上部の斑点の粗密が密であること、開花期がかなり晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山口県
山口県山口市滝町1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤田淳史 尾関仁志 友廣大輔 川野祐輔

7 出願公表の年月日 平成30年3月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のエゾリンドウの系統を母系及び父系とする交雑品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28776号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. SAKGEN002

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはかなり長、茎の緑色の濃淡はやや淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はかなり少、茎の二節以上の側枝発生数は中、最長葉の着生位置は中央、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の形は卵形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）は少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）はやや多、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径は中、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径は大、花冠の先端の反りは極外反、花冠裂片の表面の色は96A、花冠の内面上部の色は96A、花冠の外面上部の色は96A、花冠裂片の表面の斑点の粗密は粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは長、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は有、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径はやや小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKGEN002」は、対照品種「ポラーノ ブルー」と比較して、花冠の先端の反りが極外反であること、花冠裂片の長さが長であること等で区別性が認められる。対照品種「青竜」と比較して、花冠の先端の反りが極外反であること、花冠の外面のしま模様の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ

神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤智博

7 出願公表の年月日 平成30年8月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統を母系及び父系とする交雑品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28777号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. シャングリラ

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さは長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はかなり少、茎の二節以上の側枝発生数は多、最長葉の着生位置は中央、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は広披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は有、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）はかなり少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）は中、花型は一重、花冠の長さはやや短、花筒部の直径は中、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径はやや大、花冠の先端の反りは外反、花冠裂片の表面の色はN81C、花冠の内面上部の色はN81D、花冠の外面上部の色はN81D、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さはやや短、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は有、がく筒の長さは短、がく筒の直径はやや小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期は極晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シャングリラ」は、対照品種「フィナーレ」と比較して、茎の長さが長であること、花冠の先端の反りが外反であること等で区別性が認められる。対照品種「セフィロト」と比較して、茎の長さが長であること、花冠裂片の幅がやや広であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社T&Gバイオナーサリー
岩手県花巻市石鳥谷町北寺林3-22

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋俊一

7 出願公表の年月日 平成31年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28778号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. INHEUSILDU

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、株幅はやや狭、葉の粗密はやや密、若葉の葉身の色1はN77A、若葉の葉身の色1の分布は葉脈に沿う、若葉の葉身の色1の模様は均一、若葉の葉身の色1の面積はかなり小、若葉の葉身の色2はN77B、若葉の葉身の色2の分布は全体の葉脈間、若葉の葉身の色2の模様は均一、若葉の葉身の色2の面積は大、若葉の葉身の色3の分布は無、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さは中、葉柄の毛の粗密は粗、葉柄の主な色はN186D、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の長さ／幅は中、葉身の先端部の形は円形、葉身裂片の切れ込みの深さは中、葉身の周縁部の欠刻の数は中、葉身の周縁部の欠刻の深さは中、葉身の周縁部の波打ちの強弱は弱、葉身のしわは無又は極弱、葉身の光沢は弱、葉身の毛の粗密は粗、葉身の裏面の毛の粗密は粗、葉身の色1はN187C、葉身の色1の分布は全体の葉脈間、葉身の色1の模様は均一、葉身の色1の面積は大、葉身の色2は200A、葉身の色2の分布は葉脈に沿う、葉身の色2の模様は均一、葉身の色2の面積はかなり小、葉身の色3の分布は無、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色はN79B、花茎の向きは半直立、花茎の長さは長、花茎の主な色は187A、花茎の花の着生する部位の長さはやや長、花茎の花の着生する部位の幅はやや広、花茎の花の着生する部位の長さ／幅は中、花茎の花の粗密はやや粗、つぼみの色は178A、花の向きはやや下向き、花の長さはかなり長、花の幅はやや狭、花の外面の色は183Bである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「INHEUSILDU」は、対照品種「Glitter」と比較して、葉身の周縁部の波打ちの強弱が弱であること、花の外面の色が183Bであること等で区別性が認められる。対照品種「プラムプディング」と比較して、若葉の葉身の色2がN77Bであること、葉柄の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Walter Ludwig

7 出願公表の年月日 平成30年7月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者の所属する法人の所有する名称不明の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28779号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens New Guinea Group KIJACO

3 登録品種の特性の概要

葉部の高さは中、株幅はやや広、茎のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の長さは短、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の表面の斑の有無は無、葉身の表面のアントシアニン着色の強弱は強、葉身の裏面の葉脈間の色は赤、葉身の裏面の葉脈の色は赤、花型は一重、花の幅は中、花の色数は2、花の表面の主な色は64C、花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）は61B、花の表面の二次色の分布（2色以上の品種に限る。）は全花卉の中央に線状、花の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KIJACO」は、対照品種「ハーモニー フクシアクリーム」と比較して、小花柄のアントシアニン着色の強弱がかなり弱であること、花の表面の主な色が64Cであること等で区別性が認められる。対照品種「KIAMUNA」と比較して、小花柄のアントシアニン着色の強弱がかなり弱であること、花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）が61Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ludwig Kientzler

7 出願公表の年月日 平成30年7月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Fancy」に育成者所有の育成系統を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28780号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens New Guinea Group KICARMONA

3 登録品種の特性の概要

葉部の高さは中、株幅はやや広、茎のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の長さはかなり短、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の表面の斑の有無は無、葉身の表面のアントシアニン着色の強弱はやや強、葉身の裏面の葉脈間の色は赤、葉身の裏面の葉脈の色は赤、花型は一重、花の幅は中、花の色数は3以上、花の表面の主な色はN30B、花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）は44B、花の表面の二次色の分布（2色以上の品種に限る。）は全花卉の中央に線状、花の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KICARMONA」は、対照品種「キネポール」と比較して、花の表面の主な色がN30Bであること等で区別性が認められる。対照品種「インパシオ オレンジスター」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が強であること、花の表面の主な色がN30Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ludwig Kientzler

7 出願公表の年月日 平成30年7月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Orange Neptis」に育成者所有の育成系統を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28781号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens New Guinea Group SAKIMP055

3 登録品種の特性の概要

葉部の高さはやや高、株幅は広、茎のアントシアニン着色の強弱は中、葉柄の長さはかなり短、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の表面の斑の有無は有、葉身の表面の斑の色（斑入り品種に限る。）は黄、葉身の表面のアントシアニン着色の強弱はやや弱、葉身の裏面の葉脈間の色は赤、葉身の裏面の葉脈の色は赤、花型は一重、花の幅は中、花の色数は1、花の表面の主な色はN30B、花の目の有無は有、花の目の大きさは小である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKIMP055」は、対照品種「SAKIMP005」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が中であること、葉身の裏面の葉脈の色が赤であること、花の表面の主な色がN30Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤智博

7 出願公表の年月日 平成31年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28782号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens New Guinea Group SAKIMP056

3 登録品種の特性の概要

葉部の高さはかなり高、株幅は広、茎のアントシアニン着色の強弱はやや弱、葉柄の長さは短、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の表面の斑の有無は無、葉身の表面のアントシアニン着色の強弱は弱、葉身の裏面の葉脈間の色は緑、葉身の裏面の葉脈の色は赤、花型は一重、花の幅はやや狭、花の色数は1、花の表面の主な色はN30A、花の目の有無は有、花の目の大きさはかなり小である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKIMP056」は、対照品種「SAKIMP040」と比較して、葉部の高さがかなり高であること、距の曲がりの強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「SAKIMP049」と比較して、葉部の高さがかなり高であること、距の曲がりの強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤智博

7 出願公表の年月日 平成31年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28783号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens New Guinea Group SAKIMP057

3 登録品種の特性の概要

葉部の高さは中、株幅は広、茎のアントシアニン着色の強弱はかなり弱、葉柄の長さはかなり短、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の表面の斑の有無は無、葉身の表面のアントシアニン着色の強弱はかなり弱、葉身の裏面の葉脈間の色は緑、葉身の裏面の葉脈の色は緑、花型は一重、花の幅はやや広、花の色数は1、花の表面の主な色は44A、花の目の有無は有、花の目の大きさはかなり小である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKIMP057」は、対照品種「SAKIMP039」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱がかなり弱であること、小花柄の長さが長であること、花の表面の主な色が44Aであること等で区別性が認められる。対照品種「SAKIMP032」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱がかなり弱であること、葉身の幅がやや広であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤智博

7 出願公表の年月日 平成31年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28784号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens New Guinea Group SAKIMP058

3 登録品種の特性の概要

葉部の高さはやや低、株幅はやや広、茎のアントシアニン着色の強弱は弱、葉柄の長さはかなり短、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の表面の斑の有無は無、葉身の表面のアントシアニン着色の強弱は中、葉身の裏面の葉脈間の色は赤、葉身の裏面の葉脈の色は赤、花型は一重、花の幅はやや広、花の色数は2、花の表面の主な色はNN74C、花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）はN74A、花の表面の二次色の分布（2色以上の品種に限る。）は全花卉の中央に線状、花の目の有無は有、花の目の大きさはやや大である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKIMP058」は、対照品種「Balboufink」と比較して、葉身の長さ／幅が中であること、花の幅がやや広であること等で区別性が認められる。対照品種「Balbigavame」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が弱であること、葉柄のアントシアニン着色の強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤智博

7 出願公表の年月日 平成31年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28785号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens New Guinea Group SAKIMP059

3 登録品種の特性の概要

葉部の高さは中、株幅は広、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉柄の長さは極短、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の表面の斑の有無は無、葉身の表面のアントシアニン着色の強弱はかなり弱、葉身の裏面の葉脈間の色は緑、葉身の裏面の葉脈の色は緑、花型は一重、花の幅は中、花の色数は1、花の表面の主な色はN57B、花の目の有無は有、花の目の大きさは小である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKIMP059」は、対照品種「SAKIMP052」と比較して、花の上弁の幅（一重品種に限る。）が中であること、花の側弁の幅（一重品種に限る。）が狭であること等で区別性が認められる。対照品種「Balboucher」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、葉柄のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤智博

7 出願公表の年月日 平成31年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28786号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ipomoea batatas (L.) Lam. サツマアカネ

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張、茎の一次側枝の長さは中、節間長は中、茎の太さは中、茎のアントシアニンの着色は無又は極弱、茎の先端のアントシアニンの着色は無又は極弱、節のアントシアニンの着色は無又は極弱、茎の先端の毛の粗密は無又は極粗、葉身の大きさは中、葉身の裂片の数は3、葉身の裂片の深さは極浅、葉身の表面の色（観賞用品種を除く。）は緑、葉身の表面のアントシアニンの着色（観賞用品種を除く。）は無又は極弱、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の大きさは無又は極小、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の強弱は極弱、葉身の蜜腺のアントシアニンの着色は無又は極弱、新葉の表面の主な色は淡緑、新葉の裏面の主な色は淡緑、葉柄のアントシアニンの着色は無又は極弱、葉柄の長さはやや長、塊根の形は卵形、塊根の長さ／幅は太、塊根の表皮の主な色は赤、塊根の表皮の二次色は無、塊根の肉の主な色は橙、塊根の肉の二次色は黄白、塊根の目の深さは浅である。

出願品種「サツマアカネ」は、対照品種「ハロウィンスウィート」と比較して、茎の先端の毛の粗密が無又は極粗であること、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の大きさが無又は極小であること、塊根の形が卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「ヒタチレッド」と比較して、塊根の形が卵形であること、塊根の肉の主な色の濃淡が中であること、蒸しいものの肉の色が橙であること等で区別性が認められる。対照品種「コガネセンガン」と比較して、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の大きさが無又は極小であること、塊根の表皮の主な色が赤であること、塊根の肉の主な色が橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
薩摩酒造株式会社
鹿児島県枕崎市立神本町26番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

甲斐由美 佃和民 小園照雄 園田忠弘 山川理 熊谷亨 吉永優 石黒浩二
高畑康浩 小林晃 境哲文 藤田敏郎 境垣内岳雄 末松恵祐 本坊愛一郎
小峯修一 竹迫寿一

7 出願公表の年月日 平成30年11月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「スターチクイン」に「ハマコマチ」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28787号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lantana L. LAN14901

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立型、樹高はやや低、株張りはかなり小、枝の長さは短、枝の太さは細、枝の色は緑色、枝のとげの有無は無、稜の有無は無、分枝性は多、節間長は短、葉の形は卵形、葉身長はやや短、葉幅はやや狭、葉長比はやや大、葉のつき方は対生、葉の表面の色は濃緑、葉の斑入りは無、葉の表面の毛の多少は少、葉の表面の毛の硬さは硬、葉柄長は中、花房の形は平たい球形、花房径はかなり広、花の直径はやや小、花筒の長さはやや長、花色の変化の有無は無、満開時の花色はNN155C、小花の中心部の色の変化は有、開花始めの小花の中心部の色は6A、満開時の小花の中心部の色はNN155C、ほう葉の形は線状披針形、花柄の長さは中、一花房当たりの開花数は中、花の香りはかなり弱、果実の着生の難易は極難、開花習性は四季咲き、開花時期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「LAN14901」は、対照品種「BAN WHIT」と比較して、一花房当たりの開花数が中であること等で区別性が認められる。対照品種「コバランホ29号」と比較して、株張りがかなり小であること、葉身長がやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Thomas Psenner

7 出願公表の年月日 平成30年7月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Calippo Snow」に「Calippo Bushy White」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28788号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lantana L. LAN15104

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立型、樹高はやや低、株張りはかなり小、枝の長さは短、枝の太さは細、枝の色は緑色、枝のとげの有無は無、稜の有無は無、分枝性は多、節間長はかなり短、葉の形は卵形、葉身長はやや短、葉幅はやや狭、葉長比は中、葉のつき方は対生、葉の表面の色は濃緑、葉の斑入りは無、葉の表面の毛の多少は中、葉の表面の毛の硬さは硬、葉柄長はやや長、花房の形は平たい球形、花房径は広、花の直径はやや大、花筒の長さはやや長、花色の変化の有無は2色、開花始めの花色は14A、満開時の花色は155D、小花の中心部の色の変化は有、開花始めの小花の中心部の色は14A、満開時の小花の中心部の色は155B、ほう葉の形は線状披針形、花柄の長さはやや短、一花房当たりの開花数はかなり多、花の香りは中、果実の着生の難易は極難、開花習性は四季咲き、開花時期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「LAN15104」は、対照品種「パニックドーム ホワイトバイカラー」と比較して、葉身長がやや短であること、葉の表面の色が濃緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Thomas Psenner

7 出願公表の年月日 平成30年7月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Calippo Gold」に「Calippo Bushy Yellow」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28789号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinus edodes (Berk.) Sing. 秋山A-511号 (アキヤマA-511ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は24℃、菌さんの形(平面)は円形、菌さんの形(側面)は凸形、菌さんの形(肉の形)は1型、菌さんの大きさ(不時栽培)は中、菌さんの色は褐色、菌さんの厚さ(不時栽培)は中、菌さんの肉質は硬、りん皮の付着部位は周縁、りん皮の大きさは中、りん皮の色は有、子実層たくの形状は2型、子実層たくの並び方は正常、子実層たくの幅は極狭、子実層たくの密度は密、子実層たく色はクリーム色、菌柄の形は1型、菌柄の長さはやや短、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率は大、菌柄の太さは中、菌さんの直径と菌柄の太さとの比率はやや大、菌柄の表面の色あいは有、菌柄の毛の色は有、菌柄の毛の有無は有、菌柄の肉質は硬、子実体の発生時期(不時栽培)は周年、子実体の発生型は集中、子実体の発生温度は中、子実体の発生最盛期までの期間は短、収量性は中である。

出願品種「秋山A-511号」は、対照品種「秋山A-950号」と比較して、30℃の場合の菌糸体の生長速度が遅であること、子実層たくの形状が2型であること等で区別性が認められる。対照品種「秋山A-910号」と比較して、菌さんの形(肉の形)が1型であること、りん皮の付着部位が周縁であること、収量性が中であること、年別収量比率2が30～40%未満であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社秋山種菌研究所
山梨県甲府市高畑一丁目5番13号

6 登録品種の育成をした者の氏名

河西忠衛 野中三大

7 出願公表の年月日 平成29年3月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

「秋山A-950号」に出願者の保有株を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28790号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lilium L. 鳥鱗1号 (トリリンゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、葉の数は極多、葉序は螺旋生、葉の長さは中、葉の幅はかなり狭、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、花序の型は散形花序及び総状花序、花序の花数はやや少、花被の向き（小花柄を除く。）は直立、花被の形（小花柄を除く。）は碗、花の香りは無又は弱、花被片の長さは短、花被片の幅は狭、花被片の中央部の主な色は15B、花被片の乳頭突起又は斑点の数は無又は極少、花粉の色は淡褐、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「鳥鱗1号」は、対照品種「きらりレモン」と比較して、葉の横断面の形がV字型であること、花被片の中央部の主な色が15Bであること、やくの色が橙黄であること等で区別性が認められる。対照品種「黄色ヒメユリ」と比較して、葉の数が極多であること、葉の横断面の形がV字型であること、花被片の乳頭突起又は斑点の数が無又は極少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鳥取県

鳥取県鳥取市東町一丁目220番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

大津真士 池田規子 岸本真幸 前田英博 森本康史

7 出願公表の年月日 平成30年5月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

「さきがけ雷山」に出願者所有のヒメユリとキヒメユリの雑種選抜系統を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28791号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv. PLUM GORGEOUS

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半直立、樹高はかなり低、成葉の葉身の長さは長、成葉の葉身の幅は広、若葉の主な色は187A、若葉の斑の有無は無、成葉の主な色は202A、成葉の斑の有無は無、秋季の若葉の主な色はN187A、秋季の若葉の斑の有無は無、秋季の成葉の主な色は200A、秋季の成葉の斑の有無は無、がくの色はN77B、花弁の長さはやや長、花弁の幅はやや狭、花弁の主な色は64B、花弁の二次色の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PLUM GORGEOUS」は、対照品種「黒美人」と比較して、花弁の主な色が64Bであること等で区別性が認められる。対照品種「赤葉赤花」と比較して、花弁の主な色が64Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Steven Eggleton

12 John St Wandia North 3139 Victoria, Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Steven Eggleton

7 出願公表の年月日 平成28年7月27日

8 登録品種の育成の経過の概要

「China Pink」に「Daybreak's Flame」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28792号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv. 桃祝 (モモイイ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立、樹高はかなり高、成葉の葉身の長さは中、成葉の葉身の幅は中、若葉の主な色は176A、若葉の斑の有無は無、成葉の主な色は187A、成葉の斑の有無は無、秋季の若葉の主な色はN200A、秋季の若葉の斑の有無は無、秋季の成葉の主な色はN199B、秋季の成葉の斑の有無は無、がくの色は186C、花弁の長さは中、花弁の幅はやや狭、花弁の主な色は65B、花弁の二次色の有無は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「桃祝」は、対照品種「花まつり」と比較して、成葉の主な色が187Aであること等で区別性が認められる。対照品種「祝」と比較して、花弁の主な色が65Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鈴木祐司
埼玉県川口市大字木曾呂364番地の2

6 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木祐司

7 出願公表の年月日 平成29年3月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

「祝」の変異株である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28793号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. 遠山三系 (エンザンサンケイ)

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は開張、枝の太さはやや細、節間長は長、皮目の多少は多、葉身の長さは短、葉身の長さ／幅は中、葉身の緑色の濃淡は中、葉柄の長さはやや短、つぼみの色は淡桃、花の大きさはやや大、果実の大きさは大、果実の形は長円錐形、果実の王冠の強弱は無又は弱、果実のがくの開閉は小、果皮のろう質の多少は無又は少、果面の粗滑は中、果皮の地色は黄緑、果皮を被う色の面積は大、果皮を被う色は赤、果皮を被う色の濃淡はやや濃、果皮を被う色の型は不明瞭なしま模様を伴った全面着色、梗あ周辺のさびの量は無又は小、果実側面のさびの量は無又は小、がくあ周辺のさびの量は無又は小、果点の数は中、果点の大きさは中、スカーフスキンの多少は少、果柄の長さはかなり長、果柄の太さは太、梗あのは深さは深、梗あのは幅はかなり広、がくあのは深さは中、がくあのは幅はやや広、果肉の硬さは硬、果肉の色は黄白、果実の甘味は高、果実の酸味は低、果実の蜜の多少は多、果心の形は円錐形、開花始期は中、収穫期は晩である。

出願品種「遠山三系」は、対照品種「ふじ」と比較して、幼果のアントシアニン着色の広がりが大であること、果皮のしま模様の明瞭度が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「宮美ふじ」と比較して、幼果のアントシアニン着色の広がりが大であること、果実の蜜の多少が多であること等で区別性が認められる。対照品種「コスモふじ」と比較して、幼果のアントシアニン着色の広がりが大であること、果実の蜜の多少が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

遠藤庄太
山形県東根市神町北1丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

遠藤庄太

7 出願公表の年月日 平成30年10月25日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ふじ」の自然交雑実生の枝変わりである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28794号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. あーちゃんレッド

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は開張、枝の太さは細、節間長は中、皮目の多少は多、葉身の長さはやや短、葉身の長さ／幅はかなり大、葉身の緑色の濃淡は中、葉柄の長さはかなり短、つぼみの色は淡桃、花の大きさは小、果実の大きさは大、果実の形は長円錐形、果実の王冠の強弱は中、果実のがくの開閉は小、果皮のろう質の多少は無又は少、果面の粗滑は中、果皮の地色は黄緑、果皮を被う色の面積はやや大、果皮を被う色は赤、果皮を被う色の濃淡は中、果皮を被う色の型は明瞭なしま模様を伴った全面着色、梗あ周辺のさびの量は中、果実側面のさびの量は無又は小、がくあ周辺のさびの量は無又は小、果点の数は中、果点の大きさは中、スカーフスキンの多少は無、果柄の長さは短、果柄の太さはやや細、梗あの深さはかなり深、梗あの幅は広、がくあの深さはやや深、がくあの幅は中、果肉の硬さはやや硬、果肉の色は帯黄、果実の甘味は中、果実の酸味は低、果実の蜜の多少はやや多、果心の形は平円形、開花始期は中、収穫期は中である。

出願品種「あーちゃんレッド」は、対照品種「紅玉」と比較して、果実の大きさが大であること、果皮を被う色の濃淡が中であること、果実の酸味が低であること等で区別性が認められる。対照品種「やたか」と比較して、葉身の幅がかなり狭であること、果柄の長さが短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

藤牧秀夫
長野県長野市大字村山147番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤牧秀夫

7 出願公表の年月日 平成30年11月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

「あいかの香り」の自然交雑実生である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28795号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mandevilla Lindl. Sunparaclare

3 登録品種の特性の概要

つるの数は中、若茎のアントシアニンの着色は無又は極弱、節間長は中、茎の毛の有無は無、葉序は十字対生、葉柄の長さは長、葉柄のアントシアニンの着色は無又は極弱、葉柄の毛の有無は無、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや広、葉身の最大幅の位置は先端部、葉身の先端部の形は鋭尖形、葉身の基部の形は円形、葉身の主な色は濃緑、葉身の二次色は無、葉身の葉脈間の凹凸は無又は極弱、葉身の裏面の毛の有無は無、葉縁の波打ちは無又は極弱、小花柄のアントシアニンの着色は無又は弱、小花柄の毛の有無は無、つぼみの形は倒角卵形、花型は一重、がくの下部の主な色は緑、がくの上部の主な色は淡赤、花冠の直径はやや小、花筒の長さは中、花筒の外表面の色はN144D、花喉部の長さは中、花喉部の形は漏斗型、花喉部の外表面下部の色は145C、花喉部の外表面上部の色は53C、花喉部の内表面下部の色はN25B、花喉部の内表面上部の色はN25B、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅はやや狭、花冠裂片の対称性は著しく非対称、花冠裂片の先端の形は鋭形、花冠裂片の重なりは重なる、花冠裂片の表面の主な色はN45B、花冠裂片の表面の二次色の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunparaclare」は、対照品種「Sunmandecrikin」と比較して、若茎のアントシアニンの着色が無又は極弱であること、葉身の長さがやや短であること、花冠の直径がやや小であること等で区別性が認められる。対照品種「サンマンデクリム」と比較して、若茎のアントシアニンの着色が無又は極弱であること、花筒の外表面の色がN144Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

見里朝也

7 出願公表の年月日 令和元年8月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28796号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. 99-S-LV

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は無、草型は分枝型、草丈は高、開花側枝の発生位置は主に上部、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の形は中間形、葉の毛の有無は有、花穂の長さは中、花穂の形は円筒形、花穂の上部の伸長は極小、花穂の花の数は少、花の直径はやや大、八重花と一重花の花色の違いの有無は無、花の香りは中、がくのアントシアニン着色の有無は有、花弁の長さはやや短、花弁の幅はやや狭、花弁の主な色はN87C、花弁の基部の複色部の有無は有、花弁の基部の複色部の大きさは小、内花弁の色はN87D、一重花の花弁の長さはやや短、一重花の花弁の幅は中、一重花の花弁の主な色はN87C、一重花の花弁の基部の複色部の有無は有、一重花の花弁の基部の複色部の大きさは小、開花始期は超早、八重率は中、種子の色による八重鑑別の難易は難である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「99-S-LV」は、対照品種「ラベンダーカル」と比較して、草丈が高であること、開花始期が超早であること等で区別性が認められる。対照品種「八幡ラベンダー」と比較して、茎の硬さの強弱が中であること、開花始期が超早であること等で区別性が認められる。対照品種「マリンプラッシュ チルドレン」と比較して、茎の硬さの強弱が中であること、一重花の花弁の基部の複色部の大きさが小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川浩
千葉県館山市伊戸2570番地
黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川浩

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ラベンダー カル」に「HI-S-CH」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28797号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. 109-S-YE

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は無、草型は分枝型、草丈は高、開花側枝の発生位置は主に上部、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は中間形、葉の毛の有無は有、花穂の長さは中、花穂の形は円筒形、花穂の上部の伸長は小、花穂の花の数は少、花の直径はやや大、八重花と一重花の花色の違いの有無は無、花の香りは弱、がくのアントシアニン着色の有無は無、花弁の長さはやや短、花弁の幅はやや狭、花弁の主な色は8D、花弁の基部の複色部の有無は有、花弁の基部の複色部の大きさは中、内花弁の色は8D、一重花の花弁の長さは中、一重花の花弁の幅は中、一重花の花弁の主な色は8D、一重花の花弁の基部の複色部の有無は有、一重花の花弁の基部の複色部の大きさは中、開花始期はやや超早、八重率は中、種子の色による八重鑑別の難易は難である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「109-S-YE」は、対照品種「ディープイエロー チルドレン」と比較して、草丈が高であること、茎の硬さの強弱がやや弱であること、一重花の花弁の主な色が8Dであること等で区別性が認められる。対照品種「八幡イエロー」と比較して、内花弁の色が8Dであること、一重花の花弁の主な色が8Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川浩
千葉県館山市伊戸2570番地
黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川浩

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ディープイエロー チルドレン」に「HI-S-CH」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28798号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. 124-S-R0

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は無、草型は分枝型、草丈は高、開花側枝の発生位置は主に上部、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は中間形、葉の毛の有無は有、花穂の長さは中、花穂の形は円筒形、花穂の上部の伸長は極小、花穂の花の数はやや少、花の直径はやや大、八重花と一重花の花色の違いの有無は無、花の香りは弱、がくのアントシアニン着色の有無は有、花弁の長さは短、花弁の幅はやや狭、花弁の主な色はNN74B、花弁の基部の複色部の有無は有、花弁の基部の複色部の大きさは小、内花弁の色はNN74B、一重花の花弁の長さはやや短、一重花の花弁の幅は中、一重花の花弁の主な色はNN74B、一重花の花弁の基部の複色部の有無は有、一重花の花弁の基部の複色部の大きさは中、開花始期は超早、八重率は中、種子の色による八重鑑別の難易は難である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「124-S-R0」は、対照品種「ローズカル」と比較して、葉の凹凸が中であること、開花始期が超早であること等で区別性が認められる。対照品種「八幡ピンク」と比較して、開花側枝の数が中であること、茎の硬さの強弱がやや弱であること、開花始期が超早であること等で区別性が認められる。対照品種「ピンクカル」と比較して、茎の硬さの強弱がやや弱であること、下位葉の切れ込みの深さが無又は極浅であること、開花始期が超早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川浩
千葉県館山市伊戸2570番地
黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川浩

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ローズカル」に「HI-S-CH」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28799号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. 116-S-P

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は無、草型は分枝型、草丈は高、開花側枝の発生位置は主に上部、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は中間形、葉の毛の有無は有、花穂の長さはやや長、花穂の形は円筒形、花穂の上部の伸長は極小、花穂の花の数は少、花の直径はやや大、八重花と一重花の花色の違いの有無は無、花の香りは弱、がくのアントシアニン着色の有無は無、花弁の長さは短、花弁の幅はやや狭、花弁の主な色はN66D、花弁の基部の複色部の有無は有、花弁の基部の複色部の大きさは小、内花弁の色はN66D、一重花の花弁の長さは中、一重花の花弁の幅は中、一重花の花弁の主な色は73A、一重花の花弁の基部の複色部の有無は有、一重花の花弁の基部の複色部の大きさは中、開花始期は極早、八重率は中、種子の色による八重鑑別の難易は難である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「116-S-P」は、対照品種「ファンタジー チルドレン」と比較して、茎の硬さの強弱が弱であること、開花始期が極早であること等で区別性が認められる。対照品種「ライトピンクカル」と比較して、がくのアントシアニン着色の有無が無であること、一重花の花弁の主な色が73Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川浩
千葉県館山市伊戸2570番地
黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川浩

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ファンタジー チルドレン」に「HI-S-CH」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28800号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. 426-N-MR

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は無、草型は1本立ち型、草丈は極高、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は中間形、葉の毛の有無は有、花穂の長さは長、花穂の形は円錐形、花穂の上部の伸長は中、花穂の花の数はやや多、花の直径はやや大、八重花と一重花の花色の違いの有無は無、花の香りは中、がくのアントシアニン着色の有無は無、花弁の長さはやや短、花弁の幅は中、花弁の主な色はN87C、花弁の基部の複色部の有無は有、花弁の基部の複色部の大きさは小、内花弁の色は76B、一重花の花弁の長さはやや短、一重花の花弁の幅は中、一重花の花弁の主な色はN82D、一重花の花弁の基部の複色部の有無は有、一重花の花弁の基部の複色部の大きさは中、開花始期はかなり早、八重率は高、種子の色による八重鑑別の難易は難である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「426-N-MR」は、対照品種「KSST-MIMP」と比較して、草丈が極高であること、内花弁の色が76Bであること等で区別性が認められる。対照品種「KSST-M」と比較して、草丈が極高であること、花弁の主な色がN87Cであること、内花弁の色が76Bであること等で区別性が認められる。対照品種「グローリーラベンダー」と比較して、草丈が極高であること、葉の凹凸が強であること、がくのアントシアニン着色の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川浩
千葉県館山市伊戸2570番地
黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川浩

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ペイルブルー アイアン」に「HI-S-CH」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28801号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. 399-N-BL

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は無、草型は1本立ち型、草丈は高、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の形は中間形、葉の毛の有無は有、花穂の長さは中、花穂の形は円錐形、花穂の上部の伸長は中、花穂の花の数は中、花の直径はやや大、八重花と一重花の花色の違いの有無は無、花の香りは中、がくのアントシアニン着色の有無は有、花弁の長さはやや短、花弁の幅は中、花弁の主な色はN82B、花弁の基部の複色部の有無は無、内花弁の色はN82C、一重花の花弁の長さは中、一重花の花弁の幅は中、一重花の花弁の主な色はN87B、一重花の花弁の基部の複色部の有無は有、一重花の花弁の基部の複色部の大きさは小、開花始期は極早、八重率は中、種子の色による八重鑑別の難易は難である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「399-N-BL」は、対照品種「ブルー レボ」と比較して、葉数がやや多であること、葉の長さが短であること、がくのアントシアニン着色の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川浩
千葉県館山市伊戸2570番地
黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川浩

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「パープル アイアン」に「HI-S-CH」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28802号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. 273-N-PP

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は無、草型は1本立ち型、草丈は高、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の形は中間形、葉の毛の有無は有、花穂の長さは中、花穂の形は円錐形、花穂の上部の伸長は小、花穂の花の数は中、花の直径はやや大、八重花と一重花の花色の違いの有無は無、花の香りは中、がくのアントシアニン着色の有無は有、花弁の長さはやや短、花弁の幅は中、花弁の主な色はN81A、花弁の基部の複色部の有無は有、花弁の基部の複色部の大きさは小、内花弁の色はN81A、一重花の花弁の長さは中、一重花の花弁の幅はやや広、一重花の花弁の主な色はN81B、一重花の花弁の基部の複色部の有無は有、一重花の花弁の基部の複色部の大きさは中、開花始期は極早、八重率は中、種子の色による八重鑑別の難易は難である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「273-N-PP」は、対照品種「パープル アイアン」と比較して、茎の硬さの強弱がやや弱であること、花穂の花の数が中であること、開花始期が極早であること等で区別性が認められる。対照品種「紫の舞」と比較して、上位葉の向きがかなり上向きであること、葉の長さが短であること、小花柄の長さが短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川浩
千葉県館山市伊戸2570番地
黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川浩

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「パープル アイアン」に「HI-S-CH」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28803号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 山形糯128号（ヤマガタモチ128ゴウ）

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡はやや濃、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期は早、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は中、穂の主軸の長さは中、穂数はやや少、芒の有無は有、初期の芒の色は黄褐、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さは極短、外穎の毛じは中、外穎先端の色は赤、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期はかなり早、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、粳の千粒重はやや大、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重はやや大、玄米の長さはやや長、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は白、胚乳の型は糯、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性は中、穂発芽性は難、脱粒性は難、葉いもちほ場抵抗性は強、穂いもちほ場抵抗性は強、白葉枯病ほ場抵抗性はやや弱である。

出願品種「山形糯128号」は、対照品種「こゆきもち」と比較して、出穂期が早であること、成熟期がかなり早であること、穂発芽性が難であること等で区別性が認められる。対照品種「ヒメノモチ」と比較して、外穎先端の色が赤であること、玄米の千粒重がやや大であること、穂発芽性が難であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山形県
山形県山形市松波二丁目8番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

本間猛俊 佐野智義 中場勝 結城和博 後藤元 阿部洋平 森谷真紀子 齋藤寛
齋藤信弥 鈴木隆由輝 渡部貴美子 齋藤久美

7 出願公表の年月日 平成30年5月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

「山形糯105号」に「庄糯3985」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28804号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. たからまさり

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡はやや濃、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期はかなり晩、柱頭の色は白、稈の太さは太、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は中、穂の主軸の長さはやや長、穂数は少、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さは極短、外穎の毛じは中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期はかなり晩、穎の色は黄白、護穎の色は黄白、粳の千粒重は中、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重はやや大、玄米の長さはやや長、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は7型、玄米の香りは無又は極弱、穂発芽性はやや易、脱粒性は難、白葉枯病抵抗性品種群別は金南風群、白葉枯病は場抵抗性は弱である。

出願品種「たからまさり」は、対照品種「ホシユタカ」と比較して、玄米の形が長円形であること等で区別性が認められる。対照品種「ヒノヒカリ」と比較して、出穂期がかなり晩であること、穂数が少であること、胚乳のアミロース含量が7型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鹿児島県

鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

若松謙一 園田純也 田之頭拓 田中明男 山根一城 古江広治

7 出願公表の年月日 平成30年7月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統に「ホシユタカ」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28805号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. くいつき

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡はやや濃、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期はかなり早、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は長、穂の主軸の長さは中、穂数はやや少、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さは極短、外穎の毛じは中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は早、穎の色は黄白、護穎の色は黄白、粳の千粒重はやや大、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重は大、玄米の長さはやや長、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は5型、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性は強、穂発芽性は難、耐倒伏性は強、脱粒性は難、葉いもちほ場抵抗性は強、高温登熟性はやや強である。

出願品種「くいつき」は、対照品種「なつほのか」と比較して、出穂期がかなり早であること、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が長であること等で区別性が認められる。対照品種「コシヒカリ」と比較して、玄米の千粒重が大であること、耐倒伏性が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鹿児島県

鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

若松謙一 佐藤光徳 田之頭拓 山根一城 田中明男 大内田真 森浩一郎
樋高二郎 古江広治

7 出願公表の年月日 平成30年7月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ふ系226号」に「なつほのか」を交配し、選抜したものである。

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 8 8 0 6 号 令和 3 年 1 2 月 1 3 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. グランパッソプラス バイカラー
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はやや低、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の基部の重なりは大きく開く、葉身の切れ込みはやや浅、葉身の斑の有無は無、花の幅はかなり狭、がく片の長さは短、小花柄のアントシアニンの着色は無又は弱、上部花弁の周縁部の波打ちは弱、上部花弁の周縁部の主な色はNN78A、上部花弁の周縁部と中間部の間の主な色はN77A、上部花弁の中間部の主な色はN77A、上部花弁の中央の模様は無又は極小、上部花弁の基部の複色部は小、下部花弁の周縁部の主な色は76D、下部花弁の周縁部と中間部の間の主な色は76B、下部花弁の中間部の主な色はN74D、下部花弁の中央の模様はやや小、下部花弁の基部の複色部は無又は極小である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「グランパッソプラス バイカラー」は、対照品種「エンジェルアイズ バイカラーimp」と比較して、上部花弁の周縁部の主な色がNN78Aであること等で区別性が認められる。対照品種「CAMBI」と比較して、花の長さが短であること、上部花弁の周縁部の主な色がNN78Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
鈴木清次
神奈川県茅ヶ崎市中島1097番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
鈴木清次
- 7 出願公表の年月日 平成 3 0 年 1 0 月 2 9 日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28807号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. REGPINKER

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の基部の重なりは大きく開く、葉身の切れ込みは中、葉身の斑の有無は無、花の幅はやや狭、がく片の長さは短、小花柄のアントシアニンの着色は中、上部花弁の周縁部の波打ちは弱、上部花弁の周縁部の主な色は76C、上部花弁の周縁部と中間部の間の主な色はN74A、上部花弁の中間部の主な色はN186D、上部花弁の中央の模様は中、上部花弁の基部の複色部は大、下部花弁の周縁部の主な色は76C、下部花弁の周縁部と中間部の間の主な色はN74A、下部花弁の中間部の主な色はN74A、下部花弁の中央の模様は無又は極小、下部花弁の基部の複色部は大である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「REGPINKER」は、対照品種「湘南の華」と比較して、小花柄のアントシアニンの着色が中であること、上部花弁の基部の複色部の色が76Cであること、下部花弁の基部の複色部が大であること等で区別性が認められる。対照品種「マリン湘南」と比較して、草丈が低であること、花の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「SAKPEL004」と比較して、上部花弁の周縁部の主な色が76Cであること、下部花弁の基部の複色部が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Str. 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Geibel

7 出願公表の年月日 平成30年12月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28808号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pentas Benth. PEZZ0005

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はかなり低、茎の節間長はかなり短、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は無、葉身の長さはかなり短、葉身の幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身の緑色の濃淡はやや濃、葉身の毛の粗密はやや密、花序の花の数はかなり少、花序の長径は大、花序の短径はやや大、花序の高さは高、花序の上部の形は丸、花型は一重、花冠の直径は中、花筒の長さは中、花筒の色は54B、花喉部の内面の毛の色は白、花冠裂片の向きは斜上、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅は中、花冠裂片の形は卵形、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN45B、やくの花喉部上部に対する位置は下位、花柱の長さは中、柱頭の大きさはやや大、柱頭の色は赤紫である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「PEZZ0005」は、対照品種「ラッキースターダークレッド」と比較して、花冠裂片の幅が中であること、花冠裂片の表面の主な色がN45Bであること等で区別性が認められる。対照品種「グラフィティリップスティック」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN45Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Participations AG
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jaemin Lee

7 出願公表の年月日 平成31年2月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者が所属する法人が所有する系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28809号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Perilla L. 愛経3号 (アケイゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は中、主茎長は長、主茎上部のアントシアニン着色の程度はかなり淡、1次分枝数はやや多、胚軸のアントシアニン着色の程度は淡、子葉の表面の色は緑、子葉の裏面の色は緑、葉の形はやや同幅、葉の切れ込み程度は中、葉のきょ歯の形は三角形小、葉の大きさは中、葉の厚さはやや薄、葉の波打ちは弱、葉面のちぢみ（山脈状）は弱、葉面のちぢみ（凸状）は無、葉の表面の色は濃緑、葉裏面のアントシアニン着色の程度は無、葉柄長はやや短、花穂長はやや長、小花の大きさはやや小、花卉の形状は一重、花卉の色は白、がくの大きさは大、生育の早晩は早、出穂早晩性はやや晩、葉の香りは中である。

出願品種「愛経3号」は、対照品種「愛経1号」と比較して、小型きょ歯の出現度がかかなり少であること等で区別性が認められる。対照品種「豊橋在来系」と比較して、小型きょ歯の出現度がかかなり少であること等で区別性が認められる。対照品種「ひたちあおば」と比較して、小型きょ歯の出現度がかかなり少であること、葉の大きさが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

愛知県経済農業協同組合連合会
愛知県名古屋市中区錦三丁目3番8号
愛知県
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大藪哲也 加藤政司 関間さおり 穴井尚子 榊原政弘 浅野義行 久野一義
河村信吾 渡会美津雄 間瀬昇

7 出願公表の年月日 平成30年6月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の在来系統に「愛経1号」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28810号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phaseolus vulgaris L. 秋晴れ (アキハレ)

3 登録品種の特性の概要

伸育性と草型は有限わい性、胚軸の色は淡赤紫、花色は淡赤紫、若莢の地色は緑、若莢の斑紋の色はなし、若莢の斑紋の種類はなし、莢の長さは中、莢の幅は中、子実の形は楕円形、種皮の地色は赤紫、種皮の斑紋（点）の色はなし、種皮の斑紋の種類はなし、種皮の環色はなし、粒の大小（花豆を除く）はやや大、開花期は早、成熟期（花豆を除く）はかなり早である。

出願品種「秋晴れ」は、対照品種「福良金時」と比較して、炭そ病抵抗性（レース38）が無であること、黄化病抵抗性が強であること等で区別性が認められる。対照品種「大正金時」と比較して、炭そ病抵抗性（レース38）が無であること、黄化病抵抗性が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

地方独立行政法人北海道立総合研究機構
北海道札幌市北区北十九条西十一丁目1番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

奥山昌隆 中川浩輔 佐藤仁 齋藤優介 島田尚典

7 出願公表の年月日 令和元年12月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

「十系B405号」に「十系B400号」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28811号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phleum pratense L. キウス

3 登録品種の特性の概要

春の草勢は良、出穂期は晩生、草型はややほふく、穂数はかなり多、出穂茎率はやや高、稈長は高、茎の太さは中、穂長は長、着葉角度は狭、葉身長は長、葉幅はやや広、葉色は緑、再生は良、1,000粒重は軽、越冬性はやや良、斑点病抵抗性は強、条葉枯病抵抗性は極強、耐倒伏性は中である。

出願品種「キウス」は、対照品種「シリウス」と比較して、草型がややほふくであること、茎節着色がやや薄であること等で区別性が認められる。対照品種「なつさかり」と比較して、葉身長が長であること、条葉枯病抵抗性が極強であること等で区別性が認められる。対照品種「ホクシュウ」と比較して、稈長が高であること、越冬性がやや良であること、斑点病抵抗性が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条5丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

横山寛 谷津英樹 高山光男

7 出願公表の年月日 平成29年4月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ホクシュウ」、「キリタツプ」、「ホクセン」、「ホクオウ」、「P-1」及び「Tiiti」由来の17栄養系の相互交配による合成品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28812号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Physocarpus (Cambess.) Maxim. Hoogi016

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立、樹高は極低、樹幅は狭、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、枝の主な色は183A、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の先端部の形は鋭形、葉身の基部の形は鈍形、葉身の鋸歯の形は二重鋸歯状、葉身の切れ込みの深さは深、幼葉の表面の主な色は152C、幼葉の裏面の主な色は152D、成葉の表面の主な色は200A、成葉の裏面の主な色は147C、成葉の表面の斑の有無は無、葉身の裏面の毛の有無は無、葉柄の長さはかなり短、葉柄の色は187B、花の直径はやや小、花卉の表面の主な色は155Cである。
(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Hoogi016」は、対照品種「Diabolo」と比較して、葉身の長さが短であること、幼葉の表面の主な色が152Cであること、花の直径がやや小であること等で区別性が認められる。対照品種「TUILAD」と比較して、幼葉の表面の主な色が152Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Vitro Bio Plant Holland BV
Rijksweg 30 A 6744WB Ederveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Pavel Schuch

7 出願公表の年月日 平成28年2月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Diabolo」の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28813号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus avium (L.) L. 紅大将 (ベニタイショウ)

3 登録品種の特性の概要

樹勢は強、樹姿は半直立、節間長は短、枝の太さは中、葉身の長さは長、葉身の長さ／幅は中、葉身の長さ／葉柄の長さはやや大、花の直径はやや小、花卉の形は倒卵形、果実の大きさは大、果実の形は心臓形、果頂部の形は凹、果実の縫合線の明瞭度は不明瞭、果柄の長さはやや短、果皮の色は濃赤、果肉の色はクリーム、果実の硬さは硬、果実の酸味は低、果実の甘味は高、果汁の多少は多、核の大きさはやや大、核の形は広楕円形、開花始期は中、収穫始期は晩である。

出願品種「紅大将」は、対照品種「大将錦」と比較して、果皮の色が濃赤であること等で区別性が認められる。対照品種「紅秀峰」と比較して、果皮の色が濃赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社天香園
山形県東根市中島通り一丁目34号

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋新一

7 出願公表の年月日 平成30年10月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

「大将錦」の枝変わりである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28814号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus mume Siebold & Zucc. 星秀 (セイシュ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張、樹勢は中、節間長はかなり短、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の長さ／幅は中、花型は一重、花の大きさは中、花の色は白、花粉の稔性は高、果実の大きさはやや大、果実の縦断面の形は卵形、果皮の色は緑、果皮のアントシアニン着色の強弱は中、果肉の色は淡緑、肉質は密、核の形は広楕円形、核と果肉の粘離は粘核、開花期は中、成熟期は中、自家和合性は有である。

出願品種「星秀」は、対照品種「NK14」と比較して、葉身の先端突起の長さがかなり長であること、果頂部の形が凸であること、核の頂端の形がほぼ直角であること等で区別性が認められる。対照品種「星高」と比較して、果実の縦断面の形が卵形であること、果頂部の形が凸であること、核の大きさ／果実の大きさが小であること等で区別性が認められる。対照品種「南高」と比較して、花卉の重なりが接触であること、果頂部の形が凸であること、自家和合性が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

和歌山県

和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

北村祐人 沼口孝司 土田靖久 大江孝明 武田知明 岩本和也 島津康 林恭平
菱池政志 中一晃 根来圭一

7 出願公表の年月日 令和元年6月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

「南高」に「剣先」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28815号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch 武兵衛 (ブヘ)

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさはやや大、樹勢は強、樹姿は直立、枝の太さは中、着花枝のアントシアニン着色の強弱は中、着花枝の花芽の粗密は密、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は緑黄、花冠の表面の色は桃、花卉の大きさは小、雄ずいの花弁に対する位置は上位、柱頭のやくに対する位置は下位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、新しょうのたく葉の長さは中、葉身の長さは短、葉身の長さ／幅はやや大、葉身の横断面の形は凹、葉身の先端の反りの有無は無、葉身の基部の形は鋭、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは長、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は3以上、果実の大きさは中、果実の形は扁円形、果頂部の形は広浅凹、果実の対称性は対称、縫合線の強弱はやや強、梗あ幅はやや広、果実の地色は乳白、果実の着色の型はばかし状、果実の着色面積はやや小、果実の毛じの粗密はやや粗、果皮の厚さは中、果皮の付着性は中、果肉の硬さは極硬、果肉の地色は乳白、果肉のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は弱、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味は極高、核の大きさはやや大、核の横面の形は楕円形、核の褐色の濃淡は中、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少は低、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は強、収穫期は極晩である。

出願品種「武兵衛」は、対照品種「さくら白桃」と比較して、果実の大きさが中であること、果実の着色面積がやや小であること等で区別性が認められる。対照品種「幸茜」と比較して、果実の大きさが中であること、果実の着色面積がやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

相澤なぎさ
山梨県笛吹市一宮町本都塚34

6 登録品種の育成をした者の氏名

相澤なぎさ

7 出願公表の年月日 平成30年12月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

名称不詳品種の自然交雑実生の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28816号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch 尚美 (ショウビ)

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさは中、樹勢は中、樹姿は開張、枝の太さは中、着花枝のアントシアニン着色の強弱は弱、着花枝の花芽の粗密は密、花芽の着き方は単、がく筒の内側の色は橙、花冠の表面の色は淡桃、花弁の大きさは中、雄ずいの花弁に対する位置は下位、柱頭のやくに対する位置は同位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、新しょうのたく葉の長さはやや短、葉身の長さはやや短、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は凹、葉身の先端の反りの有無は無、葉身の基部の形は鋭、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は2、果実の大きさは大、果実の形は扁円形、果頂部の形は広浅凹、果実の対称性は非対称、縫合線の強弱は中、梗あ幅は中、果実の地色は緑白、果実の着色の型は条状、ぼかし状、果実の着色面積は中、果実の毛じの粗密は中、果皮の厚さは中、果皮の付着性は中、果肉の硬さは硬、果肉の地色は乳白、果肉のアントシアニン着色の強弱は弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味はやや高、核の大きさは中、核の横面の形は円形、核の褐色の濃淡は中、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少は高、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は強、収穫期は早である。

出願品種「尚美」は、対照品種「夏雄美」と比較して、葉身の先端の反りの有無が無であること、葉身の基部の形が鋭であること等で区別性が認められる。対照品種「みさか白鳳」と比較して、葉身の先端の反りの有無が無であること、核の横面の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鈴木隆雄
山梨県笛吹市御坂町下野原747

6 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木隆雄

7 出願公表の年月日 令和元年6月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

「夏雄美」の枝変わりである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28817号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus salicina Lindl. KU-PS1

3 登録品種の特性の概要

樹勢は強、枝の色の濃淡は中、短果枝の長さは短、葉身の形は楕円形、葉柄の長さは中、花の大きさはやや大、花弁の大きさは中、花弁の形は円形、果実の大きさは中、果実の形は楕円形、果頂部の形は凸、梗あいの深さはやや深、果皮の地色は黄緑、果皮を覆う色は赤、果肉の色は黄、果肉の硬さは中、果汁の多少は多、果実の酸味はかなり低、果実の甘味は高、核の粘離は粘性、核の大きさは中、核の横面の形は楕円形、開花始期はやや早、成熟期は早である。

出願品種「KU-PS1」は、対照品種「ビューティ」と比較して、果皮の地色が黄緑であること、果実の酸味がかなり低であること等で区別性が認められる。対照品種「ソルダム」と比較して、果実の大きさが中であること、果肉の色が黄であること、成熟期が早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人香川大学
香川県高松市幸町1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

別府賢治 片岡郁雄

7 出願公表の年月日 令和元年10月1日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ソルダム」に「ビューティ」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28818号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Raphanus sativus L. 秋田いぶりおぼこ (アキタイブリオハコ)

3 登録品種の特性の概要

草姿はやや開、着葉数はやや少、葉片の特性は普通、葉色はやや黄緑、葉の色素は無、小葉数は多、小葉の着き方は中、根形は先流れ、肩形はやや張る、尻形は流れ、根重はやや大、最大根径は中、最大根径の位置は中、根長は中、根の揃いは良、根色(基本色)は乳白、根色(補充色)は無、抽根性は少、収穫期はやや晩である。

出願品種「秋田いぶりおぼこ」は、対照品種「秋田いぶりこまち」と比較して、最大根径の位置が中であること等で区別性が認められる。対照品種「耐病干し理想」と比較して、肩形がやや張るであること、頸径が中であること等で区別性が認められる。対照品種「香漬の助」と比較して、根形が先流れであること、尻形が流れであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

秋田県

秋田県秋田市山王四丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

椿信一 堀内和奈

7 出願公表の年月日 平成30年9月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

「山形」の自殖後代を母系、「耐病干し理想」の自殖後代を父系とする漬物加工用の交雑品種である。

1 品種登録の番号及び年月日 第28819号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ribes sanguineum Pursh Annys2003

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半直立、側枝の粗密は中、芽のアントシアニンの着色は弱、新しょうのアントシアニンの着色は強、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の緑色の濃淡は中、花序の長さは長、花の数は多、花の粗密はやや密、花の色は濃赤、花の大きさは小、花柄の長さは短、着果の有無は無である。

出願品種「Annys2003」は、対照品種「King Edward」と比較して、花の数が多であること、花の粗密がやや密であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Andre van Nijnatten
Meirseweg 26 4881 DJ Zundert, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andre van Nijnatten

7 出願公表の年月日 平成29年10月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28820号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum tuberosum L. EPイベッタ

3 登録品種の特性の概要

幼芽の大きさはやや小、幼芽の形は球形、幼芽の基部のアントシアニン着色の強弱は強、幼芽の頂部の基部に対する大きさは小、幼芽の頂部の型は中間、幼芽の頂部のアントシアニン着色の強弱は中、幼芽の根端の数は少、植物体の草姿は直立、小葉の重なりは中間、複葉の緑色の濃淡は中、第二側小葉の長幅比は中、植物体の草高は中、花の数は少、花冠の大きさは小、花冠内面のアントシアニン着色の強弱は中、やくの色は黄橙、枯ちよう期は中、塊茎の形は卵形、塊茎の目の数は極少、塊茎の皮色は黄、塊茎の目の基部の色は黄、塊茎の表皮のネットは無又は極少、塊茎の肉色は黄、上いも重はやや軽、上いも数は中、上いもの平均重は中である。

出願品種「EPイベッタ」は、対照品種「ながさき黄金」と比較して、幼芽の基部のアントシアニン着色の強弱が強であること、塊茎の形が卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「アローワ」と比較して、幼芽の頂部のアントシアニン着色の強弱が中であること、枯ちよう期が中であること、塊茎の肉色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Wulf-Werum-Strasse 1, D-21337 Lüneburg, GERMANY

6 登録品種の育成をした者の氏名

Justus Bohm

7 出願公表の年月日 平成29年7月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育性系統同士を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28821号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Sparassis crispa Wulf.: Fr. チクマッシュHB-300

3 登録品種の特性の概要

子実体の径は中、子実体の高さはやや低、菌柄の色は白、菌柄の厚さはやや厚、菌柄の肉質はやや硬、枝の多少は中、花卉の形（先端部の形状）はハボタン状、枝の色は白、枝の厚さは中、枝の肉質はやや硬、発生型は全面発生、原基形成最適温度はやや高、子実体の生育最適温度は中、発生最盛期までの期間はやや長、発生操作から収穫までの期間はやや長、収量はやや多である。

出願品種「チクマッシュHB-300」は、対照品種「NBRC-102492」と比較して、15℃における菌糸生長速度がかなり速であること、20℃における菌糸生長速度がかなり速であること、25℃における菌糸生長速度がやや速であること、菌柄の色が白であること、枝の色が白であること、発生最盛期までの期間がやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「KSC-03号」と比較して、25℃における菌糸生長速度がやや速であること、菌柄の色が白であること、枝の色が白であること、発生型が全面発生であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社千曲化成
長野県千曲市大字内川1101番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

池田忠夫

7 出願公表の年月日 平成30年12月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

野生株から選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28822号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vaccinium L. Ridley 4514

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の大きさはやや小、樹姿は立、前年枝の色は赤褐、前年枝の長さはかなり短、前年枝の節間長は短、葉の長さは短、葉の幅はかなり狭、葉の長さ／幅はやや大、葉の形は楕円、葉の先端部の形は中、葉の表面の色は緑、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る）は中、葉の周縁の型は全縁、花芽のアントシアニン着色の強弱は弱、花序の長さは中、花冠の形はつぼ、花冠の色は淡黄白、花筒の大きさは中、花筒のアントシアニン着色の強弱は弱、花筒の稜の有無は有、果房の着生密度は中、未熟果の緑色の濃淡は中、果実の大きさはやや小、果実の縦断面の形は扁円、果柄痕の大きさは小、がくあ形の形は円、がく片の向きは中間、がく片の反り方は外曲、がくあの直径は小、がくあの深さは深、果粉の程度は中、果皮の色は濃青、果実の硬さは硬、果肉の色は白、糖度は中、酸度は中、着果習性は前年枝のみ、裂果性は少、ほう芽期はかなり早、前年枝の開花始期は早、前年枝の果実の成熟期は早、収穫期間はやや短である。

出願品種「Ridley 4514」は、対照品種「Sharpblue」と比較して、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る）が中であること、果粉の程度が中であること、果肉の色が白であること等で区別性が認められる。対照品種「Ridley 1812」と比較して、葉の長さが短であること、葉の幅がかなり狭であること、果実の大きさがやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Mountain Blue Orchards Pty Ltd

1372a Bruxner Highway, Lindendale, New South Wales, Australia, 2480

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ridley William Bell

7 出願公表の年月日 平成31年3月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

「C99-42」に「C00-008」を交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第28823号 令和3年12月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Zingiber officinale Roscoe 土佐雅（トサミヤビ）

3 登録品種の特性の概要

草姿は立、草丈は中、茎の数は少、頂葉の着生の向きは水平、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の緑色の濃淡はかなり濃、茎の長さはやや短、茎の太さはやや小、茎のアントシアニン着色の強弱はやや強、塊茎の重さは中、塊茎の形はタイプⅢ、塊茎の外皮の色は灰黄色、塊茎片の数は少、塊茎片の大きさはやや大、塊茎の肉色は灰黄色、萌芽期は中である。

出願品種「土佐雅」は、対照品種「土佐一」と比較して、塊茎の外皮の色が灰黄色であること、塊茎の肉色が灰黄色であること等で区別性が認められる。対照品種「近江しょうが」と比較して、塊茎の外皮の色が灰黄色であること、塊茎の芽のアントシアニン着色の強弱が中であること、塊茎の肉色が灰黄色であること等で区別性が認められる。対照品種「お多福しょうが」と比較して、塊茎の外皮の色が灰黄色であること、塊茎の肉色が灰黄色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

河渕雅夫
高知県高知市北本町3丁目8番3号

6 登録品種の育成をした者の氏名

河渕雅夫

7 出願公表の年月日 平成29年4月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「土佐一」の変異株である。