

1) 温州ミカン審査基準

No	形 質	定 義	調 査 方 法
1	樹 姿	枝条の水平に対する角度 直立：枝と枝の分岐角度が狭く上向き 枝が多い 開張：枝と枝の分岐角度が広く樹冠が 横に広がりやすい	観察による調査 調査上の注意事項①参照
2	枝梢の密度	単位容積あたりの枝梢の発生程度	観察による調査
3	樹の大きさ	樹容積 ※台木、樹齡、栽培条件の等しい 対照品種と比較する	樹容積(㎡) =長径×短径×高さ×0.7 (0.1㎡まで)
4	樹 勢	枝梢の伸長程度などを対照品種と比 較する	観察による調査
5	枝梢の太さ	1年生の發育枝(春枝)の基部の太さ	調査上の注意事項②参照 枝の基部から1cmの部位の直径をノ ギスで計測する (0.1mmまで)
6	枝梢の長さ	1年生の發育枝(春枝)の長さ	枝の長さを物差しで計測する (0.1cmまで)
7	節間長	1年生枝の節と節との間の距離	枝の中央部3節間の長さをノギスま たは物差しで計測し3で除した数 (0.1cmまで)
8	枝梢のとげの多少	調査した枝梢のとげの数÷調査した枝梢 の全着葉節数×100	5で用いた枝を調査する (1%まで)
9	葉身の形	春枝の葉の葉身全体の形状	調査上の注意事項③参照 図例1参照 この際翼葉の形は無視する 葉のデータは等倍のコピーを取りこ れを計測してもよい
10	葉身先端の形	葉身先端部の形状	図例2参照
11	葉身基部の形	葉身基部の形状	図例3参照
12	葉身波状の程度	葉身波状の程度 無：葉の全面が平坦 弱：葉の縁が少し波打っている 中：中庸 強：葉の縁が甚だしく波打っている	観察による調査

状 態	階級	標 準 品 種
直立 中間 開張	3 5 7	青島 宮本、山川、上野、宮川、南柑20号、林、土橋紅
粗 中 密	3 5 7	日南1号、興津、大津4号、南柑20号 山川
小 中 大	3 5 7	山川 日南1号、上野、宮川、興津、土橋紅 林、青島
弱 中 強	3 5 7	上野 日南1号、興津、南柑20号、土橋紅 青島
細 (~3.0未満) 中 (3.0~3.5未満) 太 (3.5~)	3 5 7	宮本、山川、宮川、大津4号、土橋紅 日南1号、上野、興津、南柑20号、青島
短 (~13.0未満) 中 (13.0~17.0未満) 長 (17.0~)	3 5 7	山川、林、土橋紅 宮本、大津4号、青島 日南1号、上野、宮川、興津、南柑20号
短 (~1.5未満) 中 (1.5~2.0未満) 長 (2.0~)	3 5 7	宮本、山川、林、土橋紅 日南1号、上野、宮川、興津、大津4号、南柑20号、青島
無 (0) 少 (1~10未満) 中 (10~30未満) 多 (30~)	1 3 5 7	宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島
披針形 紡錘形 卵形	1 2 3	岩崎 宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島
鋭尖形 鈍尖形 鋭形 鈍形	1 2 3 4	宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島
鋭尖形 鋭形 鈍形	1 2 3	宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島
無 弱 中 強	1 3 5 7	宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島

No	形 質	定 義	調 査 方 法
13	葉身の大きさ	葉柄を除いた葉面積	葉面積計あるいは重量法を用いて葉身の面積を計測する (0.1cm ² まで)
14	葉身長	葉身の長さ	図例4 参照 (0.1cmまで)
15	葉身幅	葉身の最大幅	図例4 参照 (0.1cmまで)
16	葉形指数	葉身長÷葉身幅	(0.1まで)
17	葉の厚さ	葉身中央部の厚さ	葉身中央部の葉脈の間をダイヤルゲージで計測する (0.01mmまで)
18	網脈の鮮明度	葉身表側の葉脈の明瞭さ	観察による調査
19	翼葉の形	翼葉の形状	図例5 参照
20	葉柄の長さ	葉柄の長さ	葉の等倍コピーを使用してもよい 図例4 参照 (0.1mmまで)
21	葉柄の太さ	葉柄の基部の太さ	葉柄の基部の太さを葉面と垂直方向にノギスで計測する
22	花序の形成	花蕾の着生状態 単生：単生花のみ 総状：総状花序を形成する	観察による調査
23	花の重さ	咲きかかっている花蕾の重さ	調査上の注意事項④参照 電子天秤などで計測する (0.01gまで)
24	花卉の形	開花した状態の花弁の形状	調査上の注意事項⑤参照 図例6 参照
25	花卉の長さ	咲きかかっている花蕾の花弁の長さ	23のサンプルを用いる 1花蕾から形の整った平均的な花弁を1弁取りノギスで長さを計測する (0.1mmまで)

状 態	階級	標 準 品 種
小 (~27.0未満) 中 (27.0~37.0未満) 大 (37.0~)	3 5 7	宮本、山川、上野、宮川、興津、土橋紅 日南1号、大津4号、南柑20号、青島 林
極短 (~ 8.0未満) 短 (8.0~ 9.0未満) 中 (9.0~10.0未満) 長 (10.0~11.0未満) 極長 (11.0~)	1 3 5 7 9	宮本、山川 上野、宮川、興津、南柑20号 日南1号、大津4号、青島、土橋紅 林
狭 (~ 4.0未満) 中 (4.0~ 4.5未満) 広 (4.5~)	3 5 7	宮本、山川 上野、宮川、興津、大津4号、南柑20号、青島、土橋紅 日南1号、林
小 (~2.2未満) 中 (2.2~2.4未満) 大 (2.4~)	3 5 7	楠本 宮本、日南1号、山川、上野、興津、南柑20号 大津4号、林、土橋紅、青島
薄 (~0.30未満) 中 (0.30~0.40未満) 厚 (0.40~)	3 5 7	宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島
不明 やや明瞭 明瞭	1 2 3	宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島
無 痕跡 紡錘形	1 2 3	宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島
短 (~15.0未満) 中 (15.0~20.0未満) 長 (20.0~)	3 5 7	宮本、上野 日南1号、山川、興津、大津4号、南柑20号、林、青島
細 (~ 2.0未満) 中 (2.0~ 2.5未満) 太 (2.5~)	3 5 7	宮本、興津 日南1号、山川、上野、宮川、大津4号、南柑20号、青島 林
単生 総状	1 2	宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島
軽 (~0.40未満) 中 (0.40~0.50未満) 重 (0.50~)	3 5 7	土橋紅 宮本、山川、上野、宮川、興津、大津4号、南柑20号 日南1号、林、青島
紡錘形 披針形 へら形	1 2 3	宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島
短 (~17.0未満) 中 (17.0~20.0未満) 長 (20.0~)	3 5 7	宮本 日南1号、山川、上野、宮川、大津4号、南柑20号、林 青島

No	形 質	定 義	調 査 方 法
26	花弁の幅	咲きかかっている花蕾の花弁の幅	23のサンプルを用いる 1花蕾から形の整った平均的な花弁を1弁取りノギスで幅を計測する (0.1mmまで)
27	花弁の色	咲きかかっている花蕾の花弁の外側の色	23のサンプルを用いる 観察による調査 油胞の色は無視する
28	花弁の数	1花あたりの花弁数	23のサンプルを用いて計測 (0.1枚まで)
29	花糸の数	1花あたりの花糸の数	23のサンプルを用いて計測 (0.1本まで)
30	花糸の分離の程度	調査上の注意事項⑦参照 咲きかかっている花蕾の花糸の分離状態	23のサンプルを用いる 観察による調査
31	花粉の多少	調査上の注意事項⑧参照 開花した状態における花粉の形成量の多少	24のサンプルを用いる 花粉の形成量の多少を葯の色等から観察する
32	子房の形	咲きかかっている花蕾の子房の形状	23のサンプルを用いる 図例7参照
33	花柱の形	咲きかかっている花蕾の花柱の形状	23のサンプルを用いる 図例8参照
34	果実の形	果実の側面から見た形状	調査上の注意事項⑥参照 図例9参照 果形指数と対応する いずれにも当てはまらない場合は典型的な果形を図示する
35	果形指数	果形指数 = 果実横径 ÷ 果実縦径 × 100	果実の形の区分に対応する (整数)
36	果頂部の形	果実縦断面における果頂部の形状	図例10参照
37	果頂部放射条溝の有無	果頂部における明瞭な放射条溝の有無	観察による調査
38	果頂部の凹環の有無	果頂部花柱痕の周辺の環状の陥没または円盤状に盛り上がった形状の有無	観察による調査

状 態	階級	標 準 品 種
狭 (~ 6.0未満) 中 (6.0 ~ 7.0未満) 広 (7.0 ~)	3 5 7	日南1号、山川、上野、宮川、大津4号、南柑20号、林青島
白 淡黄 帯紫	1 2 3	宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島
4枚 (~ 4.5未満) 5枚 (4.5 ~ 5.5未満) 6枚 (5.5 ~)	1 2 3	宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島
少 (~ 19.0未満) 中 (19.0 ~ 22.0未満) 多 (22.0 ~)	3 5 7	宮本、日南1号、山川、上野、興津 宮川、南柑20号、土橋紅、大津4号、林、青島
分離 一部合一 合一	1 2 3	宮本、山川 上野、興津、南柑20号、林、土橋紅、宮川、大津4号、青島
無 少 中 多	1 3 5 7	宮本、山川 日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、林、青島
球 扁球 洋梨形	1 2 3	宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島
直 弓形 湾曲	1 2 3	宮本、山川、上野、大津4号、南柑20号、林、青島
やや扁球 扁球 やや扁平 扁平 極扁平	1 2 3 4 5	宮川 山川、南柑20号、林 宮本、日南1号、上野、大津4号、青島、土橋紅
小 (~ 120未満) やや小 (120 ~ 130未満) 中 (130 ~ 140未満) やや大 (140 ~ 150未満) 大 (150 ~)	3 4 5 6 7	宮川 山川、南柑20号、林 宮本、日南1号、上野、大津4号、青島、土橋紅
陥没 平坦 円	1 2 3	宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島
無 有	1 9	宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島
無 不明瞭 有	1 5 9	宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島

N o	形 質	定 義	調 査 方 法
39	果梗部の形	果実縦断面における果梗部の形状	図例11参照
40	果梗部放射条溝の 多少	果梗部周辺の明瞭な放射条溝の多少	明瞭な放射条溝の数を観察により計測する (0.1本まで)
41	果心の充実度	空：果心組織がほとんど崩壊し空洞化 粗：果心組織がじょうのうから完全分離 中：果心組織の一部が裂開または崩壊 密：果心組織の裂開がなく充実	果実赤道部横断面の観察による調査
42	果心の大きさ	果心の直径÷果実横径×100	図例12参照 果実横断面の果心の直径を計測 果実横径は果形指数の算出に用いた 数値 (整数)
43	果実の重さ	成熟期の平均的な果実の重さ	電子天秤などを用いて果実の重さを 計測する (0.1gまで)
44	果皮の色	成熟期における果皮の色	観察による調査 日本園芸植物標準色標に準拠し系統 色名、コード番号を記載する
45	アルベドの色	成熟期の果実のアルベドの色	観察による調査 日本園芸植物標準色標に準拠し系統 色名、コード番号を記載する
46	油胞の大きさ	果実赤道部の油胞の大きさ	観察による調査
47	油胞の密度	果実赤道部の油胞の密度	観察による調査 果実赤道部の果皮1cmあたりの油胞 数を計測する (0.1個/cm ² まで)
48	油胞の凹凸	果実赤道部の油胞の凹凸	観察による調査
49	果面の粗滑	果実赤道部の果面の粗滑	観察による調査
50	果皮の厚さ	果実赤道部の果皮の厚さ（アルベドを含 む）	図例12参照 果実横断面または縦断面の赤道部の 果皮の厚さをノギスで計測する (0.1mmまで)

状 態	階級	標 準 品 種
球面 切平面 やや凹	1 2 3	宮川 日南1号、山川、上野、興津、南柑20号、土橋紅 宮本、大津4号、林、青島
無 (0) 少 (0.1~ 3.0未満) 中 (3.0~ 6.0未満) 多 (6.0~)	1 3 5 7	日南1号、山川、上野、宮川、興津 宮本、大津4号、土橋紅 南柑20号、林、青島
空 粗 中 密	1 3 5 7	大津4号、南柑20号、林、青島、土橋紅 山川、上野、宮川、興津
極小 (~15未満) 小 (15~20未満) 中 (20~25未満) 大 (25~30未満) 極大 (30~)	1 3 5 7 9	上野 宮川 宮本、山川、興津 日南1号、大津4号、南柑20号、林、青島 土橋紅
軽 (~ 90.0未満) やや軽 (90.0~105.0未満) 中 (105.0~120.0未満) やや重 (120.0~135.0未満) 重 (135.0~)	3 4 5 6 7	寿太郎 宮本、日南1号、山川、上野、宮川、興津、南柑20号、林 大津4号、青島
黄橙 橙 濃橙 赤橙	1 2 3 4	大津4号 宮本、日南1号、上野、宮川、興津、南柑20号、林、青島 土橋紅
白 淡黄 淡橙 帯紅(レ'ソ)	1 2 3 4	宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島
小 中 大	3 5 7	盛田 宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島
疎 (~ 60.0未満) 中 (60.0~ 80.0未満) 密 (80.0~)	3 5 7	宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島
凹 平 凸	1 2 3	宮本、日南1号、山川、上野、林、青島、土橋紅 宮川、興津、大津4号、南柑20号
滑 中 粗	3 5 7	日南1号 宮川、南柑20号、林、青島、土橋紅
薄 (~2.5未満) 中 (2.5~3.5未満) 厚 (3.5~)	3 5 7	宮本、日南1号、山川、上野、宮川、興津、南柑20号 大津4号、林、青島、土橋紅

No	形 質	定 義	調 査 方 法
51	果皮歩合	果皮の重さ÷果実の重さ×100	果実の重さと果肉または果皮の重さから算出する (0.1%まで)
52	剥皮の難易	調査上の注意事項⑨参照 成熟した果実の剥皮性の難易	観察による調査
53	じょうのう膜の硬さ	食味によるじょうのう膜の硬さ 軟：違和感なく食べられる 中：食べると違和感が残る 硬：じょうのうごと食べられない	食味による調査
54	さじょうの形	果実横断面のじょうのう中央部のさじょうの形状	観察による調査
55	さじょうの大きさ	果実横断面のじょうのう中央部のさじょうの大きさ	観察による調査
56	さじょうの色 (果肉色)	果実横断面のさじょう(果肉)の色	観察による調査 日本園芸植物標準色標に準拠し系統色名、コード番号を記載する
57	果汁の多少	食味により感じる果汁の多少	食味による調査
58	甘 味	果汁の糖度計示度	屈折糖度計により糖度を計測する (0.1度まで)
59	酸 味	果汁中のクエン酸含量	化成ソーダ水溶液による果汁の滴定値から換算して計測する (0.01g/100mLまで)
60	香気の多少	剥皮時に感じる香気の強さ	剥皮時の嗅覚による観察
61	種子数	果実に含まれる種子の数	果実1個あたりに含まれる種子の数を計測 生食の障害にならない小さいなしいは除く
62	胚の色	多胚性品種における珠心胚の色 単胚性品種は調査しない	観察による調査

状 態	階級	標 準 品 種
小 (~20.0未満) 中 (20.0~25.0未満) 大 (25.0~)	3 5 7	宮本、日南1号、山川、上野、宮川、興津、南柑20号 大津4号、林、青島、土橋紅
易 やや易 中 やや難 難	3 4 5 6 7	宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島 橋本 盛田
軟 中 硬	3 5 7	宮川、興津 林、土橋紅、大津4号、青島
短 中 長	1 2 3	宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島
小 中 大	3 5 7	宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島
橙 濃橙 赤橙	1 2 3	宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島
少 中 多	3 5 7	宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島
低 (~9.0未満) やや低 (9.0~10.0未満) 中 (10.0~11.0未満) やや高 (11.0~12.0未満) 高 (12.0~)	3 4 5 6 7	宮本、山川、上野 日南1号、宮川、興津、土橋紅 南柑20号、林 青島
低 (~0.80未満) 中 (0.80~1.00未満) 高 (1.00~)	3 5 7	宮本、日南1号、山川、上野、宮川、興津 南柑20号、青島、土橋紅 大津4号、林
少 中 多	3 5 7	盛田 宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島
無 (~1.0未満) 少 (1.0~5.0未満) 中 (5.0~10.0未満) 多 (10.0~)	1 3 5 7	宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島
白 黄白 淡緑 緑	1 2 3 4	日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島、林

N o	形 質	定 義	調 査 方 法
6 3	胚の数	胚の多少	観察による調査
6 4	発芽期	発芽期の早晩 発芽始期は新芽の過半数が3mmに伸長したときとする	観察による調査 同一園の対照品種と比較する
6 5	開花期	開花始期の早晩 開花始期は蕾が連続して開花し始めたときとする	観察による調査 同一園の対照品種と比較する
6 6	成熟期	食味が最も良くなったと考えられる時期	食味を含めた観察による調査
6 7	隔年結果性	隔年結果性の程度	観察による調査
6 8	着色の難易	成熟期における果皮の緑色の抜けの良さ	観察による調査
6 9	後期落果の多少	成熟前の後期落果の発生程度	観察による調査
7 0	日焼け果の発生	日焼け障害果の発生割合	観察による調査
7 1	浮皮果の発生	浮き皮果の発生程度	観察による調査
7 2	裂果の発生	裂果の発生程度	観察による調査
7 3	その他の生理障害	果実におけるその他の生理障害の発生程度	観察による調査

状 態	階級	標 準 品 種
単胚 多胚	1 2	宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島
早 中 晩	3 5 7	宮本、日南1号、上野、山川 宮川、興津 大津4号、南柑20号、青島、林、土橋紅
早 中 晩	3 5 7	宮本、日南1号、上野、山川 宮川、興津 大津4号、南柑20号、青島、林、土橋紅
極早 (~ 8月下旬) かなり早 (9月上旬~ 9月中旬) 早 (9月下旬~10月上旬) やや早 (10月中旬~10月下旬) 中 (11月上旬~11月中旬) やや晩 (11月下旬~12月上旬) 晩 (12月中旬~12月下旬) かなり晩 (1月上旬~ 1月中旬) 極晩 (1月下旬~)	1 2 3 4 5 6 7 8 9	橋本 宮本、日南1号、山川 上野、宮川、興津 南柑20号 大津4号 青島、林、土橋紅 善九郎
低 中 高	3 5 7	宮本、日南1号、山川、上野、宮川、興津、南柑20号、林 今村
不良 良	1 9	宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島
無 少 中 多	1 3 5 7	宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島 橋温州
無 少 中 多	1 3 5 7	大津4号、南柑20号、青島、林、土橋紅 宮本、日南1号、上野、山川
無 少 中 多	1 3 5 7	大津4号、青島 日南1号、上野、宮川、興津
無 少 中 多	1 3 5 7	宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島
無 少 中 多	1 3 5 7	

No	形 質	定 義	調 査 方 法
74	貯蔵性	慣行の貯蔵法による比較	観察による調査
75	果実の耐寒性	果実の耐寒性の強弱	観察による調査
76	樹体の耐寒性	樹体の耐寒性の強弱	観察による調査
77	かいよう病抵抗性	かいよう病に対する抵抗性	観察による調査
78	そうか病抵抗性	そうか病に対する抵抗性	観察による調査
79	こくてん病抵抗性	こくてん病に対する抵抗性	観察による調査
80	ヤノネカイガラムシ抵抗性	ヤノネカイガラムシに対する抵抗性	観察による調査

状 態	階級	標 準 品 種
短 中 長	3 5 7	宮本、日南1号、山川 南柑20号 林、青島
弱 中 強	3 5 7	宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島
弱 中 強	3 5 7	宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島
弱 中 強	3 5 7	宮本、日南1号、山川、上野、宮川、興津
弱 中 強	3 5 7	宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島
弱 中 強	3 5 7	大津4号、南柑20号、青島、林、土橋紅
弱 中 強	3 5 7	宮本、日南1号、上野、興津、大津4号、南柑20号、青島

3 調査上の注意事項

調査に当たっては、同じ条件のもとで栽培されている樹齢のほぼ等しい対照品種の設定が望ましい。対照品種としては、親品種、親が同じ品種あるいはその他の既存品種の中から出願品種に特性が類似した品種を選ぶ。

調査用サンプルは、少なくとも2～3年間安定した結実状態に達している樹体から採取する。未結実あるいは初結実の樹体から採取した枝梢や果実の特性は、その後の結果母枝の状態の変化等から変わってくることが多いので注意が必要である。

①木の調査

安定した結実樹齢に達している木で調査する。調査は原則として果実の成熟期に行う。

②枝梢調査用サンプルの採取

枝梢の調査は原則として果実の成熟期に行う。春枝の展葉硬化以後で夏秋梢が発生していなければ、翌春までに対照品種と同時に調査したのでよい。サンプルは結実樹齢に達している木の東西南北全面から採取し、樹冠中段外周において前年度の果梗枝から発生した発育枝（春枝）を基部から切りとる。徒長枝や夏秋梢はサンプルから除外する。サンプルは15本とりその中から平均的な枝10本を調査する。

③葉のサンプルの採取

葉のサンプルは②の枝から、平均的な大きさで形の整った葉を原則として枝1本につき2枚ずつ採取し、このうち10枚を調査する。

④花のサンプルの採取－1

花蕾の重さ、花弁の長さ、花弁の色、花弁の数、花糸の数、花糸の分離の程度、子房の形、花柱の形の調査には、花弁がほころびかかった開花直前の花蕾を用いる。サンプル数20個。

⑤花のサンプルの採取－2

花弁の形、花粉の多少の調査には④のサンプルでなく、当日開花して花弁が完全に裂開しまだ反り返っていない花を用いて調査を実施する。サンプル数10個。

⑥果実のサンプルの採取

果実の調査は原則として成熟期に実施する。樹冠外周中段に結実した、平均的な大きさ及び果形の果実を採取する。サンプル数10個。

⑦花系の分離状態の定義

- 分離：花系がそれぞれ分離しており、脱落するとバラバラになる。
- 一部合一：花系が脱落してもバラバラにならず数本くっついたものがある。
- 合一：花系が筒状に合一している

⑧花粉の多少の定義

- 無：花粉の形成が認められず、葯が白色である。
- 少：花粉の形成がわずかで葯が裂開しないか、裂開しても花粉がほとんど放出されない。葯の色は中心部がやや黄色く見える。
- 中：少と多の中間。花粉の放出量がさほど多くない。
- 多：葯が裂開した状態で花粉の放出量が多い。葯は濃黄色である。

⑨剥皮性の定義

- 易：果皮を連続して容易に剥くことができる。
- やや易：手で比較的容易に剥けるが、果皮がもろいか果肉に密着して連続しては剥きにくい。
- 中：容易ではないがナイフ等を用いなくても手で剥くことができる。
- やや難：ナイフ等を用いないと剥くことができない。アルベドとじょうのうの剥離はよい。
- 難：果皮が厚くて硬い。あるいはアルベドが密着してじょうのうとの剥離が極めて悪い。

4 特性検定のための栽培試験方法

① 耕種基準

- (1) 台木：同系統の台木を使用して比較を行う。
- (2) 施肥量・施肥方法：各地域の施肥基準で実施する。
- (3) その他圃場管理：同一の管理方法にて比較を行う。

② 最低供試個体数

原則として3個体以上(2反復)を供試する。

③ 対照品種


親品種、親が同じ品種、あるいはその他の既存品種の中から果形、果皮色、成熟期等の特性が出願品種と類似した品種を選ぶ。

④ 特性を検定する上での留意点


- (1) 苗木を定植しての栽培試験を原則とし、高接ぎ栽培は参考とする。
- (2) 対照品種とは同一な樹齢での比較を原則とする。
- (3) 試験は対照品種との区別性が判定できるまでの最小年限とする。

7) 観察によって調査する形質の参考図例 (Explanations)


図例 1 葉身の形 (Fig.1 Blade shape)




披針形
(lanceolate)




紡錘形
(spindle-shaped)



橢円形
(elliptic)



卵形
(ovoid)




倒卵形
(obovate)


図例 2 葉身先端の形 (Fig.2 Blade apex shape)



鋭尖形
(pointed acute)



鈍尖形
(pointed obtuse)



鋭形
(acute)




鈍形
(obtuse)




円形
(round)


図例 3 葉身基部の形 (Fig.3 Blade base shape)




鋭尖形
(pointed acute)



鋭形
(acute)




鈍形
(obtuse)




円形
(round)


図例 4 葉の計測法 (Fig.4 Measurement of mature leaf)




図例 5 翼葉の形 (Fig.5 Wing shape)



図例 6 花卉の形 (Fig.6 Petal shape)



図例 7 子房の形 (Fig.7 Ovary shape)




長球 (long globose) 球 (globose) 扁球 (oblate) 扁平 (compressed) 樽形 (cask) 短卵形 (broad ovate) 洋梨形 (pear)

図例 8 花柱の形 (Fig.8 Style shape)




直 (straight) 弓形 (arched) 湾曲 (curved)

図例 9 果実の形 (Fig.9 Fruit shape)




長球 (long globose) 球 (globose) 扁球 (oblate) 扁平 (compressed) 短卵形 (broad ovate) 洋梨形 (pear) 紡錘形 (spindle-shaped)


図例10 果頂部の形 (Fig.10 Fruit apex shape)



図例11 果梗部の形 (Fig.11 Peduncle part shape of fruit)



図例12 果実横断面図 (Fig.12 Transverse section of fruit)



8) 調査する形質の参考資料

果皮の色 (Skin color)

状 態 (Characteristics)	各状態に該当する J H S カラーチャートナンバー (J. H. S. Color Chart Number)
黄緑 (yellow-green)	2907:濃緑黄 (deep greenish yellow)
黄白 (yellow-white)	2703, 2904:浅緑黄 (light greenish yellow)
淡黄 (light-yellow)	2505:明黄 (bright yellow), 2511:浅黄 (light yellow)
黄 (yellow)	2205:鮮橙黄 (vivid reddish yellow) 2506:明黄 (bright yellow)
黄橙 (yellow-orange)	1906:鮮黄橙 (vivid yellowish orange)
橙 (orange)	1606:橙 (strong orange)
濃橙 (dark-orange)	1307:濃橙 (deep orange)
赤橙 (strong reddish orange)	1012:赤橙 (strong reddish orange)
橙赤 (strong yellowish red)	0713:橙赤 (strong yellowish red) 1007:濃赤橙 (deep reddish orange)

アルベドの色 (Albedo color)

状 態 (Characteristics)	各状態に該当する J H S カラーチャートナンバー (J. H. S. Color Chart Number)
白 (white)	1901, 2201:黄白 (yellowish white)
淡黄 (light-yellow)	2503:淡黄 (pale yellow) 2702:淡緑黄 (pale greenish yellow)
淡橙 (light-orange)	1902:淡黄橙 (pale yellowish orange) 2202:淡橙黄 (pale reddish yellow)
帯紅 (pink)	1002:淡黄ピンク (pale yellowish pink)

さじょうの色 (Flesh color)

状 態 (Characteristics)	各状態に該当する J H S カラーチャートナンバー (J. H. S. Color Chart Number)
淡緑 (light-green)	2906:鮮緑黄 (vivid greenish yellow)
黄白 (yellow-white)	2703, 2904:浅緑黄 (light greenish yellow)
黄 (yellow)	2205:鮮橙黄 (vivid reddish yellow) 2506:明黄 (bright yellow)
黄橙 (yellow-orange)	1906:鮮黄橙 (vivid yellowish orange)
橙 (orange)	1606:橙 (strong orange)
濃橙 (dark-orange)	1307:濃橙 (deep orange)
ピンク (pink)	0703:黄ピンク (yellowish pink)
赤紫 (red-purple)	0110:暗紅 (dark red)

台木用品種の審査基準

(注意) 台木用品種として申請する場合には、その品種が属するいずれかの審査基準(温州ミカン、オレンジ類、ブンタン類、香酸カンキツ類、その他のカンキツ類)による特性調査とともに、台木用品種の特性調査を併せて実施する。

No	形 質	定 義	調 査 方 法
1	接ぎ木の難易	接ぎ木活着率の良否	ユズ、カラタチなど既存のカンキツ 台木用品種との比較
2	実生の揃い	播種後の実生の生育の均一さの程度	観察による調査
3	栄養繁殖の難易	単胚性品種及び種子の獲得が困難な多胚性品種を台木として用いようとする場合の栄養繁殖の難易の程度	挿し木、取り木等の難易
4	接ぎ木後の樹勢	接ぎ木後の苗の伸長程度及び幼木の樹容積の拡大程度	ユズ、カラタチなど既存のカンキツ 台木用品種との比較
5	台木の根の発育	接ぎ木後の発根量及び苗木定植後の根の発育量	掘り上げ解体調査 ユズ、カラタチなど既存のカンキツ 台木用品種との比較
6	耐湿性	カンキツ園の中でも水はけの悪い条件下を想定した場合の生育の良否	観察による調査 必要に応じて土壌の種類、土壌水分などによるポット試験を実施
7	耐干性	干害を想定した場合の生育の良否	観察による調査 必要に応じて土壌の種類、土壌水分などによるポット試験を実施

狀 態	階級	標 準 品 種
易 中 難	3 5 7	
不良 中 良	3 5 7	
易 中 難	3 5 7	
弱 中 強	3 5 7	
少 中 多	3 5 7	
弱 中 強	3 5 7	
弱 中 強	3 5 7	