

2019 年 9 月

TG/215/1 Rev. 2007-03-28 に準拠

クレマチス属

Clematis

(*Clematis* L.)

クレマチス属審査基準

I. 審査基準の対象(Subject of these Guidelines)

この審査基準は、キンポウゲ科 (*Ranunculaceae*) クレマチス属 (*Clematis* L.) の全ての品種に適用する。

II. 提出種苗(Material Required)

- i) 種苗の形態 提出年の前年に挿し木した発根苗
- ii) 提出時期 審査当局が指定する時期
- iii) 数量 12 個体
- iv) 提出する種苗は、重要な病害虫に汚染されていない十分に健全なものであること。
- v) 提出種苗は審査当局が指示した場合を除き薬剤、その他の処理をしていないものであること。もし、処理が行われている場合はその処理の詳細について記載すること。

III. 試験の実施(Conduct of Tests)

- i) 栽培条件 特性の確認が十分にできる正常な生育が可能な条件下で実施する。
日光の直射光下で行い、冬季は霜よけなどの特別な保護を加えない。
- ii) 最低供試個体数 8 個体
- iii) 栽培期間 1 生育周期
- iv) 調査方法
調査個体数 特に指示がない限り、植物体 8 個体又は各個体から採取した部分 8 個とする。
均一性は供試した全ての個体で判定する。
調査時期等 特に指示がない限り、葉に関する形質は、当年枝の中央部に着生する成葉で調査する。葉身に関する形質は、複葉の場合は最基部側の第 1 小葉で、2 回以上の複葉の場合は最基部側の第 1 小葉の先端小葉で調査する。花に関する形質は、自然開花期の初期に調査する。
- v) 特別な試験 特別な条件下でのみ発現する特性があり、出願者が試験方法等を添えて申告し、審査当局がそれに同意した場合は実施することがある。

IV. 判定基準 (Standards for Decisions)

判定は、登録出願品種審査要領の区別性、均一性及び安定性 (DUS) 審査のための一般基準に基づくものとする。

V. グループ分けに使用する形質(Grouping of Varieties)

- i) 草型 (形質 1)
- ii) 葉型 (形質 6)
- iii) 花型 (形質 23)
- iv) 花の直径 (形質 24)
- v) がく片の数 (一重又は半八重品種に限る。) (形質 27)
- vi) がく片の長さ (形質 30)

- vii) がく片の幅 (形質 31)
- viii) がく片の表面の色数 (形質 41)
- ix) がく片の表面の主な色 (形質 42)

以下の区分とする

- Gr.1 : 白
- Gr.2 : 黄
- Gr.3 : 桃
- Gr.4 : 赤
- Gr.5 : 紫
- Gr.6 : 青紫
- Gr.7 : 青
- Gr.8 : 緑

- x) がく片の表面の主な色の分布 (色数が 1 の品種に限る。) (形質 43)
- xi) がく片の表面の二次色 (色数が 2 以上の品種に限る。) (形質 44)
- xii) がく片の表面の二次色の分布 (色数が 2 以上の品種に限る。) (形質 45)
- 13) がく片の裏面の色数 (形質 48)
- 14) がく片の裏面の主な色 (形質 49)

以下の区分とする

- Gr.1 : 白
- Gr.2 : 黄
- Gr.3 : 桃
- Gr.4 : 赤
- Gr.5 : 紫
- Gr.6 : 青紫
- Gr.7 : 青
- Gr.8 : 緑

- 15) がく片の裏面の二次色 (色数が 2 以上の品種に限る。) (形質 50)
- 16) がく片の裏面の二次色の分布 (色数が 2 以上の品種に限る。) (形質 51)

VI. 特性表で使用する記号の説明 (Legend)

G : グループ分けに使用する形質

(*) : 品種記載の国際調和のための必須調査形質

QL : 質的形質

QN : 量的形質

PQ : 擬似の質的形質

(+) : VIII に特性表の説明図等を示す

MG : 植物体あるいは植物体の一部を集団として測定記録

MS : 植物体あるいは植物体の一部の個々の測定記録

VG : 植物体あるいは植物体の一部を集団として観察記録

VS：植物体あるいは植物体の一部の個々の観察記録

網掛け（特性表のピンク色の部分）：願書に添付する説明書（種苗法施行規則第7条、別記様式第2号）に出願者が記載する特性及び階級値

状態区分

質的形質及び擬似の質的形質の場合、全ての状態が特性表に記載してある。しかし、5階級以上の状態がある量的形質の場合、省略した状態が用いられることがある。例えば、9階級の状態による量的形質の場合、審査基準の状態は、以下のとおりに略されることがある。

状態 (State)		階級 (Note)
(日本語)	(English)	
小	small	3
中	medium	5
大	large	7

しかし、以下の9階級の状態を品種の記述として使用できるが、その場合には適切に使用するよう留意する。

状態 (State)		階級 (Note)
(日本語)	(English)	
極小	very small	1
かなり小	very small to small	2
小	small	3
やや小	small to medium	4
中	medium	5
やや大	medium to large	6
大	large	7
かなり大	large to very large	8
極大	very large	9

VII. 特性表(Table of Characteristics)

形質番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
1	1 (*)	QL G	草型	Plant: type	草型	観察 VG	1 2	無つる性 つる性	non-climbing climbing	たてしな ザ・プレジテント ハーグレイ・ハイブリッド	
2	2 (*)	QN	草姿(無つる性品種に限る。)	<u>Non-climbing varieties</u> <u>only</u> : Plant: growth habit	無つる性品種の開花期の草姿	観察 VG	1 2 3	直立 半直立 ほふく	upright semi-upright prostrate		
3	3	QN (+)	草勢(つる性品種に限る。)	<u>Climbing varieties</u> <u>only</u> : Plant: vigor	つる性品種の草勢	観察 VG	3 5 7	弱 中 強	weak medium strong	柿生	
4	4	QL	新しょうの毛の有無	Young shoot: presence of pubescence	若茎の柔毛の有無	観察 VG	1 9	無 有	absent present		
5	5	QN	新しょうの毛の粗密	Young shoot: density of pubescence	若茎における柔毛の粗密	観察 VG	3 5 7	粗 中 密	sparse medium dense	柿生 ザ・プレジデント	
6	6 (*)	QL G (+)	葉型	Leaf: type	当年に伸びた枝の中央部にある成葉の最多小葉を持つ葉の形	観察 VG	1 2 3 4 5 6 7	単葉 三出複葉 2回三出複葉 3回三出複葉 羽状複葉 2回羽状複葉 3回羽状複葉	simple ternate binate trinate pinnate bipinnate tripinnate	<i>C.integrifolia</i> ザ・プレジテント	

形質番号	UPOV No.	記号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査方法	階級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
7	7	QN	葉身の長さ	Leaf blade: length	当年に伸びた枝の中央部にある成葉の葉身の長さ	測定 cm MS	3 5 7	短 中 長	short medium long	クリムゾン・キング 胡蝶 朝霧、ラモナ	
8	8	QN	葉身の幅	Leaf blade: width	当年に伸びた枝の中央部にある成葉の葉身の幅	測定 cm MS	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad		
9	9 (*)	PQ (+)	葉身の形	Leaf blade: shape	葉身の全形	観察 VG	1 2 3 4 5 6	披針形 卵形 楕円形 倒卵形 ひし形 心臓形	lanceolate ovate elliptic obovate rhombic cordate	<i>C.alpina</i> 藤娘	
10	10	PQ (+)	葉身の先端の形	Leaf blade: shape of apex	葉先端の形	観察 VG	1 2 3 4	鋭先形 突形 鋭形 円形	acuminate cuspidate acute rounded	ザ・プレジテント	
11	11	PQ (+)	葉身の基部の形	Leaf blade: shape of base	葉基部の形	観察 VG	1 2 3 4	鋭形 鈍形 円形 心形	acute obtuse rounded cordate		

形質 番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
12	12	PQ (+)	葉身の周縁の形	Leaf blade: margin	葉縁の形	観察 VG	1 2 3 4 5	全縁 波状 円鋸歯状 歯状 鋸歯状	entire sinuate crenate dentate serrate		
13	13	QL	葉身の切れ込みの 有無	Leaf blade: lobing	裂片の有無	観察 VG	1 9	無 有	absent present	ハーグレイ・ハイブリ ッド <i>C.macropetala</i>	
14	14	PQ	葉身の裂片の数	<u>Lobed varieties only:</u> Leaf blade: number of lobes	裂片の数	観察 VG	1 2 3	2 3 又は 4 5 以上	two three or four more than four		
15	15	QN (+)	葉身の切れ込みの 深さ	Lobed varieties only: Leaf blade: depth of sinus between lobes	裂片間のくぼみ（切れ込 み）の深さ	観察 VG	3 5 7	浅 中 深	shallow medium deep		

形質番号	UPOV No.	記号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査方法	階級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
16	16	PQ	葉身の表面の主な色	Leaf blade: main color of upper side	当年に伸びた枝の中央部にある成葉の葉身の主たる色	観察 VG	1 2 3 4 5 6 7	黄緑 淡緑 緑 濃緑 青緑 灰緑 黄褐	yellow green light green medium green dark green blue green grey green bronze	ハーグレイ・ハイブリッド リチャード・ペンネル ダニエル・デロンダ 江戸紫、伊勢原	
17	17	QL	葉身の斑の有無	Leaf blade: variegation	当年に伸びた枝の中央部にある成葉の葉身の斑の有無	観察 VG	1 9	無 有	absent present	藤娘、江戸紫	
18	18	QN	葉身の表面のしわ	Leaf blade: rugosity of upper surface	当年に伸びた枝の中央部にある成葉の葉身表面のしわの強弱	観察 VG	1 2 3	無又は弱 中 強	absent or weak moderate strong		
19	19 (*)	QL	花の着き方	Flower: arrangement	花序の花の着き方	観察 VG	1 2	単花 房状	solitary clustered		
20		QL (+)	着花の位置	Flower: position	当年に伸びた枝における一番花の着花の位置	観察 VG	1 2 3	基部 中間部 先端部	base middle part tip		

形質番号	UPOV No.	記号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査方法	階級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
21	20	QN	小花柄の長さ	Flower: length of pedicel	小花柄の長さ	測定 cm MS	3 5 7	短 中 長	short medium long	<i>C.paten</i> 、ラモナ コンテス・ド・ブショウ ビーズ・ジュビリー クリムゾン・キング ペロニカズ・チョイス	
22	21	QN (+)	花の向き	Flower: attitude	地面に対する花の向き	観察 VG	1 2 3	上向き 横向き 下向き	upwards outwards downwards	藤娘、江戸紫 <i>C.alpina</i> <i>C.macropetala</i>	
23	22 (*)	QL G (+)	花型	Flower: type		観察 VG	1 2 3	一重 半八重 八重	single semi-double double	藤娘、江戸紫、ザ・プレジテント <i>C.macropetala</i> 、ダニエル・デロンダ ダッチェス・オブ・エジンバラ、天塩	
24	23 (*)	QN G	花の直径	Flower: diameter	主開花時期における花の直径	測定 cm MS	1 3 5 7 9	極小 小 中 大 極大	very small small medium large very large	伊勢原	
25	24 (*)	PQ (+)	花の形(一重又は半八重品種に限る。)	<u>Only varieties with</u> <u>flower: type: single or</u> <u>semi-double:</u> Flower: shape	一重又は半八重の花の形	観察 VG	1 2 3 4	筒形 鐘形 壺形 車形	tubular campanulate urceolate rotate	エトワール・ローズ <i>C.texensis</i> ザ・プレジテント、江戸紫	

形質番号	UPOV No.	記号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査方法	階級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
26	25	QN (+)	花の側面の形(車形の品種に限る。)	<u>Only varieties with</u> <u>flower: shape: rotate:</u> Flower: cross section in lateral view	花の横から見た断面の形	観察 VG	1 2 3	凹形 平形 凸形	concave flat convex		
27	26 (*)	PQ G	がく片の数(一重又は半八重品種に限る。)	<u>Only varieties with</u> <u>flower: type: single or</u> <u>semi-double:</u> Flower: number of sepals (excluding petaloids)	一重又は半八重品種の雄ずい等が弁化した花卉を除くがく片の数	観察 VG	1 2 3 4 5 6	4 枚のみ 4~6 枚 6 枚のみ 6~8 枚 8 枚のみ 9 枚以上	only four four to six only six six to eight only eight more than eight	<i>C.integrifolia</i> プリンス・チャールズ ビル・ド・リヨン ビーズ・ジュビリー	
28	27	QN (+)	がく片の着き方(車形の品種に限る。)	<u>Only varieties with</u> <u>flower: shape: rotate:</u> Flower: arrangement of sepals	がく片の重なり程度	観察 VG	1 2 3	離れる 接する 重なる	free touching overlapping		
29	28	QN	花の香り	Flower: fragrance	花の香りの強弱	観察 VG	1 2 3	無又は極弱 弱 強	absent or very weak weak strong	江戸紫 ザ・プレジテント メイリーン	
30	29	QN G	がく片の長さ	Sepal: length	半八重、八重は最外弁の がく片の長さ	測定 mm MS	3 5 7	短 中 長	short medium long		

形質番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
31	30	QNG	がく片の幅	Sepal: width	半八重、八重は最外弁の がく片の幅	測定 mm MS	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad		
32	31 (*)	PQ	がく片の形	Sepal: shape	半八重、八重は最外弁の がく片の形	観察 VG	1 2 3 4 5 6	卵形 披針形 楕円形 ひし形 倒卵形 へら形	ovate lanceolate elliptic rhombic obovate spatulate		
33	32	QN (+)	がく片の横断面の 形	Sepal: shape in cross section	半八重、八重は最外弁の がく片中央部の横断面の 形	観察 VG	1 2 3	凹形 平形 凸形	concave flat convex		
34	33	QN (+)	がく片の縦断面の 形(車形の品種に限 る。)	<u>Only varieties with</u> <u>flower shape: rotate:</u> sepal: curvature in longitudinal section	半八重は最外弁の車形の 花形種におけるがく片の 縦方向の曲がり方	観察 VG	1 3 5 7 9	強く内曲 内曲 平 外曲 強く外曲	strongly incurved moderately incurved flat moderately reflexed strongly reflexed		

形質番号	UPOV No.	記号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査方法	階級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
35	34	QN (+)	がく片の先端部の反りの強弱(車形の品種以外の品種に限る。)	<u>Only varieties with flower shape:</u> <u>non-rotate</u> : Sepal: reflexing of apex	半八重、八重は最外弁の車形の花形種を除く品種のがく片先端部の反曲	観察 VG	1 3 5 7 9	無又は極弱 弱 中 強 極強	absent or very weak weak medium strong very strong		
36	35	PQ (+)	がく片の先端部の形	Sepal: shape of apex	半八重、八重は最外弁のがく片の先端部の形	観察 VG	1 2 3 4 5	鋭先形 突形 鋭形 鈍形 小凹形	acuminate cuspidate acute obtuse retuse	ベル・オブ・ウォーキング ザ・プレジテント 藤娘、江戸紫	
37	36	PQ (+)	がく片の基部の形	Sepal: shape of base	半八重、八重は最外弁のがく片の基部の形	観察 VG	1 2 3	1 型 2 型 3 型	type 1 type 2 type 3	藤娘、江戸紫 クリムゾン・キング ネリー・モーザ	
38	44 (*)	QN	がく片の周縁部の波打ち	Sepal: undulation of margin	半八重、八重は最外弁のがく片周縁部の波打ちの強弱	観察 VG	1 3 5 7 9	無又は極弱 弱 中 強 極強	absent or very weak weak medium strong very strong	藤娘	
39	45	QL	がく片の縦軸方向のねじれの有無	Sepal: twisting along longitudinal axis	半八重、八重は最外弁のがく片の縦軸方向のねじれの有無	観察 VG	1 9	無 有	absent present		

形質番号	UPOV No.	記号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査方法	階級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
40	46	QN	がく片の縦軸方向のねじれの強弱	<u>Only varieties with twisting along longitudinal axis:</u> Sepal: degree of twisting	半八重、八重は最外弁の がく片の縦軸方向のねじれが有る品種のねじれの程度	観察 VG	3 5 7	弱 中 強	weak medium strong		
41	37 (*)	QL G	がく片の表面の色数	Sepal: number of colors of upper side	がく片表面の色数	観察 VG	1 2	1 2 以上	one more than one	藤娘 マダム・バン・ホーテ ザ・プレジテント ネリー・モーザ ミセス・N・トンプソン	
42	38 (*)	PQ G	がく片の表面の主な色	Sepal: main color of upper side	がく片表面の主な色	観察 VG		RHS カラー チャートの 色票番号に よる	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
43	39 (*)	QN G	がく片の表面の主な色の分布(色数が1の品種に限る。)	<u>Only varieties with one color:</u> Sepal: color distribution of upper side	がく片表面の色が単色の品種における色の濃淡の方向	観察 VG	1 2 3	中央に向け 淡色化 均一 外側に向け 淡色化	lighter towards middle even lighter towards margins		
44	40 (*)	PQ G	がく片の表面の二次色(色数が2以上の品種に限る。)	<u>Only varieties with more than one color:</u> Sepal: secondary color of upper side	がく片表面の色が複色の品種の二次色	観察 VG		RHS カラー チャートの 色票番号に よる	RHS Colour Chart (indicate reference number)		

形質番号	UPOV No.	記号	形質 (Characteristics)		定義	調査方法	階級	状態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
45	41 (*)	PQ (+) G	がく片の表面の二次色の分布(色数が2以上の品種に限る。)	<u>Only varieties with more than one color:</u> Sepal: distribution of secondary color on upper side	がく片表面の色が複色の品種の二次色部の分布	観察 VG	1 2 3 4 5	覆輪状 中斑 点斑 脈沿い 先端	edged central bar speckled along veins apex		
46		PQ	がく片の表面の三次色(色数が2以上の品種に限る。)	<u>Only varieties with more than one color:</u> Sepal: tertiary color of upper side	がく片表面の色が複色の品種の三次色	観察 VG		RHS カラーチャートの色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
47		PQ (+)	がく片の表面の三次色の分布(色数が2以上の品種に限る。)	<u>Only varieties with more than one color:</u> Sepal: distribution of tertiary color on upper side	がく片表面の色が複色の品種の三次色部の分布	観察 VG	1 2 3 4 5	覆輪状 中斑 点斑 脈沿い 先端	edged central bar speckled along veins apex		
48		QL G	がく片の裏面の色数	Sepal: number of colors of lower side	がく片裏面の色数	観察 VG	1 2	1 2以上	one more than one		
49	42 (*)	PQ G	がく片の裏面の主な色	Sepal: main color of lower side	がく片裏面の主な色	観察 VG		RHS カラーチャートの色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		

形質番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
50	43 (*)	PQ G	がく片の裏面の二次色(色数が2以上の品種に限る。)	<u>Only varieties with more than one color:</u> Sepal: secondary color of lower side	がく片裏面の色が複色の品種の二次色	観察 VG		RHS カラーチャートの色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
51		PQ (+) G	がく片の裏面の二次色の分布(色数が2以上の品種に限る。)	<u>Only varieties with more than one color:</u> Sepal: distribution of secondary color on lower side	がく片裏面の色が複色の品種の二次色部の分布	観察 VG	1 2 3 4 5 6	覆輪状 中斑 点斑 脈沿い 先端 基部	edged central bar speckled along veins apex base		
52		PQ	がく片の裏面の三次色(色数が2以上の品種に限る。)	<u>Only varieties with more than one color:</u> Sepal: tertiary color of lower side	がく片裏面の色が複色の品種の三次色	観察 VG		RHS カラーチャートの色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
53		PQ (+)	がく片の裏面の三次色の分布(色数が2以上の品種に限る。)	<u>Only varieties with more than one color:</u> Sepal: distribution of tertiary color on lower side	がく片裏面の色が複色の品種の三次色部の分布	観察 VG	1 2 3 4 5 6	覆輪状 中斑 点斑 脈沿い 先端 基部	edged central bar speckled along veins apex base		


形質 番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
54	47	QL	弁化した仮雄ずいの有無	Petaloid staminodes: presence	雄ずい等が弁化した花卉の有無	観察 VG	1	無	absent	ビーズ・ジュビリー ハーグレイ・ハイブリッド ザ・プレジデント <i>C.florida</i>	
							9	有	present		
55	48	QN	弁化した仮雄ずいの多少	Petaloid staminodes: number	雄ずい等が弁化した花卉の多少	測定 MS	3	少	few		
							5	中	medium		
							7	多	many		
56	49	PQ	弁化した仮雄ずいの主な色	Petaloids staminodes: main color of upper side	雄ずい等が弁化した花卉の表面の主な色	観察 VG	1	緑白	green white		
							2	緑	green		
							3	黄	yellow		
							4	橙	orange		
							5	桃	pink		
							6	赤	red		
							7	紫	purple		
							8	青紫	violet		

形質番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
57	50	PQ	花糸の色	Filament: color	花糸の色	観察 VG	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	白 淡黄 黄 黄緑 緑 桃 赤 紫 茶紫 淡青紫 青紫 褐	white cream yellow green yellow green pink red purple brown purple light violet medium violet brown		
58	51	PQ	やくの色	Anther: color	やくの色	観察 VG	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	白 黄緑 淡黄 黄 桃 赤 赤紫 紫 青紫 褐	white yellow green cream yellow pink red red purple purple violet brown		

形質番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
59	52	PQ	柱頭の色	Stigma: color	雌ずい柱頭の色	観察 VG	1 2 3 4 5 6	白 黄 桃 赤 紫 褐	white yellow pink red purple brown		
60	53	PQ	花柱の色	Style:color	花柱の色	観察 VG	1 2 3 4 5	白 黄緑 黄 桃 紫	white yellow green yellow pink purple		
61	54 (*)	QL	開花習性	Habit of flowering	着花する枝の齡	観察 VG	1 2 3	前年伸長枝 前 年 及 び 当 年伸長枝 当年伸長枝	only on previous year's growth on both previous year's and current year's growth only on current year's growth		
62	55 (*)	QN	開花始期	Time of beginning of flowering	開花開始時期	測定 月日 MG	3 5 7	早 中 晩	early medium late	柿生、伊勢原 クリムゾン・キング、 藤娘 江戸紫、 <i>C. ×jackmanii</i>	

VIII. 特性表の説明(Explanations on the Table of Characteristics)

1 共通の説明



2 個々の形質の説明

形質 3 草勢（つる性品種に限る。） Char.3 Climbing varieties only: Plant: vigor

草勢は、栄養成長の全体的な量から判断する。

The plant vigour should be considered as the overall abundance of vegetative growth.

形質 6 葉型 Char.6 Leaf: type



1
単葉
simple

2
三出複葉
ternate

3
2回三出複葉
biternate

4
3回三出複葉
triternate




5
羽状複葉
pinnate

6
2回羽状複葉
bipinnate

7
3回羽状複葉
tripinnate

形質 9 葉身の形 Char.9 Leaf blade: shape



1
披針形
lanceolate

2
卵形
ovate

3
橢円形
elliptic

4
倒卵形
obovate


5
ひし形
rhombic

6
心臓形
cordate

形質 10 葉身の先端の形 Char.10 Leaf blade: shape of apex



1
鋭先形
acuminate



2
突形
cuspidate



3
鋭形
acute




4
円形
rounded

形質 11 葉身の基部の形 Char.11 Leaf blade: shape of base




1
鋭形
acute



2
鈍形
obtuse



3
円形
rounded



4
心形
cordate

形質 12 葉身の周縁の形 Char.12 Leaf blade: margin



1
全縁
entire




2
波状
sinuate



3
円鋸歯状
crenate



4
歯状
dentate



5
鋸歯状
serrate

形質 15 葉身の切れ込みの深さ

Char.15 Lobed varieties only: Leaf blade: depth of sinus between lobes



3
浅
shallow




5
中
medium




7
深
deep

形質 20 着花の位置 Char.20 Flower: position



形質 22 花の向き Char.22 Flower: attitude



形質 23 花型 Char.23 Flower: type


一重は完全に一列輪生する花

半八重は完全な一列の輪生に加え、完全又は不完全な 1 ～ 2 列の輪生を持つ花

八重は 3 列以上の輪生を持つ花


形質 25 花の形（一重又は半八重品種に限る。）

Char.25 Only varieties with flowers: type: single or semi-double: Flower: shape




形質 26 花の側面の形（車形の品種に限る。）

Char.26 Only varieties with flower: shape: rotate: Flower: cross section in lateral view




形質 28 がく片の着き方（車形の品種に限る。）

Char.28 Only varieties with flower: shape: rotate: Flower: arrangement of sepals



形質 33 がく片の横断面の形 Char.33 Sepal: shape in cross section



形質 34 がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）

Char.34 Only varieties with flower shape: rotate: Sepal: curvature in longitudinal section



1
強く内曲
strongly incurved



3
内曲
moderately incurved



5
平
flat



7
外曲
moderately reflexed



9
強く外曲
strongly reflexed

形質 35 がく片の先端部の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）

Char.35 Only varieties with flower shape: non-rotate: Sepal: reflexing of apex



1
無又は極弱
absent or very weak




5
中
medium




9
極強
very strong

形質 36 がく片の先端部の形 Char.36 Sepal: shape of apex



形質 37 がく片の基部の形 Char.37 Sepal: shape of base




形質 45 がく片の表面の二次色の分布（色数が 2 以上の品種に限る。）

形質 47 がく片の表面の三次色の分布（色数が 2 以上の品種に限る。）

Char.45 Only varieties with more than one color: Sepal: distribution of secondary color on upper side

Char.47 Only varieties with more than one color: Sepal: distribution of tertiary color on upper side



形質 51 がく片の裏面の二次色の分布（色数が 2 以上の品種に限る。）

形質 53 がく片の裏面の三次色の分布（色数が 2 以上の品種に限る。）

Char.51 Only varieties with more than one color: Sepal: distribution of secondary color on lower side

Char.53 Only varieties with more than one color: Sepal: distribution of tertiary color on lower side

