

平成15年度

種 苗 特 性 分 類 調 査 報 告 書

エ リ カ



平成17年3月

独立行政法人種苗管理センター

目 次

1. 対象植物の範囲	1
2. 新規植物特性調査の概要	1
3. 特性審査基準(案)	
(1) 特性審査基準(案)	3
(2) 特性審査基準(案)参考図	5
4. 特性検定のための栽培試験方法	7
5. 参考文献	7
6. 既存品種の特性	
既存品種の特性	8
7. 参考資料(文献調査一覧)	14
8. 参考写真	17

1, 対象植物の範囲

- (1) エリカ属 (*Erica* L.) は、つつじ科 (*Ericaceae*) の常緑の低木または亜低木で、まれに小高木で約630種があり、その大部分は南アフリカからヨーロッパにかけて分布し、南アフリカ原産種(ケープヒース)約600種とヨーロッパ原産種(ヨーロッパヒース)約20種がある。また、エリカ属と同様ツツジ科の常緑低木で、カルーナ属、ダボエシア属をあわせて園芸的には「エリカ類」と呼ばれている。このうち、花の形態で筒状を有するエリカ属 (*Erica* L.) とダボエキア属 (*Daboecia cantabrica* L.) の2属を対象とする。
- (2) 基準作成時に調査した種は、*Erica sparsa* Klotzsch ex Benth. 「アワユキエリカ」、*Erica formosa* 「スズランエリカ」、*Erica canaliculata* 及び *Erica* cv. である。

2, 新規植物特性調査の概要

(1) 現地調査

① 調査年月日

第1回 平成16年1月8日(木)～平成16年1月9日(金)

② 調査者名(全同行者・所属)

安田勝則 農林水産省生産局種苗課審査官
山口聰 愛媛大学農学部蔬菜花卉学研究室助教授
田中孝一郎 種苗管理センター品種特性審査官

③ 調査場所

田中勝 ビニールハウス内
〒441-3427 愛知県渥美郡田原町大字加治字欠田83番地6

④ 調査品種

Erica Klotzsch ex Sparsa benth. 品種名 「アワユキエリカ」

(2) 栽培調査

① 調査年月 平成16年1月19日～2月19日

② 調査者 田中孝一郎 種苗管理センター品種特性審査官

③ 調査場所 茨城県つくば市藤本2-2(種苗管理センター)

④ 調査品種

種 名	品 種 名
<i>Erica formosa</i> Thunb.	スズランエリカ
<i>Erica canaliculata</i> Andrews.	ジャノメエリカ
<i>Erica</i> cv.	カグヤヒメ コットンヒース
<i>Erica cerinthoides</i> P.J.Berews.	ファイヤーヒース
<i>Erica</i> × <i>hiemalis</i> cv.	クリスマスパレード Christmas Parade
<i>Erica colorans</i> Andrews.	ホワイトディライト White Delight
<i>Erica</i> × <i>darleyensis</i> f. <i>albiflora</i> d.c.mcclint cv.	ダーリーエンシス(赤) ダーリーエンシス(白)

(3) 調査に当たっての所見及び問題点

①重要な形質について

特性審査基準(案)は、「その他の観賞樹」に基づき作成した。このうち次の形質は、調査項目として取り上げなかった。

ア 取り上げなかった形質

果実の形、果実の大きさ及び果実の色、発芽期、落葉性、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性、虫害抵抗性

イ 取り上げなかった理由

果実の形、果実の大きさ及び果実の色……………果実を利用する植物ではない。

発芽期……………定義や調査方法が未確立である。

落葉性……………定義や調査方法が未確立である。

耐寒性、耐暑性……………定義や調査方法が未確立である。

病害抵抗性虫害抵抗性 ……………定義や調査方法が未確立である。


3. 特性審査基準(案)

(1)特性審査基準(案)

重要な形質	No.	形質	単位	定 義	測定方法	状態または区分	階級	標準品種	備考 (参考値)
樹姿及び樹高	1	樹姿		株全体の形	観察	立型	1	スズランエリカ、アワユキエリカ	
						中間型	2		
2	樹高			株の地際部から最頂部までの高さ (以降、調査は開花盛期時)	測定	開張型	3	カグヤヒメ	
						叢生型	4		
節間長	3	枝の長さ	cm	生育中庸な当年枝の長さ	測定	低	3		
						中	5	スズランエリカ	
枝の太さ	4	枝の太さ	mm	生育中庸な当年枝の中間部の太さ	測定	高	7	スズランエリカ	
						短	3	アワユキエリカ	
枝の色	5	枝の色		生育中庸な当年枝の中間部の色	測定	中	5		
						長	7	スズランエリカ、アワユキエリカ	
分枝性	6	分枝数	本	生育中庸な当年枝に発生する1次分枝の数	観察	細	3		
						中	5		
葉形	7	葉の付き方		葉の付き方	観察	太	7		
				(当年枝の中央部で観察)		JHSカラーチャートの色票番号による			
8	葉形			株の平均的な大きさの葉の形	観察	少	3	スズランエリカ	20
				(自然体のままで観察)		中	5		35
葉の大きさ	9	葉長	mm	葉の長さ	測定	多	7	ジャノメエリカ	50
						極多	9		
葉色	10	葉色		成葉表面の色	観察	互生	1	ダーリエンシス(赤・白)	
						対生	2		
葉の毛の多少	11	葉の毛の有無		葉の表面の毛の有無	観察	3輪生	3	アワユキエリカ	
						4輪生	4	ファイヤーヒース	
12	葉の毛の生え方			葉の表面の毛の生え方	観察	その他	9		
						針形	1		
13	着花の位置			花の着生位置	観察	線形	2	アワユキエリカ	
						披針形	3		
14	着花の部位			主枝及び分枝の着花部位	観察	長楕円形	4	ジャノメエリカ	
						卵形	5	ダーリエンシス	
15	花房形成の有無			花房形成の有無	観察	短	3	アワユキエリカ	
						中	5	ジャノメエリカ	
16	花房当たりの花数			花房当たりの花の数	観察	長	7		
						淡緑	1		
17	花そう形成の有無			花そう形成の有無	観察	緑	2		
						濃緑	3	スズランエリカ	
18	1花そう当たりの花数			1花そう当たりの花の数	観察	無	1	アワユキエリカ	
						有	9		
19	花の向き			開花時の花の向き	観察	全体	1		
						部分的	2	ファイヤーヒース(オレンジ)	
20	花筒の形			開花時の花筒部の形	観察	主枝	1	ファイヤーヒース	
						主枝及び1次分枝	2	アワユキエリカ	
21	花冠裂片の形			花冠裂片の形	観察	葉腋	3		
						先端	1	ファイヤーヒース	
22	萼の形			萼裂片の形	観察	上半分	2	ホワイトデライト	
						部分的	3		
23	花の縦径			自然体での花冠の長さ	測定	全体	4	ジャノメエリカ	
						無	1	アワユキエリカ	
24	花の横径			花冠裂片部の最大径	測定	有	9	ファイヤーヒース(オレンジ)	
						少	3		
25						中	5		
						多	7	ファイヤーヒース	
26						無	1		
						有	9	アワユキエリカ	
27						3個未満	1	ホワイトデライト	
						3個	2	アワユキエリカ	
28						4個以上	3		
						上向き	1		
29						斜上	2		
						横向き	3	ホワイトデライト、スズランエリカ	
30						斜下	4	ジャノメエリカ	
						下向き	5		
31						I型	1		
						II型	2		
32						III型	3	スズランエリカ	
						IV型	4	ファイヤーヒース	
33						V型	5	ジャノメエリカ	
						VI型	6	ダーリエンシス	
34						VII型	7		
						半円形	1	アワユキエリカ	
35						三角形	2	ホワイトデライト	
						卵形	3		
36						倒卵形	4		
						円形	5		
37						披針形	1	スズランエリカ	
						卵形	2		
38						倒卵形	3	カグヤヒメ	
						楕円形	4		
39						菱形	5	アワユキエリカ	
						短	3	カグヤヒメ	
40						中	5		
						長	7		
41						狭	3	スズランエリカ	
						中	5	ジャノメエリカ	
42						広	7	カグヤヒメ	

重要な 形質	No.	形 質 単位	定 義	測定方法	状態または区分	階 級	標 準 品 種	備 考 (参考値)
花 の 大 き さ	25	花筒の縦径 mm	花筒部の最大の縦径	測定	極短 短 中 長 極長	1 3 5 7 9	アワユキエリカ カグヤヒメ	
	26	花筒の横径 mm	花筒部の最大の横径	測定	狭 中 広	3 5 7	スズランエリカ カグヤヒメ ファイヤーヒース(オレンジ)	
	27	花冠裂片の開閉度	花冠先端の裂片の開閉の程度	観察	閉じる 開く 平開	1 2 3	アワユキエリカ スズランエリカ	
	28	花冠裂片の大きさ	花冠裂片の大きさ(縦×横)	調査	小 中 大	3 5 7	ジャノメエリカ	
	29	雌ずいの長さ	花冠の長さとの雌ずいの長さとの比較	観察	短 同程度 長	3 5 7	スズランエリカ	
	30	雄ずいの長さ	花冠の長さとの雄ずいの長さとの比較	観察	短 同程度 長	3 5 7	スズランエリカ ジャノメエリカ	
	31	花筒部の地色	花筒表面の地色	測定	JHSカラーチャートの 色票番号による			
	32	花筒部の複色の有無	花筒部の複色の有無	観察	無 有	1 9	アワユキエリカ カグヤヒメ	
	33	花筒部の複色の色	花筒部の複色の色	測定	JHSカラーチャートの 色票番号による			
	34	花冠裂片の表面の地色	花冠裂片の表面の地色	測定	JHSカラーチャートの 色票番号による			
花 色	35	花冠裂片の複色の有無	花冠裂片の複色の有無	観察	無 有	1 9	スズランエリカ	
	36	花冠裂片の服色の色	花冠裂片の複色の色	測定	JHSカラーチャートの 色票番号による			
	37	柱頭の色	柱頭の色	観察	白 淡緑 茶 紫	1 2 3 4	アワユキエリカ	
	38	萼の色	萼の表面の色	観察	白 淡ピンク 淡紫 淡緑 緑	1 2 3 4 5	スズランエリカ アワユキエリカ	
	39	花柄の色	花柄の基部の色	観察	白 淡緑 淡ピンク 橙 淡紫 紫	1 2 3 4 5 6	スズランエリカ カグヤヒメ アワユキエリカ ジャノメエリカ	
	40	雌雄ずいの色	開花前の葯の色	観察	白 黄 茶 紫赤	1 2 3 4	アワユキエリカ	
	41	苞の着生位置	苞の着生位置 (第1苞の着生位置)	観察	基部に着く 中央部に着く 萼に着く 全体に着く	1 2 3 4	アワユキエリカ ファイヤーヒース ダーリエンシス(白)	
	42	花柄の長さ mm	花柄の長さ	測定	無又は極微 短 中 長 極長	1 3 5 7 9	ファイヤーヒース(オレンジ) アワユキエリカ	
	43	花の香り	開花時の花の香り	観察	無 有	1 9	アワユキエリカ	
	44	開花期	開花する時期	観察	冬～春咲き種 夏～秋咲 不定期咲き	1 2 3		
開 花 期	45	開花の早晩	開花の早晩 (供試株数の半数以上が開花した時期)	観察	早 中 晩	3 5 7		

(2) 特性審査基準(案) 参考図




1. 立型
erect

2. 中間型
semi erect

3. 開張型
spreading

4. 叢生型
bushy

図1 1. 樹姿
fig 1 plant : growth habite




1. 互生
opposite

2. 対生
alternote

3. 3輪生
whorled

4. 4輪生

図2 7. 葉の付き方
fig2 leaf attached



1. 針形
subulate

2. 線形
linear

3. 披針形
lanceolate

4. 長橢円形
oblong

5. 卵形
ovate

図3 8. 葉形
fig 3 leaf shape




図4
fig 4

20. 花筒の形
flower tube of shape



図5
fig 5

21. 花冠裂片の形
petal of shape



図6
fig 6

22. 萼の形
calyx: shape




図7
fig 7

41. 苞の着生位置
bract at arrives position

4 特性調査のための栽培方法

(1)栽培方法

- | | | |
|--------|---|--|
| ①作 | 型 | 施設・雨除け鉢栽培。 |
| ②供試種苗 | | 天挿しの発根2年生苗(無摘心株) |
| ③入手時期 | | 9～10月 (矮化剤未使用苗)。 |
| ④水管理 | | 乾燥に弱く、過湿に弱いので、普段の水やりは土の表面が乾いてからたっぷりと与える。
夏場は、暑さで生育が衰えるので水やりは普段よりも少なめに土の表面が乾いてから2日程度の間を置きたっぷりと水を与える。 |
| ⑤施肥 | | 1月、8月に1回油粕と骨粉を混ぜたものを株元に与えるか、5～10月の間に液肥を月に1回程度与える。但し、液肥は7月下旬～8月上旬の間は根を傷めるので施肥を中止する。 |
| ⑥その他管理 | | 無摘心とする。
エリカは弱酸性の土壌を好む為、3月の萌芽時期に株元をピートモスで覆う。
夏期の日射量の多い時期は30%程度の遮光を行う。 |
| ⑦病虫害対策 | | 病害は特に無く、害虫はカイガラムシとダニに弱いので注意する。 |

(2)供試個体数 15株

(3)栽培調査上の留意事項

- ①葉の形状は、外側に反る品種が多いが自然体のままで葉形を観察する。

5, 参考文献

- (1) 加藤憲市・(1994)園芸植物大事典第1巻 P 353-360 小学館
(2) Anthony hulixey(1997)Erica. The Royal Horticultural Society Dictionary of gardening P 435-436 Macmillan referende limited, The stockton press
(3) 英国王立園芸協会監修 (2003年) A-Z 園芸植物百科辞典 P406-409 誠文堂新光社

6. 既存品種の特性

No.	形 質	単位	アウキエリカ	スズランエリカ	ジャノメエリカ	カグヤヒメ	ファイヤーヒース (オレンジ)
1	樹姿		1 立性	1 立性	2 中間型	3 開帳性	2 中間型
2	樹高	cm	5 中 35	7 高 54	6 やや高 45	5 中 32	5 中 38
3	枝の長さ	mm	5 中 30	5 中 40	5 中 31	5 中 23	5 中 26
4	枝の太さ	mm	4 やや細 1.2	5 中 2.5	5 中 2.5	5 中 1.8	5 中 1.8
5	枝の色		1918 浅灰茶	1917 淡茶	1917 淡茶	1612 浅茶	1612 浅茶
6	分枝数		7 多 47	3 中 20	7 多 50	2 かなり少 3	2 かなり少 3
7	葉の付き方		3 3輪生	3 3輪生	3 3輪生	3 3輪生	4 4輪生
8	葉形		2 線形	2 線形	4 長楕円形	2 線形	2 線形
9	葉長	mm	3 短 2.5	3 短 2	5 中 6	5 中 6	5 中 6
10	葉色		3 濃緑	3 濃緑	3 濃緑	3 濃緑	3 濃緑
11	葉の毛の有無		1 無	1 無	1 無	1 無	9 有
12	葉の毛の生え方						2 部分的
13	着花の位置		2	2	2	2	1
14	着花の部位		1	1	4	1	1
15	花房形成の有無		1 無	1 無	1 無	9 有	9 有
16	花房当たりの花数	個				3 少 4	5 多 1~16
17	花そう形成の有無		9 有	9 有	9 有	1 無	1 無
18	1花そう当たりの花数	個	2 3個 3	1 3個以下 1	2 3個 3		
19	花の向き		3 横向き	3 横向き	4 斜下	4 斜下	4 斜下
20	花筒の形		5 V型	3 III型	5 V型	3 III型	4 IV型
21	花冠裂片の形		1 半円形	1 半円形	1 半円形	1 半円形	1 半円形
22	萼の形		5 菱形	1 被針形	1 被針形	3 倒卵形	1 被針形
23	花の縦径	mm	1 極短 2.3	1 極短 2.3	2 かなり短 3.8	3 短 5.8	7 かなり長 40
24	花の横径	mm	1 極狭 1.5	1 狭 1.7	3 中 3.9	5 広 6.5	5 広 6
25	花筒の縦径	mm	1 極短 1.8	2 かなり短 3	2 かなり短 2.2	3 短 5	8 極長 35
26	花筒の横径	mm	1 極狭 2.1	3 狭 4.3	3 狭 3.9	5 中 6.5	7 広 7
27	花冠の裂片の開閉度		2 開く	3 平開	2 開く	3 平開	3 平開
28	花冠裂片の大きさ		2 かなり小	3 小	3 小	4 やや小	5 中
29	雌ずいの長さ		7 長	3 短	7 長	3 短	5 同程度
30	雄ずいの長さ		5 同程度	3 短	7 長	3 短	3 短
31	花筒部の地色		8203	01 白	白→鮮紫ピンク(移行) 01→8904	8902 淡紫ピンク	0706 鮮橙赤 (濃淡有り)
32	花筒部の複色の有無		1 無	1 無	1 無	9 有	1 無
33	花筒部の複色の色		1 無	1 無	1 無	— 9202 淡紫ピンク	1 無
34	花冠裂片の表面の地色		9713 濃紫ピンク	01 白	01白→8904鮮紫 ピンク	9202 淡紫ピンク	0706 鮮橙赤
35	花冠裂片の複色の有無		1 無	1 無	1 無	1 無	1 無

No.	形質 単位	アワユキエリカ	スズランエリカ	ジャノメエリカ	カグヤヒメ	ファイヤーヒース (オレンジ)
36	花冠裂片の複色の色					
37	柱頭の色	4 紫	4 紫	4 紫	4 紫	4 紫
38	萼の色	3 淡ピンク 8903 紫ピンク	1 白 01 白	1 白 01 白	3 淡ピンク	4 橙 0706 鮮橙赤
39	花柄の色	5 淡紫 9714 紫赤	2 淡緑 3702 隠緑	6 紫 9714 紫赤	3 淡ピンク 0101 ピンク白	
40	雄ずいの色	4 紫赤	4 紫赤	4 紫赤	4 紫赤	4 紫赤
41	苞の着生位置	2 中央部に着く	2 中央部に着く	2 中央部に着く	2 中央部に着く	3 萼に着く
42	花柄長 mm	3 短 2.1	3 短 3.5	3 短 3.5	4 やや短 5	1 無又は極微
43	花の香り	9 有	1 無	1 無	1 無	1 無
44	開花期					
45	開花の早晩					

No.	形 質 単位	ファイヤーヒース (ピンク)	コットンヒース	ホワイトデライト	ダーリーエンシス (赤)	ダーリーエンシス (白)
1	樹姿	2 中間型	2 中間型	1 立性	3 開帳性	3 開帳性
2	樹高 cm	5 中 30	6 やや高 44	7 高 56	3 低 17	3 低 15
3	枝の長さ mm	5 中 26	5 中 2	6 やや長 35	5 中 22	5 中 25
4	枝の太さ mm	5 中 1.8	5 中 2	5 中 2	3 細 1	3 細 1
5	枝の色	1612 浅茶	1614 茶	1612 浅茶	1917 淡茶	1915 浅黄茶
6	分枝数	2 かなり少 3	9 極多 106	8 極多 99	1 無 0	1 無 0
7	葉の付き方	4 4輪生	3 3輪生	4 4輪生	4 4輪生	4 4輪生
8	葉形	2 線形	2 線形	2 線形	2 線形	2 線形
9	葉長 mm	5 中 6	3 短 3	3 短 3	5 中 7	5 中 7
10	葉色	3 濃緑	3 濃緑	3 濃緑	3 濃緑	3 濃緑
11	葉の毛の有無	1 無	1 無	9 有 (刺状)	1 無	1 無
12	毛の生え方					
13	着花の位置	1	2	2	2	2
14	着花の部位	1	4	2	4	4
15	花房形成の有無	9 有	1 無	1 無	1 無	1 無
16	花房当たりの花数 個	5 多 6~14				
17	花そう形成の有無	1 無	9 有	9 有	9 有	9 有
18	1花そう当たりの花数 個		2 3個 3	1 3個未満 2	1 3個未満 1	1 3個未満 1
19	花の向き	4 斜下	2 斜上	3 横向き	4 斜下	4 斜下
20	花筒の形	4 IV型	3 III型	2 II型	6 VI型	6 VI型
21	花冠裂片の形	1 半円形	1 半円形	2 三角形	2 三角形	2 三角形
22	萼の形	1 被針形	1 被針形	1 被針形	1 被針形	1 被針形
23	花の縦径 mm	7 かなり長 35	1 極短 2	1 極短 1.8	3 短 5	3 短 6
24	花の横径 mm	5 中 6	3 狭 2	3 狭 4	3 狭 2	3 狭 2
25	花筒の縦径 mm	8 極長 35	1 極短 1	1 極短 1.6	2 かなり短 4	5 中 5
26	花筒の横径 mm	7 大 7	3 狭 2	3 狭 3	5 中 4	3 狭 3
27	花冠の裂片の開閉度	3 平開	1 閉じる	2 開く	2 開く	2 開く
28	花冠裂片の大きさ	5 中	3 小	4 やや小	4 やや小	4 やや小
29	雌薬の長さ	3 短	5 同程度	5 同程度	7 長	7 長
30	雄薬の長さ	3 短	3 短	3 短	7 長	7 長
31	花筒部の地色	9702 淡紫ピンク	01白	8902 淡紫ピンク	9512 濃紫ピンク	01白
32	花筒部の複色の有無	1 無	1 無	9 有	1 無	1 無
33	花筒部の複色の色			8904 鮮紫ピンク		
34	花冠裂片の表面の地色	0105 鮮ピンク	01白	8904 鮮紫ピンク	9512 濃紫ピンク	01白
35	花冠裂片の複色の有無	1 無	1 無	1 無	1 無	1 無

No.	形質 単位	ファイヤーヒース (ピンク)	コットンヒース	ホワイトデライト	ダーリーエンシス (赤)	ダーリーエンシス (白)
36	花冠裂片の複色の色					
37	柱頭の色	4 紫	4 紫	4 紫	4 紫	2 淡緑
38	萼の色	3 淡ピンク 0105 鮮ピンク	2 淡緑 3507濃黄緑	2 淡緑 3507濃黄緑	3 紫 9512濃紫ピンク	1 白 01白
39	花柄の色	—	3507濃黄緑	9513隠赤紫	9513隠赤紫	2907濃緑黄
40	雄蕊の色	4 紫赤	4 紫赤	4 紫赤	4 紫赤	3 茶
41	苞の着生位置	3 萼に着く	2 中央部に着く	2 中央部に着く	2 中央部に着く	4 全体に着く
42	花柄長 mm	1 無又は極微 0	3 短 2	3 短 2	3 短 3	4 やや短 4
43	花の香り	1 無	1 無	1 無	1 無	1 無
44	開花期					
45	開花の早晩					

種・変種・異名等	草 姿	株の大きさ(縦×横)	葉の形状	花の特性	原産地
<i>E. arborea</i> L.	直立	低木(6~7m×3m)	針状・暗緑、下面に溝	花形は釣鐘状、香り有、花色は灰色がかった白色、花長が4cm、20~40cmの総状花序	ヨーロッパ南部 地中海沿岸
'Albert's Gold' 異名 <i>E. x veitchii</i> 'Albert's Gold' <i>ver. Alpina</i> (変種アルピナ)		2m×80cm	金色	開花しない	アフリカ北部 東アフリカ中央部山地
<i>Estrella Gold</i>		高さ1.2×幅75cm	ライム緑色、先端黄色	花色は白、花形は円筒状、総状花序	
<i>E. aristata</i> Andr L.		草丈60cm	5~6mm、先端曲、4輪生	花色は白色	
<i>E. australis</i> L.	直立	低木(2m×1m)	線形で長さ5mm、暗緑色、下面溝	花色は白と赤、粘着性有、ほうの長さ6~8mm、ガクは苞より僅かに長く尖る、花冠は筒状、花の長さ2.5cm、花筒の中部で狭くなり先端は4裂平開咲き、花冠の基部と上部は濃紅色で中部は白色	ケープ地方
'Mr. Robert'				花形は釣鐘状、花色は紫ピンク~紫紅色、花の長さ9mm、葯僅かに突出、散形花序に似た花序、花序の長さ20cm、開花は3~5月	ボルトガル、スペイン西部、 タンジール
'Riverslea'				花色は白色	
<i>E. baccans</i>	直立	低木(高さ2.5m、幅1m)	海緑色(冬から春は輪生)	花色は濃ピンク	
<i>E. bauera</i> Andr.	直立・分枝無	高さ1m	長楕円形、長さ5mm、灰緑色	花序の長さは2.5cm、花はそれぞれ4個の球形、花色は濃ピンク、花径は6mm、くびれた喉部と雄葯状の濃ピンクのがく片	南アフリカ (西ケープ州)
<i>E. blandfordia</i> Andr	直立	高さ90cm		総状花序、非相称の長い花柄、花の長さ15~20mm、花色は桃色又は白、春開花	ケープ地方
<i>E. bienna</i>	直立	低木(1.2m、幅80cm)	線状披針形、中緑色、下面に溝	花形は壺形又は鐘形、長さ6~7mm、花色は緑色を帯びた黄色、花期は春	ケープ地方
<i>E. canaliculata</i> Andr (誤って別種の <i>E. melanthera</i> の名で広く栽培)	直立	低木(2m、幅1.2m)	細い中緑色、下面淡緑、細毛有	花は小枝の先に3個、花形は壺形~卵状円錐形、花は粘着性の明橙色、花の長さ0.9~1.5cm、緑色喉部で裂片のある口部でつままる、花は腋生	南アフリカ (西ケープ州)
'Red queen'				花は前年枝の葉腋に1~2個着花、円錐花序に輪生、花序の長さは30cm、花はカップ形、花色は淡ピンク~白、花径は4mm、白い顎片と暗茶色の葯、開花は11月から春にかけて	南アフリカ(西ケープ・東ケープ州)
<i>E. carnea</i> L.	ほふく性	低木(20~25cm×55cm)	線状、暗緑色	花色は濃緑色の枝葉わり	
'Adrienne Duncan'		幅35cm	銅色	総状花序の片側のみ花をつける、花序の長さ7cm、花形は壺形、花色は紫ピンク色、花の長さ6~9mm	アルプスアペニン等の山地
'Altadene'		幅35cm	黄色、先端ピンク色と銅色	開花は、夏冬から春中頃	
'Ann Sparkes'		幅25cm	暗い金色、春には先端が銅色	花色は、濃ピンクから紫ピンク	
'Barry Sellers'		幅30cm	黄色、冬はオレンジ色	花色はローズピンクから紫ピンク	
'Challenger'		15cm~45cm	中緑色から濃緑色	花色は、濃ピンクから鮮紅色	
'December red'		15cm~45cm	中緑色から濃緑色	花色は、鮮紅色	
'Eileen porter'		高さ幅20cm	中緑色から濃緑色	花色は、ピンクから濃ピンクへ	
'Foxhollow'		幅40cm	黄色、先端銅色、厳寒期はオレンジ	花色は、鮮紅色、ガクはクリーム色	
'Golden starlet'		幅40cm	ライム緑色、夏は輝黄色	花色は、紫ピンク、	
'King George'		幅25cm	中緑色から濃緑色	花色は、白	
'lesley Sparkes'		幅25cm	中緑色、春には先端がサーモンピンク	花色は、濃ピンク、初冬開花	
'March Seedling'		幅50cm	中緑色から濃緑色		
'Myretoun Ruby'		15cm~45cm	中緑色から濃緑色	花色は、紫ピンク、	
'Pink Spangles'			鮮緑色	花色は、ピンクから藤紫へ	
'Sunshine Rambler'			鮮黄色	花色はピンク	

種・変種・異名等	草 姿	株の大きさ(縦×横)	葉の形状	花の特性	原産地
'Snow Queen'				花色は、白	
'Spring Pink'		幅40cm	中緑色から濃緑色	花色は、ピンクから濃ピンクへ	
'Springwood white'		15cm~45cm	明緑色	花色は白	
'Urvilii'		生育旺盛			
'Vivellii' 参照		幅35cm	銅色	花色は、紫ピンクから鮮紅色へ	
'Westwood Yellow'		幅30cm	中緑色から濃緑色	花色は、シェルピンク色	
<i>E. cerinthoides</i> L.	直立低木	1.5×1.5m	繖状、灰緑色、色々な軟毛	花は繖の頂部にのみ着花。花形は繖状、花色は明赤色が普通で時折ピンク、白。花の長さ2~3.5cm。喉部は僅かにつままり、基部は膨らむ、花の直径2~3.5cmの散形花序、開花は冬から春、まれに周年開花する。	南アフリカ、スワジランド
<i>E. chamissonis</i> Klotzsch ex Benth.	分枝しない				
<i>E. ciliaris</i> L.	根に広がる低木	高さ35~60cm、幅50cm	卵形から楕円形、腺有り、上面は灰緑色から濃緑色、下面は白	開花は盛夏~秋の中頃まで開花、繖状花序7cm、茎の先端に着花。花形は繖形、花色は濃ピンク、花の長さは1cm、開口部がつぼまる	ヨーロッパ
'Aurea'		高さ25cm	淡黄色、冬季は黒色		
'Coefe Castle'		高さ22cm、幅35cm	中緑色。冬は銅色		
'David McClintock'		40×45cm		花の基部は白、開口部が紫色がかかった緑色	
'Maweana'				花は大輪、花色が濃紅色	
'Stoborough'				花色は白、花は大輪	
'White wing'		15×45cm		花色は白	
<i>E. cinerea</i> L.	コンパクトな低木	60cm×80cm	繖状形、強く反転、暗緑色	枝の先に4~8個あるいは多数が繖状に着花。花径は繖形、花色は白・ピンク色又は紫、花の長さは最大7mm、開花は夏~初秋、繖状花序の長さ5cm	西ヨーロッパ
'Alba Major'		30cm×55cm	中緑色	花色は白	
'C. D. Eason'		25cm×50cm		花色は、鮮紅色、	
'Contrast'		50cm×45cm		花色は、赤	
'Eden Valley'		20cm×50cm	中緑色	花色は、濃紫ピンクで基部が白	
'Fiddle's Gold'		25cm×45cm	黄金色から赤色へ移行	花色は、濃ピンク	
'Foxhollow Mahogany'		20cm×50cm		花色は、ルビー赤	
'Glencairn'		30cm×50cm	濃緑色で先端は赤	花色は、鮮紅色	
'Golden drops'			黄色、冬紅葉		
'Golden hue'		35cm×70cm	薄い黄色、冬場は先端オレンジ色	花色は、紫水晶色	
'Hookstone White'		35cm×65cm	上面は中緑色	花色は白色、花序の長さ7~12cm、	
'Janet'		20cm×30cm	明緑色	花色は、シェルピンク色	
'John Eason'			黄色、冬紅葉		
'Knaphill Pink'				花色は、桃色	
'Lime Soda'		35cm×55cm	ライム緑色	花色は、青紫ピンク	
'Pentreath'		30cm×55cm		花色は、赤	
'Pink Ice' 参照	わい性	20cm×35cm	新緑色、冬季と幼時期は銅色	花色は、ローズピンク色	
'Pink Lace' 参照					

種・変種・異名等	草 姿	株の大きさ(縦×横)	葉の形状	花の特性	原産地
'Puple Beauty'		30cm × 55cm		花色は、濃ピンクがかった紫色	
'Rock Pool'		15cm × 30cm	黄金色、冬季は橙赤色に変化	花序は短い総花序、花序の長さ3cm、花色は藤紫色	
'Romiley'		25cm × 55cm		花色は、鮮紅色	
'Rosabella'		30cm × 60cm		花色は、鮮紅色、花序の長さは7~10cm	
'Rosea'			黄色	花色は、濃緑色	
'Windleblebrooke'		15cm × 45cm	黄金色、冬季橙赤色に変化		
'Yvonne'		35cm × 45cm		花色は、サーモンピンク。花冠は深く切れ込む	
<i>E. colorans</i> Andr.	直立低木	高さ70cm		短枝の先端に横向きに着花、全体が長い花穂、花冠は細い筒状、花の長さ15~20mm、喉部はくびれる。花色は白~淡桃色、春に開花	カレンド
<i>E. cruenta</i>	直立	1m × 70cm	緑状、濃緑色	総状花序は頂生し輪生する。花径は管状、花色は血赤色、花序の長さ2~2.5cm、開花は春~初夏	南アフリカ (西ケープ州)
<i>E. curviflora</i>	直立	1.5m × 1m	緑状から緑状披針形、中緑色	花形は管状形の有毛、花色は赤色、橙、黄、ピンク。花の長さは2~4cm。開口部が朝顔形に開く単性花で稀に3・花の頂生クラスタを作る。1年中開花するが冬から春にかけてが多い。	南アフリカ(西ケープ・東ケープ州)
<i>E. x darleyensis</i> Bean (<i>E. Carnea</i> x <i>E. Erigena</i>)	叢性低木	60cm × 75cm	被針形で中緑色	晩夏から早春にかけて10cmの総状花序を作る。花形は壺形~円筒形、花色は白~ローズピンク、花の長さ5mm	
'Archie graham'		30cm × 60cm		花色はピンク~紫ピンク	
'Arthur Jonson'				花色は淡桃色	
'Darley Dale'		幅55cm	先端クリーム色	花色はジェルピンク、後に濃色へ移行する。	
'Darleyensis', 'Pink perfection', <i>E. Carnea</i> 'Mr Reeves'		30cm × 60cm			
'Darleyensis'					
'Darley Dale' 参照					
'George Rendall'				花色は鮮桃色	
'Ghost Hills'					
'Jack H. Brummage'		幅80cm	明淡緑色、春に先端クリーム色	花色は紫ピンク	
'Jenny porter'		30cm × 60cm	黄橙色	花色はピンクがかった白	
'J. W. Potter'		25cm × 40cm	春に先端クリーム色	花色は紫ピンク	
'Kramer's Rote'			濃緑、春は先端赤からクリーム色	花色は鮮紅色	
'Kramer's Red'			銅緑色		
'Molten Silver'				花色は白色	
'Siberschmelze' 参照					
'Siberschmelze'		35cm × 80cm	春に先端がクリーム色から濃緑、冬は赤みがかかる	花色は白色	
異名 'Molten Silver', 'Silver Beads', 'Silver Beads'					
'Siberschmelze' 参照					
'White Glow'		25cm × 50cm		花色は白色	
'White Gown', 'E. Carnea 'White glow''					
'White Gown'					
'White Glow' 参照					
'White Perfection'		40cm × 70cm	明緑色	花色は純白	
<i>E. Carnea</i> 'White Perfection' 異名					
<i>E. erigena</i>	直立・低木 良く分枝する	2.5m × 1m	緑状(4~8mm)、濃緑	枝先に着花する。開花は冬~春。花形は壺形(5~6mm)~円筒形、萼は暗赤色で花冠より長い、花は甘い香り	アイルランド フランス南西部
'Alba'	矮生			花色は白	
'Brightness'	矮生	高さ・幅50cm	冬は濃緑色、夏期は灰白色がかった緑、黄色	開花は春、花色は濃ピンク色	スペイン ポルトガル
'Golden Lady'		30cm × 40cm			タンジール

種・変種・異名等	草 姿	株の大きさ(縦×横)	葉の形状	花の特性	原産地
'Ilish Lemon' E. xDarleyensis 'Jack H. Brummage' 参照					
'Jack H. Brummage' E. xDarleyensis 'Jack H. Brummage' 参照					
'Mediterranea Sperda' 'Superba' 参照				花色はシエルピンク色の後に濃色に移行。春中盤から晩春に開花。	
'Superba' 異名: 'Mediterranea Sperda'		1.8m × 50cm 75cm × 55cm	濃緑色	開花は春、花色は白	
'W. T. Rackliff'					
E. formosa Thunb.	低木。多分枝	高さ60cm	楕円形ないし長楕円形、長さ3~4mm	花は小枝の先端に3個着花。花は下向きに咲く。花筒の縦に稜のある扁平な壺形でドウダンツツジに似る。花は長さ5mm、花色は白、開花は春。	南アフリカ(ケープ南部)
E. foliacea Andr.	直立 良く分枝	草丈90cm	針状・短葉(6~10mm)、3稜形	花は小枝の先端(4~6個)、花長(1.5cm)、短い花柄、短い花筒、着花に開花	ケープ
E. grandiflora L. f.	直立低木	高さ1.5m	線状先尖形、経てに条線	花は短花柄にホウとガクが付く。花冠の長さ2.5cm、花形は筒状、花の先端4裂、花の裂片は三角の鋭頭、花色は橙赤(変異有り)、黒の筋が目立つ	ケープ
E. glandulosa	低木	60cm × 90cm	明淡緑色、線状先端に膜のある毛が葉や茎にある	花は管状花で長さ4~10mm、花色はピンク色、花数は2~5個、直径1.5cmの花房形成	南アフリカ(西ケープ・東ケープ州)
E. gracilis. J. C. Wendl.	直立・低木	長さ・幅50cm	線状、深灰緑色	花は小枝の先端に着花、開花は秋~春、1箇所に4花輪生、花序の長さは1cm、花形は壺形、花色は紅・桃・白の3色、花の長は4mm	南アフリカ(西ケープ・東ケープ州)
E. x Biemalis 園芸品種	直立・低木	長さ・幅60cm	線状、明淡緑色	開花は晩秋から冬、花形は管状で長さ1.5cm、花色は白味がかるピンク色、総状花序10cm	
E. halicacaba L.	直立・低木 良く分枝	高さ2m	針状葉長さ1cm	花は茎頂に1~3個、ホウは6mmで卵条鋭頭、舟弁状、がく片はホウより少し大きく1cm、花冠は1.5~2cm、4個密集し4面体となり先尖り、ホウがく・かた色は花冠共に淡黄白色で淡緑	ケープ半島
E. hirtiflora Curtis	直立	高さ50cm	長楕円形・軟毛密生	小枝の先に4個ずつ着花、花形は壺形、花色は緑色、開花は春	
E. hybrida 'Irish Lemon'	開張性の低木	高さ50cm	葉葉に軟毛密生	花は小枝の先に多数着花、花形は広鐘形、花色は明桃色、	ポートエリザベスを中心に
E. stuartii 'Ilish Lemon' 参照	低木	高さ1m		花は短枝の先端に着花、花の向きは下垂、花は鐘形、花の長さ7~10mm、がくは大きく花冠の半分を覆う、花色は濃がうら色、がくは淡桃色	カレドン、ブレスタドル地域
E. holosericea Salisb.	直立・低木	高さ90cm		斜上の短枝先端に数個着花、花筒部2cm前後、裂片星型に開開、花色は桃~白	ケープ北東部
E. infundibuliformis Andr.	直立性	高さ90cm	先形長さ1cm、光沢有り4輪生	花色は桃色(8mm程度)、花形は壺形、花は茎頂または側枝の先端、多数の花が側生するように見え全体が大きな鐘状に見える	ケープのセレスからカレドンまで
E. lateralis Willd.	直立・低木	3m × 1m 大きな羽状の枝 若い枝に毛有り	長さ8mm、裏面に浅い溝 革質、線状、中緑色、	開花は冬~春、花は長さ8mmの管状の鐘形、花色は白、蕾はピンク色、枝分かれした総状花序、花に芳香有り、萼と花柱は濃褐色	フランス南西部、ポルトガル、スペイン西部
'George Hunt'			茎が明黄色、日除け要		
E. mackiana Bab. 異名: E. Crawfordii, E. Mackaii, E. Mackvana (英名: 'Mackay's heath')	ややほふく性から直立低木	50cm × 70cm	長楕円状被針形で先端に毛、花面は白	開花は夏~初秋、花の直径1cmの散形花序、花形は壺形、花色は明ピンク、花の長さ7mm、開口部はつぼまる	アイルランド、スペイン
'Dr. Ronald Gray' 異名: E. Tetralix 'Dr. Ronald Gray'		15cm × 35cm	無毛で明緑色	花色は純白	
'Lowsoniania'	矮生			花色は桃色、小さい花	
'Plena'		15cm × 40cm		花形は八重、花色は鮮紅色、	
異名: E. Tetralix 'Plena'				花は長さ8mm、花色は白花	
'Shining Light'		25cm × 55cm	灰緑色		
E. mammosa	直立・低木	1.5m × 2m	線状から被針形・濃緑色	開花は春~夏、花は管状、花色は暗赤、橙赤、ピンク、緑、白。花長は1.5~5cm、枝分かれした頂生の総状花序7cm	地中海沿岸東部
E. manipuiflora 異名: 園芸名 E. Verticillata (英名: Whorled heath) subsp. 'Atbura Heaven Scent'	直立からほふく性の低木	1m × 1.1m 幅60cm	線状、先端鋭くとがり中緑色	開花は晩夏~秋、不規則長さ10cmの総状花序、花形は円筒形から釣鐘形、花色はローズピンク色、花の長さ4mm 花の香り有、花色は濃ピンク色、スプレー状、	
E. nana Salisb	わい性、ほふくとさおり直立 直立低木	高さ20~25cmまれに50cm 幅1m 60 × 30cm	線状、中緑色、	E. Foliaceaより長く花冠頂部もどくびれのない長筒形、花は黒色の萼と柱頭が見える、秋に開花、3花輪生、花序は直径2cm、裂片広がり先端緑色	南アフリカ
E. pagana	直立低木		線状、中緑色、	開花は晩	
E. patersonia Ander. (英名: 'Mealie heath')	直立・低木 分枝少ない	90cm × 60cm	線状で長さ1cm、中緑色	花は短枝先端、花は横向きに開花、晩冬と早春開花、葉い穂状、長さ8cmの総状花序、花色は濃黄色、花形は管状、長さ1.5~2cm、4花が集合し花序を作る	

種・変種・異名等	草 姿	株の大きさ(縦×横)	葉の形状	花の特性	原産地
<i>E. perspicua</i> (英名: Prince of Wales heath)	低木	2m × 1m	灰緑色、線状	花は半透明の管状花、長さ1~2cm、白、ピンクと白、赤と白、又は赤、穂状に近い総状花序8cm、開花は初秋~冬	南アフリカ (西ケープ州)
<i>E. peozia</i>	多分枝、低木		線状、中緑色	春に5cmの総状花序	
<i>E. quadrangularis</i>	低木	60cm × 45cm	線状、中緑色	開花は晩春~夏、花形はカップ形、長さ2~3mmの花が4花、長さ2cmの花序が輪生、花色は白~ピンクが濃赤に移行	南アフリカ (西ケープ州)
<i>E. plukenetii</i> L.	直立・低木	高さ60cm	細い線形、密生	花は茎上部の葉腋に着花、下垂、花冠基部が膨らんだ筒型(長さ1.5~2cm)、花色は桃色、紫又はオレンジ色を帯びるものや白色もある。花は、雌・雄しべが花冠から突出する特異な形態	ナマランド西北部、からモセールバイ
<i>E. x Praegeri</i> Ostenf. 異名: <i>E. x stuartii</i> Linton, <i>E. Tetralix</i> var.	矮生20cm	高さ20cm			
'Connemara'				夏の後半開花、花色は淡桃色	イギリス(コーンウォール)
<i>E. regia</i> Bartl.	低木、斜上		線形長さ10mm	花形は筒型で先が太、喉部くびれ有り太、花色は紅色を基本	
変種 <i>Ver. Variegata</i> L. Bolus (園芸種)				花色は花冠の先半分が鮮紅色、基部は白色	
<i>E. scoparia</i>	直立・低木	2m × 1m	線状、濃緑色	花は小さい釣鐘形で縁がかかった褐色、花長最大3mm、穂状に近い総状花序6cm。	フランス南西部、スペイン、 アフリカ北部、カナリー諸島
'Minima'		25cm × 80cm		花色は褐色かかった緑の花が少数開花。	
<i>E. sessiliflora</i> L. f.	直立・低木 分枝少ない	2m × 1m	線状(5to15mm)、直立、中緑色	花は茎の頂部近く横向きに着生、穂状花序に似た長さ6cmの総状花序、やや下向きに湾曲した筒形の縁がかかった白色、がく裂片は多肉で花後肥大して果実を包む、長さ1.5~3cm、晩夏から春にかけて開花、ガク片は最後に赤くなり密な花房を作り数年間枝に付着する。	南アフリカ(西ケープ・東ケープ州)
<i>E. shannonea</i> Andr.	低木、分枝少ない	高さ50cm	線形長さ1.5mm、先尖る	散形花序、花は茎頂に着花、花冠の長さ2.5~3cm、花は壺形で喉部に向かい狭まり先端4裂、花冠裂片は星型に開開、がくは紫紅、花色は光沢のある白で次第に桃色帯びる、花の表面は粘る	南アフリカ
<i>E. sittiensis</i> Klotzsch	直立・低木 小枝が多く、枝に毛が付く	高さ60cm	針状で先が尖る、4輪生	花は小さい、がくは披針形の長さ3mm、花冠は筒状、先端近くがくびれる。花色は紅色で先端が白、白花もある。乾燥に強く花糸が曲がる、小枝の先端に3~4花で大量に着く。	南アフリカ(東ケープ州)
<i>E. sparsa</i> Lodd.	低木、細かく分枝	高さ50cm		花は小枝	ケープからポート・エリザベス
<i>E. speciosa</i>	生育旺盛、直立多分枝、低木	1.2m × 1m	線状、中緑色	穂状花序に似た総状花序(長さ8cm)、花色はピンク色、基部は赤色、長さ2~3cm、白、緑又は黄色の裂片を持つ、3花輪生しまれに単生、開花は早春~初夏	南アフリカ(西ケープ・東ケープ州)
<i>E. stricta</i> <i>E. Terminalis</i> 参照					
<i>E. x stuartii</i> (種間雑種 <i>E. mackaiana</i> × <i>teralix</i>) 異名 <i>E. x praegeri</i> 'Lrish lemon' 異名: <i>E. Erigena</i> 'Lrish lemon', <i>E. Hybrida</i> 'Lrish lemon'	直立・低木	25cm × 50cm	長楕円、灰緑色	花は4輪生、カップ形、蜂蜜の香り、白花、まれにピンク色を帯びる、長さ4mm、開花は夏から晩秋	アイルランド(ドネガル、コンマール)
<i>E. subdivaricata</i>	横広がり、低木	50~80cm × 1m	春に明るいうれも黄色の新芽を出す線状、有毛、中緑色	開花は晩春~夏、花色は濃紫	南アフリカ(ケープ西部)
<i>E. taxifolia</i> Dryand.	低木、直立性	高さ60cm	広線形でいちい風の葉に似る	花は枝の先端に数個から十数個の散房花序、花の形は壺形、長さ6~7mm、がく裂片が発達し花冠の3分の2の長さ、がく裂片・花冠とも桃色、夏に開花	ケープ
<i>E. terminalis</i> Salisb	直立・低木 多分枝	高さ3m・幅1m	線状、濃緑色の光沢有り	花は枝の先端に長さ7mmの壺形、花色は濃ピンク、散形花序、開花は初夏から夏の中頃、開花後しおれた花は冬中小豆色を呈す	ヨーロッパ、地中海沿岸
<i>E. tetralix</i> L.	わい性、横張り、低木	30cm × 50cm	披針形から線状長楕円形、腺有り、灰緑色裏面は白、十字4輪生	開花は夏の中頃から秋の中頃まで、花は枝先に4~10個以上、花色は薄いピンク色、長さ9mm、開口部がつぼまる壺形の6mm散形花序、花枝は直立し軟毛、花色は純白	ヨーロッパ北部から西部
'Alba mollis'		20cm × 30cm	線灰色		
'Oon underwood'		高さ25cm		花色は鮮紅色	
'Dr. Ronald Gray'					
<i>E. mackaiana</i> 'Dr. Ronald Gray' 参照					
'melebury white'			茎葉は白味帯びる	花色は白花	
'Pink star'		20cm × 35cm		花形は星型、花色は濃ピンク	

種・変種・異名等	草 姿	株の大きさ(縦×横)	葉の形状	花の特性	原産地
'Plena' <i>E. mackiana</i> 'Plena' 参照					
<i>E. transparens</i> Bergius	小枝多 マツト状	高さ70から80cm	葉は短く鈍頭の円柱状	花は小枝の先端に着花、長い花柄を持った花が2〜3個垂れて咲く、長さ1.5cm程度の円柱状・花色は淡桃色・先端白・平開咲き	ケープ原産
<i>E. thimifolia</i> J. C. Wendi.			楕円形、少数の腺毛	直立した分枝先端に近い葉腋に数個、花形は壺形、長さ4mm、花色は桃色、蒴は黒く花冠より突出	ヨーロッパ北部から西部
<i>E. unbellata</i> (英名: Dwarf Spanish heath)	低木	35〜80cm × 55cm	線状、灰緑色	開花は晩秋〜初夏、花形は釣鐘形から卵形、花色は藤紫色、花長6mm、暗褐色の病が目立つ	ポルトガル、スペイン西部、タンジール
<i>E. vanans</i> L. (英名: Cornish heath, Wandering heath)	生育旺盛で横に広がる低木、ややほふく性から上に向かう	40〜80cm × 80cm	線状、濃緑色	花は葉腋に2個ずつ着生、小枝全体が長い花穂、花冠は卵形、長さ4mm、花色はピンク、蒴又は白、長さ14cmの総状花序、開花は夏の中頃から秋の中頃	アイルランド、英国(コンウォール)、フランス西部、スペイン
'Birch Glow'		30〜50cm		花色は濃ローズ、ピンク色	
'Fiddlestone'				花色は濃橙色、長い花穂	
'French White'		40〜60cm × 60cm		花色は灰白色、花多数	
'Lyonesse'		25cm × 60cm	明緑色	花色は純白	
'Mrs. D. F. Maxwell'		30cm × 45cm		花色は淡紅色	
'St. keverne'		40cm × 45cm		花色は明ピンク	
'Valerie Proudly'		15cm × 30cm	明黄緑	花色は白	
'Redsensation'				花色は淡紅色	
<i>E. 'Valerie griffiths'</i> 園芸品種	横に広がる低木、	40cm × 55cm	線状で黄色、冬は濃色の黄金色	花色は薄ピンク色、長さ4mmの釣鐘形、5〜10cmの総状花序、開花は夏〜初秋	
(種間雑種 <i>E. Arborea</i> × <i>E. Lusitanica</i>) <i>E. x veitchii</i>	直立して開く低木	2.2m × 65cm	線状、中緑色	開花は晩冬〜春、長さ30cmの葉がつく総状花序、花形は4mmの円筒形〜球形、花色は白花	
'albert's Gold' <i>E. arborea</i> 'albert's Gold' を参照					
'Ecter'		高さ1.9m		花に香り有り、花多数着花	
<i>E. venticillata</i> Bergius	低木	高さ1.5m	葉は短く7〜8mm、4〜6輪生	花形は管状花、長さ2cm、花色は淡桃色又は濃色、多数固まった総状花序	ケープ半島からカレドニ
<i>E. versicolor</i>		3m × 1m	線状、中緑色	総状花序に似た長さ3cmの管状花を3輪生、花色は花筒が赤、先端が緑〜白色、開花は秋〜初冬	南アフリカ (西ケープ州)
<i>E. verticillata</i>					
<i>E. vestita</i> Thund (種間雑種 <i>E. ciliaris</i> × <i>E. Tetralix</i>) (英名: Watson's heath)	直立・低木	長さ・幅90cm	線状で3稜が有、先端は鋭尖形、6輪生、密葉、中緑色	総状花序に似た長さ3cmの総状花序、花はア一子状の管状、花色は紅・濃桃・白・黄色、長さ1.5〜2cm、開花は春〜晩夏、総鐘状の花序	南アフリカ (西ケープ州)
<i>E. vulgaris</i> <i>E. Culluna vulgaris</i> 参照					
<i>E. x watsonii</i> (種間雑種 <i>E. ciliaris</i> × <i>E. Tetralix</i>) (英名: Watson's heath)	横に広がる低木	40cm × 85cm	線状、灰色がかった緑色	夏1cmの総状花序、花形は壺形で開口部つぼむ、長さ1cm、花色はピンク色	英国 (コンウォール)
'Dawn'			新芽は赤、後に金色に変化	花色は濃ピンク、開花は夏中頃〜秋中頃	
<i>E. x williamsii</i> (種間雑種 <i>E. tetralix</i> × <i>E. uazensis</i>) 異名: <i>E. x williamsiana</i> (英名: William's heath)	ややほふく性から上向きの低木	75cm × 45cm	線状、中緑色、春は先端が明黄色	長さ4cmの総状花序、花の長さ3mm、花形は釣鐘形、花色は濃ピンク色、開花は夏中頃から晩秋	英国 (コンウォール)
'P. D. Williams'		長さ30cm	春の新芽の先端金色で夏まで保持		

8. 参考写真



品種名
エリカ ホワイトデイト
Erica colorans Andrews

小枝の先端に着花
花そう形成



品種名
エリカ ファイヤーヒース
Erica cerinthodes

長枝の先端のみ着花
花房形成



品種名
スズランエリカ

小枝の先端に着花
花そう形成



品種名
クリスマスパレード

小枝の先端に着花
花そう形成



品種名
ダーリーエンシス

葉腋に2個ずつ着花



品種名
コットンヒース

枝の先に2～3個の花
花そう形成

○花房……花が房状に群がり咲いているもの。

○花そう……梨の花のように1箇所から数個の花が咲く