

2015 年 4 月

おおしまかんすげ種

Oshima-kan-suge

(*Carex oshimensis* Nakai)

おおしまかんすげ種審査基準

I. 審査基準の対象 (Subject of these Guidelines)

この審査基準は、カヤツリグサ科 (Cyperaceae) スゲ属 (*Carex* L.) のオオシマカンスゲ種 (*C. oshimensis* Nakai) の全ての品種に適用する。

II. 提出種苗 (Material Required)

- i) 種苗の形態 株分け1年生苗
- ii) 提出時期 審査当局が指定する時期
- iii) 数量 20 個体
- iv) 提出する種苗は、重要な病害虫に汚染されていない十分に健全なものであること。
- v) 提出種苗は審査当局が指示した場合を除き薬剤、その他の処理をしていないものであること。もし、処理が行われている場合はその処理の詳細について記載すること。

III. 試験の実施 (Conduct of Tests)

- i) 栽培条件 特性の確認が十分にできる正常な生育が可能な条件下で実施する。
- ii) 最低供試個体数 15 個体
- iii) 栽培期間 1 生育周期 (定植後、開花盛期に達するまで)
- iv) 調査方法
 - 調査個体数 特に指示がない限り、植物体 10 個体又は各個体から採取した部分 10 個とする。
 - 均一性は供試した全ての個体で判定する。
 - 調査時期等 特に指示がない限り、出穂後の開花盛期に行う。葉に関する形質は枯ちようしていない成葉で行う。
- v) 特別な試験 特別な条件下でのみ発現する特性があり、出願者が試験方法等を添えて申告し、審査当局がそれに同意した場合は実施することがある。

IV. 判定基準 (Standards for Decisions)

判定は、登録出願品種審査要領の区別性、均一性及び安定性 (DUS) 審査のための一般基準に基づくものとする。

均一性については、供試個体数が 15 の場合、許容される異型個体数は 1 である。

V. グループ分けに使用する形質 (Grouping of Varieties)

- i) 葉身の斑の有無 (形質 11)
- ii) 葉身の斑の模様 (形質 12)

VI. 特性表で使用する記号の説明 (Legend)

G : グループ分けに使用する形質

QL : 質的形質

QN : 量的形質

PQ：擬似の質的形質

(+)：Ⅷに特性表の説明図等を示す

MG：植物体あるいは植物体の一部を集団として測定記録

MS：植物体あるいは植物体の一部の個々の測定記録

VG：植物体あるいは植物体の一部を集団として観察記録

VS：植物体あるいは植物体の一部の個々の観察記録

網掛け（特性表のピンク色の部分）：願書に添付する説明書（種苗法施行規則第7条、別記様式第2号）に出願者が記載する特性及び階級値

状態区分

質的形質及び擬似の質的形質の場合、全ての状態が特性表に記載してある。しかし、5階級以上の状態がある量的形質の場合、省略した状態が用いられることがある。例えば、9階級の状態による量的形質の場合、審査基準の状態は、以下のとおりに略されることがある。

状態 (State)		階級 (Note)
(日本語)	(English)	
小	small	3
中	medium	5
大	large	7

しかし、以下の9階級の状態を品種の記述として使用できるが、その場合には適切に使用するよう留意する。

状態 (State)		階級 (Note)
(日本語)	(English)	
極小	very small	1
かなり小	very small to small	2
小	small	3
やや小	small to medium	4
中	medium	5
やや大	medium to large	6
大	large	7
かなり大	large to very large	8
極大	very large	9

VII. 特性表 (Table of Characteristics)

形質 番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
1		QN	草姿	Plant: growth habit	株全体を側面からみた形状	観察 VG	1 2 3	直立 半直立 開張	upright semi-upright spreading	エヴァーゴールド	
2		QN (+)	草丈	Plant: height	地際から最頂部までの自然高	測定 cm MS	3 5 7	低 中 高	short medium tall	エヴァーゴールド	
3		QN (+)	葉群の高さ	Plant: height of foliage	地際から葉の最頂部までの自然高(突出した葉を除く。)	測定 cm MS	3 5 7	低 中 高	short medium tall	エヴァーゴールド	
4		QN	株幅	Plant: width	株の最大幅	測定 cm MS	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad	エヴァーゴールド	
5		QN	花茎の数	Plant: number of flowering stems	花茎の数の多少	測定 MS	3 5 7	少 中 多	few medium many	エヴァーゴールド	
6		QN (+)	花茎の長さ	Flowering stem: length	最長花茎の地際から雄小穂の基部までの長さ	測定 cm MS	3 5 7	短 中 長	short medium long	エヴァーゴールド	
7		QN	葉身の外曲の強弱	Leaf blade: strength of reflexing	典型的な成葉の縦方向の外曲の強弱	観察 VG	1 2 3	弱 中 強	weak medium strong	エヴァーゴールド	
8		QN	葉身の長さ	Leaf blade: length	最長葉の長さ	測定 cm MS	3 5 7	短 中 長	short medium long	エヴァーゴールド	


形質 番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
9		QN	葉身の幅	Leaf blade: width	最長葉の最大幅	測定 mm MS	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad	エヴァーゴールド	
10		PQ	葉身の緑色部の色	Leaf blade: color of green part	葉身の表面の緑色部の色 (斑入り品種にあっては、最も濃い緑色部で評価する。)	観察 VG		RHS カラーチャート色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
11		QL G	葉身の斑の有無	Leaf blade: variegation	葉身の表面の斑の有無	観察 VG	1 9	無 有	absent present	エヴァーゴールド	
12		QL (+) G	葉身の斑の模様	Leaf blade: pattern of variegation	葉身の表面の斑の模様	観察 VG	1 2 3 4	外斑 中斑 外斑及び縞斑 中斑及び縞斑	edged centered edged and striped centered and striped	エヴァーゴールド	
13		PQ	葉身の斑の色	Leaf blade: color of variegation	葉身の表面の斑の色	観察 VG		RHS カラーチャート色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
14		QN	葉身の斑の面積	Leaf blade: area of variegation compared to area of the other	葉身の表面の地色に対する斑の面積割合	観察 VG	1 2 3	小 中 大	small medium large	エヴァーゴールド	
15		PQ	葉身の中肋の色	Midrib: color	葉身の中肋の色	観察 VG	1 2 3	白 黄 緑	white yellow green	エヴァーゴールド	

形質 番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
16		QN (+)	雄小穂の長さ	Male spikelet: length	開花した最大雄小穂の基部から先端部までの長さ (雄ずいを除く。)	測定 cm MS	3 5 7	短 中 長	short medium long	エヴァーゴールド	
17		QN (+)	雄小穂の幅	Male spikelet: width	開花した最大雄小穂の幅 (雄ずいを除く。)	測定 mm MS	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad	エヴァーゴールド	
18		QN	雄小穂の褐色の濃淡	Male spikelet: intensity of brown color	開花直前の雄小穂の褐色の濃淡	観察 VG	1 2 3	淡 中 濃	light medium dark	エヴァーゴールド	
19		QN (+)	雌小穂の長さ	Female spikelet: length	開花した最大雌小穂の基部から先端部までの長さ (雌ずいを除く。)	測定 cm MS	3 5 7	短 中 長	short medium long	エヴァーゴールド	
20		QN (+)	雌小穂の幅	Female spikelet: width	開花した最大雌小穂の幅 (雌ずいを除く。)	測定 mm MS	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad	エヴァーゴールド	
21		QN	出穂期	Time of emergence (50% of plants with heads)	供試株の 50%以上が出穂 始めとなった日の早晩	測定 月日 MG	3 5 7	早 中 晩	early medium late	エヴァーゴールド	


VIII. 特性表の説明 (Explanations on the Table of Characteristics)

形質 2 草丈 Char.2 Plant: height

形質 3 葉群の高さ Char.3 Plant: height of foliage




形質 6 花茎の長さ Char.6 Flowering stem: length



形質 12 葉身の斑の模様


Char.12 Leaf blade: pattern of variegation



1
外斑
edged



2
中斑
centered



3
外斑及び縞斑
edged and striped



4
中斑及び縞斑
centered and striped

形質 16 雄小穂の長さ

Char.16 Male spikelet: length

形質 17 雄小穂の幅

Char.17 Male spikelet: width

形質 19 雌小穂の長さ

Char.19 Female spikelet: length

形質 20 雌小穂の幅

Char.20 Female spikelet: width

